

# تأثير تناول ملح الصوديوم على بعض المتغيرات الوظيفية للاعبين خماسي كرة القدم

أ.م.د. قيس جياد خلف  
أ.م.د. نبراس كامل هدايت  
طالبة الماجستير - ميسى وسام سبع

## ملخص البحث

إنَّ خماسي كرة القدم واحدة من الفعاليات التي تتطلب مجهوداً كبيراً تقيس أداء اللاعبين في أثناء المباراة على وفق أسلوب علمي مبني على أساس الملاحظة والتجريب، وهذا ما نلاحظه من خلال تزايد الاهتمام في لعبة خماسي كرة القدم وما تلاقيه من عناية من دول العالم كافة أدى إلى دفع الكثير من القائمين عليها إلى القيام بمزيد من البحث والدراسة للإفادة من العلوم الأخرى في تطوير اللعبة، وعليه فإن التعرف على التغيرات الوظيفية وفاعلية الأداء للاعبين من شأنه أن تساعدهم على تقويم أدائهم على العملية التدريبية وعلى فهم أسس تلك المتغيرات الوظيفية فضلاً عن تقويم أداء اللاعب في أثناء المباراة، لغرض تقويم حالة الرياضي الوظيفية التي تساعده على حل كثير من المشكلات الحيوية للرياضيين مثل تشخيص الحالة التدريبية ومدى امكانية السماح للرياضي بالاشتراك في التدريب والمنافسة.

ان الصوديوم الايون الموجب الرئيس خارج الخلايا اذ يؤدي دوراً أساسياً في الحفاظ على التوزيع الطبيعي للماء في خلايا الأنسجة كذلك المحافظة على ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب، وتكون ايونات الصوديوم ذات تأثير قاعدي مما تؤدي إلى توازن الحامضية والقاعدية في الجسم لذلك نلاحظ ان تبادل ايونات الصوديوم بأيونات الهيدروجين من أهم العمليات التي تؤدي إلى تحميض البول، كما يساعد الصوديوم على نقل الاياعات العصبية إلى العضلات

كما أنَّ الصوديوم هو المعدن الأكثر تأثراً بالتدريب الرياضي وإنْ أي نقص فيه يمكن أنْ يضعف الأداء عند الجهد البدني.

## الباب الأول

### 1- التعريف بالبحث:-

#### 1- [مقدمة البحث وأهميته:-]

إنَّ مزاولة الإنسان للنشاط البدني والحركي من الأمور الإيجابية في حياة الشخص، إذ ينعكس ذلك على حالته البدنية والصحية وبالتالي التكيف مع ظروف الحياة الكثيرة ومتطلباتها، وهذا هو سبب من أسباب ممارسة الرياضة بالنسبة للأفراد الاعتياديين الذين يريدون الحفاظ على حالتهم الصحية والبدنية والجسمانية، ولكن عندما يتعدى ذلك للحصول على الأرقام القياسية والمادية فان ذلك يتطلب وقفة من قبل الرياضي ومن يعملوا عليه من المدربين والباحثين على مستوى العلوم التطبيقية والعلمية سواء على الفرد أو البيئة المحيطة به التي يتاثر بها أداء الفرد، وعليه لابد من ان يكون هناك حلول في كيفية مواجهة هذه التغيرات التي تؤثر ويتأثر بها الجسم للحفاظ على الجسم أولاً ومن ثم تحقيق ما يرneau إليه الفرد من انجاز، وهذا ما نراه عند التدريب إذ تزداد الحاجة إلى الماء بسبب ما يفقده الجسم من سوائل عن طريق التعرق، إذ تكون كمية السوائل المفقودة بالتعرق باللغة التغيير تبعاً للنشاط الجسمي ولدرجة حرارة المحيط، فضلاً عن فقدان ونقص في تركيب الأملاح المعدنية مثل الصوديوم والبوتاسيوم في بلازما الدم والذي يؤدي إلى اضطرابات في عمل القلب وضعف عمل العضلات هذا

من جانب، ومن جانب آخر تكون الحاجة إلى الماء شديدة في حالة القيام بالجهد والنشاط الكبير. ان الصوديوم الايون الموجب الرئيس خارج الخلايا اذ يؤدي دوراً أساسياً في الحفاظ على التوزيع الطبيعي للماء في خلايا الأنسجة كذلك المحافظة على ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب، وتكون ايونات الصوديوم ذات تأثير قاعدي مما يؤدي إلى توازن الحامضية والقاعدية في الجسم لذلك نلاحظ ان تبادل ايونات

الصوديوم بأيونات الهيدروجين من أهم العمليات التي تؤدي إلى تحميض البول، كما يساعد الصوديوم على نقل الأليازات العصبية إلى العضلات كما أنَّ الصوديوم هو المعدن الأكثر تأثراً بالتدريب الرياضي وإنْ أي نقص فيه يمكن أنْ يضعف الأداء عند الجهد البدني.

ومن هنا تبرز أهمية البحث في التعرف على تأثير ملح الصوديوم من خلال قياس المتغيرات الوظيفية قيد الدراسات لدى لاعبي خماسي كرة القدم.

## ١- مشكلة البحث:-

لقد سعى العلماء جاهدين في كيفية تحقيق المستوى العالمي وتحقيق الأرقام القياسية وهذا ما دفعهم في البحث عن كل ما له صلة بالعملية التدريبية ومن خلال هذا البحث المتواصل أستنتج العلماء إلى أنَّ الغذاء الرياضي يجب أنْ يتواافق مع العملية التدريبية وليس بمعزل عنها، كذلك أشار بعض العلماء على أنَّ مساهمة الأملاح المعدنية في أثناء النشاط قد تصل إلى 30% وكذلك عملها المهم في المحافظة على الضغط الازموزي فضلاً عن التأثير على مستوى الرياضي.

ونرى أنَّ العملية التدريبية لا تتكامل إلا من خلال ارتباطها مع أنظمة أخرى مثل النظام الغذائي أو ارتباطها مع المكمالت الغذائية أو استخدام المشروبات الرياضية أو تناول الماء الذي يحتوي على بعض الأملاح المعدنية مثل الصوديوم وغيرها فمثلاً كانت هناك أنظمة غذائية مناسبة لنوع معين من الرياضيين فلا بد من أن يكون أو تكون هناك معايير مناسبة أو قريبة قدر الإمكان من الأملاح المعدنية في الماء لتناسب نوعاً من الرياضة في ذلك المكان وذلك الوقت أو ما يشابهها، لأنَّه بما معروف عنه إنَّ نقص الأملاح المعدنية سوف يؤثر على أداء النشاط البدني فانَّ اللاعب سوف يفقد كمية من الأملاح عن طريق التعرق وبصورة طبيعية سوف يلجم إلى تناول الماء لذلك يجب أن يكون الماء حاوي على كمية مناسبة من ملح الأملاح المعدنية من أجل تعويض الجسم بها. وتبرز مشكلة البحث من خلال قيام الباحثة بتحليل أنواع مختلفة من المياه التي يتناولها اللاعبين قبل المباراة وانتهاءها وبعدها، وجدت أنَّ نسب الأملاح المسجلة على المياه المتداولة غير حقيقة، وهذه هي جملة

الأسباب التي دعت الباحثة إلى استخدام ملح مختلفة من الأملاح المعدنية للتعرف على تأثير هذه الملح في الاحتفاظ بمستوى مناسب من الأملاح في الدم وكذلك الحفاظ على مستوى الاداء الذي قد يتتأثر بهذا الانخفاض في الملح لذا عمدت الباحثة القيام بهذه الدراسة لأهميتها العلمية والتطبيقية.

### 3-1 هدف البحث:

- تعرف تأثير تناول ملح الصوديوم في بعض المتغيرات الوظيفية للاعبين خماسي كرة القدم.

### 4-1 فرض البحث:-

- هناك فروق ذات دلالة معنوية بين الاختبارات القبلية والبينية والبعدية في بعض لمتغيرات الوظيفية للاعبين خماسي كرة القدم وللمجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح الاختبارات البعدية.

### 5-1 مجالات البحث:-

1-5-1 المجال البشري: لاعبو منتخب جامعة ديالى خماسي كرة القدم بعدد (12) لاعباً.

5-2 المجال الزمني: المدة الزمنية من 2013/1/30 ولغاية 2013/12/2.

5-3 المجال المكاني: القاعة الرياضية في التربية الرياضية - جامعة ديالى. مختبر الفسلجة - كلية التربية الرياضية - جامعة ديالى. مختبر دائرة الماء - دائرة ماء ديالى

## الباب الثاني

### 2- الدراسات النظرية والمشابهة:

#### 2-1 الدراسات النظرية:

##### 1-2-1 الصوديوم $Na^+$

يتواجد الصوديوم في الطبيعة متحداً مع الكلور مكوناً كلوريد الصوديوم كما انه يعد الايون الأساس في سوائل الجسم وهو موجود خارج الخلايا<sup>(1)</sup>.

وتبلغ نسبته في الجسم 64 غم، ويحتاج الشخص الذي يتراوح عمره ما بين 90-15 عاماً إلى 1100 - 3200 ملي غم يومياً. "ويعد (Na) الصوديوم اكثر ايونات أملاح خارج الخلية وفرة ويمثل تقريباً 90% من الايونات الموجبة خارج الخلية، كما انه ضروري لنقل الايعازات والإشارات في الأنسجة العصبية والعضلية، ويلعب أيضاً بحركته دوراً مهماً في توازن السوائل والأملاح ويحدث فقدان الصوديوم من الجسم من جراء التعرق المفرط والإدرار والحرقوق"<sup>(2)</sup>.

كما أنَّ الصوديوم "هو المعدن الأكثر تأثراً بالتدريب الرياضي وإن أي نقص فيه يمكن أن يضعف الأداء عند الجهد البدني"<sup>(3)</sup>.

لقد أظهرت الدراسات أنَّ الصوديوم المعدن الأكثر تأثيراً بالتمرينات الرياضية وإن النقص فيه يمكن ان يضعف الأداء، وتدل كمية الصوديوم الواطئة في المصل على النفاد الكلي لهذا الملح للجسم وفي حالات كهذه من نقص الصوديوم في المصل يحصل فقدان للماء أيضاً ويكون واضحاً بفقدان الجسم من وزنه بسرعة<sup>(4)</sup>.

#### 2-1-2 المعايير الوظيفية في الدم:

##### 1. الضغط الدموي الشرياني:

<sup>(1)</sup> ر.ف. بوترام؛ **التغذية الصحية للإنسان**، القاهرة : الدار العربية للنشر والتوزيع، 1985.

<sup>(2)</sup> Gerard J. Tortora, Wigholas P; Anagnostakos: **Principles of anatomy and physiology**. Ross copyright, 4th edition, 1984. P: 687.

<sup>(3)</sup> عبد الله بحر فياض؛ تأثير التدريبات اللاهوائية بالأسلوب التكراري في بعض المتغيرات البيوكيميائية واعداد عدائي 100 متر، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، 2002، ص.22.

<sup>(4)</sup> فاضل كامل مذكور؛ تأثير التدريب الرياضي في تركيز مكونات العرق الرئيسية ومثيلاتها في البلازمما وعلاقتها بنظام انتاج الطاقة في الجسم، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضي، 1997، ص.31.

يعد من المؤشرات الفسلجية سواء في عالم الرياضة أو لأنه مؤشر له علاقة وطيدة بمهام القلب والدورة الدموية فمن المعروف ان عملية إيصال الدم إلى الأنسجة والخلايا بعيدة عن القلب وحركة الدم في داخل الأوعية الدموية لا يمكن ان تتم بدون ضغط كاف ويمكن تقسيم الضغط الدموي إلى:

#### أ. الضغط الدموي الانقباضي:

وهو الضغط الذي يتولد نتيجة لقوة انقباض البطين ودفع الدم إلى داخل الشرايين مضاف إليها مقاومة جدران الشرايين لمرور الدم ويبلغ الضغط الدموي الانقباضي الاعتيادي عند البالغين (120 – 140) مليمتر زئبقي. ويؤثر على الضغط الانقباض لأنّه يؤثّر بالمؤثرات الخارجية (غير مستقر) فهو يرتفع مثلاً عند الجهد (التعب) والتوتر العصبي النفسي وتتناول الملح بشكل كبير.

#### ب. الضغط الدموي الانبساطي:

وهو الضغط الذي يتولد نتيجة لأنبساط البطينين ومرور الدم من الأذينين إلى البطينين فضلاً عن عودة جزء من الدم في الشريان الأبهري والبطين الأيسر وارتطامه بالصمام. ويعرف أيضًا بالضغط الواطئ وهو أكثر استقراراً وأكثر أهمية من الناحية الصحية ويعادل (70 – 85) مليمتر زئبقي.

### الباب الثالث

#### - منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:-

##### 1-3 منهج البحث:-

استخدمت الباحثة منهج التجريبي بأسلوب المجموعتين لملائمتها طبيعة المشكلة المراد حلها.

##### 2-3 عينة البحث:-

ان من الأمور المهمة التي تقع على عاتق الباحث هي تحديد عينة البحث ومفرداته لذلك تم اختيار عينة البحث بالأسلوب العمدي من لاعبي منتخب جامعة ديالي بخمساسي كرة القدم والبالغ عددهم (20) لاعباً وقد تم تقسيم العينة إلى مجموعتين متتساويتين تمثل الأولى المجموعة الضابطة والثانية المجموعة التجريبية .

### **3-3 الأجهزة والأدوات والوسائل المستخدمة في البحث:-**

#### **3-3-1 الأجهزة المستخدمة في البحث:-**

- جهاز السيسيل لقياس نسبة الأملاح المعدنية في الدم
- جهاز لقياس الضغط الدموي والنبض عدد 4.
- كاميرا تصوير سامسونج.

#### **3-3-2 الأدوات المستخدمة في البحث:-**

"الأدوات هي الوسائل التي يستطيع بها الباحث جمع البيانات وحل المشكلة"

لتحقيق أهداف البحث مهما كانت تلك الأدوات من بيانات وعينات وأجهزة"<sup>(1)</sup>.

- كرات خماسي عدد 2.

- ملعب خماسي كرة القدم.

### **3-4 الإجراءات الخاصة بتحليل المياه المعدنية:-**

نظرًا لوجود ضعف في بعض جوانب عمل الرقابة الصحية على معامل المياه المعدنية المعباء قامت الباحثة في يوم الثلاثاء المصادف 12/2/2013 بأخذ عينات مختلفة المنشأ من المياه المعدنية المعباء حيث شملت الأنواع الآتية (الروضتين، اكوافينا، منى، الروفيان) بغية إجراء الفحوصات الكيميائية المختبرية عليها في المختبرات بدائرة البيئة والمختبرات الكيميائية في دائرة الماء في محافظة ديرالي حيث قامت الباحثة بتسليم عبوات المياه المعدنية الأربع إلى المهندس الكيميائي المختص في الدائريتين لإجراء الفحوصات اللازمة عليها وبعد مرور يومين تم استلام نتائج التحليل، والتي تم اعتمادها من قبل الباحثة في تعزيز مشكلة البحث قامت الباحثة بعرض نتائج التحليل على الكيميائيين المختصين(\*) في هذا المجال وقد تبين أن أفضل أنواع المياه المعدنية التي تحتوي على نسب جيدة هي مياه الروضتين (كويتية المنشأ) كأفضل أنواع المياه المعدنية التي يجب استخدامها لغرض إكمال إجراءات البحث.

(١) وجيه محجوب ؛ طائق البحث العلمي ومناهجه. الموصى : مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، 1988 ، ص 132.

(\*) ينظر: ملحق (7).

### **3-6 تحديد المتغيرات الوظيفية الخاصة بالبحث:-**

قامت الباحثة باعتماد المتغيرات الوظيفية الخاصة بالضغط الانقباضي والانبساطي

### **3-7 التجارب الاستطلاعية:-**

أجرت الباحثة تجربتها الاستطلاعية على عينة مكونة من (8) لاعبين من خارج عينة البحث على شكل مباراة خماسي كرة القدم حيث تألفت المباراة من شوطين يتألف كل شوط من 20 دقيقة بفارق فترة راحة عشر دقائق بين الشوطين، وكانت التجربة الاستطلاعية في يوم الأربعاء الموافق 2013/4/3 في الساعة العاشرة صباحاً، إذ كان الغرض من التجربة الاستطلاعية:

- معرفة معدل كمية الماء التي يستطيع كل لاعب تناوله في أثناء المباراة كاملة.
- التأكد من كفاءة فريق العمل المساعد
- معرفة الوقت المخصص لاختبار

### **3-6 الإجراءات الميدانية للبحث:-**

#### **3-6-1 الاختبار القبلي:-**

تم إجراء الاختبار القبلي لعينة البحث يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30 في القاعة المغلقة في كلية التربية الرياضية جامعة ديالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً، إذ تم تطبيق الاختبار القبلي على شكل مباراة كاملة للعبة خماسي كرة القدم حيث تألفت المباراة من شوطين كل شوط من عشرين دقيقة بفارق فترة راحة عشر دقائق بين الشوطين، وقد جرى في هذا الاختبار ان كلا الفريقين (المجموعة الضابطة والتجريبية) تناولوا الماء العادي المعتادين على شربه في كل المباريات الرسمية والمحليّة والودية وقد تم تحديد نوعية الماء المستعمل من قبل الباحثة (ماء الروضتين) وذلك لكونه من أفضل أنواع المياه التي تحتوي على نسب حقيقية وصادقة من الأملاح المعدنية وقد تناول كل لاعب من (1,5-2) لتر وكانت نسبة تركيز الصوديوم المضافة (5) ملغم للكمية المذكورة من الماء وكانت فترة

تناول اللاعبون للماء هي من بداية المباراة إلى نهايتها وبفترات متقطعة وحسب قابلية كل لاعب واحتياجه إلى شرب الماء .

### -3-7-1 الاختبار البعدى (المباراة الثانية):-

تم إجراء الاختبار البعدى(المباراة الثانية) بعد مرور 7 أيام على الاختبار القبلى (المباراة الأولى) وذلك من أجل عودة اللاعب إلى حالته الطبيعية والاستشفاء التام وقد حرصت الباحثة على إجراء المباراة الثانية في ظروف مشابهة من حيث نفس درجة الحرارة والرطوبة التي كانت في المباراة الأولى، إذ أجريت المباراة الثانية لعينة البحث يوم الثلاثاء المصادف 7/5/2013 الساعة العاشرة صباحاً في القاعة المغلقة في كلية التربية الرياضية بجامعة دىالى حيث لعب الفريقين مباراة من شوطين كل شوط كان وقته 20 دقيقة مع فترة راحة عشر دقائق بين الشوطين، وقد تناولت المجموعة الضابطة (الفريق الأول) ماء الروضتين العادي من دون إضافة الصوديوم أما المجموعة التجريبية فقد تناولت الماء المعد من قبل الباحثة والحاوى على ملح من الصوديوم المضافة له وقد تناول كلا المجموعتين الماء من بداية المباراة إلى نهايتها وبمعدل (1.5-2 لتر ماء لكل لاعب، وقد كانت الباحثة ملتزمة بالإجراءات والظروف التي اتبعت في المباراة الأولى من حيث الزمان والمكان وطريقة التنفيذ والأجهزة والأدوات .

### -3-8-1 الإجراء الأولى قبل بداية الشوط الأول:-

قامت الباحثة في التجربة الرئيسية (المباراة الأولى والثانية) وبمخابر الفسلجة في كلية التربية الرياضية جامعة دىالى المجاور للقاعة المغلقة بتطبيق هذا الإجراء، إذ تضمن سحب عينات دم من اللاعبين بمقدار (CC5) من كل لاعب قبل جهد المباراة (وقت الراحة) أي بدون أداء أي جهد بدنى وقد تم سحب الدم من قبل فريق العمل الطبي المختص من منطقة العضد ومن دون استخدام الرباط الضاغط وهم في وضع الجلوس على الكرسي واليد او العضد بمستوى الصدر تقريباً، ثم إفراغ الدم من الحقن إلى أنابيب حفظ الدم التيوبرات البيضاء الخالية من مادة الـ (EDAT)

والمكتوب عليها أسماء اللاعبين، ورقم المباراة وحفظها في صندوق التبريد المخصص.

### 9-3 طريقة فحص الصوديوم:

تم قياس الصوديوم حسب ما موضح في كت الفحص (1).

### 10-3 الوسائل الإحصائية:-

استخدمت الباحثة الحقيقة الاحصائية SPSS لمعالجة البيانات.

## الباب الرابع

### 4 - عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:-

#### 1-4 عرض وتحليل نتائج المتغيرات الوظيفية للمجموعة التجريبية:-

##### جدول (3)

يبين الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية للمتغيرات الوظيفية(الضغط الانبساطي,الانقباضي) للمجموعة التجريبية في المباراة الأولى (تناول الماء العادي) والمباراة الثانية (تناول الماء الحاوي على الأملام)

المباراة الثانية (تناول ماء حاوي على الأملام)		المباراة الأولى (تناول ماء عادي)		وحدة القياس	المعالجات	المتغيرات
ع	-س	ع	-س			
1.032	8.333	0.752	8.166	mm\hg	قبل	الضغط الانبساطي
1.378	7.500	0.632	8.000	Mm\hg	بين	
1.632	7.333	0.000	8.000	Mm\hg	بعد	
1.048	13.500	0.516	11.666	Mm\hg	قبل	الضغط الانقباضي
1.329	12.166	2.073	12.500	Mm\hg	بين	
1.200	12.333	1.224	12.500	Mm\hg	بعد	

(1) هذه الطريقة بحسب SPINREACT, S.A/S.A.U.Ctra. santa Coloma.

من خلال نتائج الجدول (3) الخاص بالمجموعة التجريبية في المباراتين الأولى والثانية تبين إن قيم الوسط الحسابي للضغط الانبساطي بلغت في الاختبارات القبلية (المباراة الأولى) (8.166) وبانحراف معياري قدره (0.752) في حين بلغ الوسط الحسابي في الاختبار البين (8.000) وبانحراف معياري قدره (0.632) أمّا في الاختبار البعدي بلغ الوسط الحسابي (8.000) وبانحراف معياري قدره (0.000).

أما نتائج المجموعة التجريبية في المباراة الثانية فقد بلغ الوسط الحسابي إن قيم الوسط الحسابي للضغط الانبساطي (8.333) وبانحراف معياري قدره (1.032) في حين بلغ الوسط الحسابي في الاختبار البين (7.500) وبانحراف معياري قدره (1.378) أمّا في الاختبار البعدي بلغ الوسط الحسابي (7.333) وبانحراف معياري قدره (1.632).

ويظهر الجدول نتائج الضغط الانقباضي الخاص بالمجموعة التجريبية في المباراة الأولى حيث بلغت قيم الوسط الحسابي بلغت في الاختبارات القبلية(11.666) وبانحراف معياري قدره (0.516) في حين بلغ الوسط الحسابي في الاختبار البين (12.500) وبانحراف معياري قدره (2.073) أمّا في الاختبار البعدي فقد بلغ الوسط الحسابي (12.500) وبانحراف معياري قدره (1.224).

اما نتائج المجموعة التجريبية للمباراة الثانية فقد بلغ إن قيم الوسط الحسابي للضغط الانقباضي في الاختبار القبلي(13.500) وبانحراف معياري قدره (1.048) في حين بلغ الوسط الحسابي في الاختبار البين (12.166) وبانحراف معياري قدره (1.329)اما في الاختبار البعدي بلغ الوسط الحسابي (12.333) وبانحراف معياري قدره (1.200).

#### الجدول(4)

يبين فرق الأوساط وانحرافات الفروق وقيمة (t) المحسوبة ونسبة الخطأ للمتغيرات الوظيفية (الضغط الانبساطي والانقباضي) للمجموعة التجريبية

الدالة	نسبة الخطأ	قيمة t	ع ف	- س ف	وحدة القياس	المتغيرات	
غير معنوي	0.611	0.542	0.752	0.166	Mm\hg	قبل	الضغط الانبساطي
غير معنوي	0.296	1.168	1.048	0.500	Mm\hg		
غير معنوي	0.363	1.000	1.632	0.666	Mm\hg		
معنوي	0.012	3.841	1.169	1.833	mm\hg	قبل	الضغط الانقباضي
غير معنوي	0.750	0.337	2.422	0.333	Mm\hg		
غير معنوي	0.741	0.349	1.169	0.166	Mm\hg		

من خلال نتائج الجدول (11) تبين توافر فروق غير معنوية للضغط الانبساطي في الاختبار القبلي في المباراتين الأولى والثانية اذ بلغ فرق الأوساط الحسابية في الاختبار القبلي بين المباراتين (0.166) وبانحراف معياري للفروق (0.752)، وبلغت قيمة (t) المحسوبة (0.542) في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.611). كذلك تبين توافر فروق غير معنوية في الاختبار البين بين نتائج الاختبارين في المباراة الأولى والثانية ، إذ بلغ فرق الأوساط الحسابية بين نتائج الاختبارين للمباراتين (0.500) وبانحراف معياري للفروق (1.048)، وبلغت قيمة (t) المحسوبة (1.168) في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.296). وكذلك تبين توافر فروق غير معنوية في الاختبار البعدى بين نتائج الاختبارين في المباراتين الأولى والثانية، إذ بلغ فرق الأوساط الحسابية بين نتائج الاختبارين

للمباراتين(0.666) وبانحراف معياري للفروق (1.632)، وبلغت قيمة (t) المحسوبة (1.000) في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.363).

كما تبين أيضاً توافر فروق غير معنوية للضغط الانقباضي في الاختبار القبلي بين نتائج الاختبارين للمباراة الأولى والثانية ، إذ بلغ فرق الأوساط الحسابية بين نتائج الاختبارين للمباراتين (1.833) وبانحراف معياري للفروق (1.169)، وبلغت قيمة (t) المحسوبة (3.841) في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.012). تبين أيضاً توافر فروق غير معنوية في الاختبار البين بين نتائج الاختبارين في المباراة الأولى والثانية ، إذ بلغ فرق الأوساط الحسابية بين نتائج الاختبارين للمباراتين(0.333) وبانحراف معياري للفروق (2.422)، وبلغت قيمة (t) المحسوبة (0.337) في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.750). وتبيّن أيضاً توافر فروق غير معنوية في الاختبار البعدى بين نتائج الاختبارين في المباراة الأولى والثانية، إذ بلغ فرق الأوساط الحسابية بين نتائج الاختبارين للمباراتين(0.166) وبانحراف معياري للفروق (1.169)، وبلغت قيمة (t) المحسوبة (0.349) في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.741).

#### - 1-4 مناقشة نتائج المتغيرات الوظيفية للمجموعة التجريبية:-

##### 1. الضغط الانبساطي:

من خلال ما تقدم من عرض وتحليل نتائج الضغط الانبساطي للمجموعة التجريبية في المباراتين الأولى والثانية نلاحظ توافر فروق غير معنوية في الاختبارات (قبل، بين، بعد) وتعزو الباحثة عدم توافر فروق غير معنوية بين نتائج الاختبارات (قبل، بين، بعد) للمجموعة التجريبية في المباراتين بأنّها حالة صحية جيدة، بحيث حافظت الباحثة في أجراءها الخاص بتناول الماء الحاوي على الأملام من قبل المجموعة التجريبية لأنّ تكون المتغيرات الوظيفية ضمن المستوى الطبيعي على الرغم من توافر انخفاض قليل في مستوى الضغط الانبساطي والذي هو باتجاه الحالة المثلثي، والذي تعزوه الباحثة أيضاً إلى حالة التوسيع في الأوعية نتيجة التكيف وتحديداً التوسيع في الأوعية الدموية في العضلات العاملة، وهذا جاء متواافقاً مع ما

وأشار إليه (Lary) بأنّ "سبب انخفاض الضغط الانبساطي بعد الجهد هو انخفاض مقاومة الشرايين نتيجة التوسيع الوعائي الذي يحدث في شرايين العضلات العاملة، إذ تؤدي قلة المقاومة المحيطة إلى انتقال كميات أكبر من الدم، وذلك من الشرايين إلى الأوعية الشعرية الدموية في العضلات مع انخفاض بسيط في الضغط الانبساطي"<sup>(1)</sup>.

## 2. الضغط الانقباضي:

من خلال ما تقدم من عرض وتحليل لنتائج الضغط الانقباضي للمجموعة التجريبية في المباراتين الأولى والثانية نلاحظ توافر فروق معنوية للاختبار الأول (قبل)، وتوافر فروق غير معنوية في الاختبارين (بين، بعد)، وهذا ما يدل على تأثير تناول الماء الحاوي على الأملاح المعدنية المضافة، وإنَّ الفرق المعنوي للاختبار الأولى (قبل) بين المباراة الأولى والثانية، والتي كانت لصالح المباراة الثانية تؤكد تأثير الضغط الدموي نتيجة تناول الماء الحاوي على الأملاح المعدنية، فارتفع الضغط الدموي الانقباضي قبل الجهد في المباراة الثانية، كما كان عليه قبل الجد في المباراة الأولى، وتعزو الباحثة إلى أنَّ تلك الزيادة بسبب ما أحدثته الأملاح المعدنية الصوديوم والبوتاسيوم من خلال زيادة عمل مضخة القلب، وبالتالي الزيادة في الدفع القلبي، ومن ثم زيادة الضغط الدموي، وهذا الرأي مقاربًا لما أشار إليه كل من (محمد نصر الدين)، و(هزاع محمد) بأنَّ "الارتفاع ضروري جدًا لكي يزيد ضغط التشبع perfusion pressure نفسه يزيد من الضغط الانقباضي في الجسم"<sup>(2)(3)</sup>.

كما أنَّ عودة الضغط الانقباضي إلى معدل مقارب للمعدل الذي كان عليه قبل أداء الجهد البدني بعد مدة من (3-5) دقائق من نهاية الجهد في الاختبار البعدي يعد مؤشرًا إيجابيًّا لسرعة العودة إلى الحالة الطبيعية في مرحلة الاستشفاء

(1) Larry. G. S.; Essential of exercise physiology. Burgess publishiry company, 1981, p.106.

(2) محمد نصر رضوان؛ المدخل إلى فسيولوجيا الجهد البدني. القاهرة: دار الفكر العربي، 1998، ص.73.

(3) هزاع محمد المهازع؛ التجارب معملية في وظائف الجهد البدني. الاتحاد السعودي للطب الرياضي، ب.م، 1997، ص.97.

(Recovery)، فالجهد البدني يؤدي إلى زيادة ضغط الدم الانقباضي والذي يقل في مدة الشفاء بعد أداء الجهد والعودة إلى الحالة الطبيعية<sup>(1)</sup>

## ٤\_٢ عرض وتحليل نتائج المتغيرات الوظيفية للمجموعة الضابطة:-

### الجدول(5)

يبين الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية بالمتغيرات الوظيفية (الضغط الانبساطي والانقباضي) ن للمجموعة الضابطة في المباراة الأولى (تناول الماء العادي) والمباراة الثانية (تناول الماء الحاوي على الأملاح)

المباراة الثانية (تناول الماء العادي)		المباراة الأولى (تناول الماء العادي)		وحدة القياس	المعالجات	المتغيرات
ع	-س	ع	-س			
1.414	8.000	0.516	8.333	Mm\hg	قبل	الضغط الانبساطي
1.760	7.500	1.366	7.666	Mm\hg	بين	
1.834	9.166	1.834	8.833	Mm\hg	بعد	
1.329	12.833	0.0000	12.000	Mm\hg	قبل	الضغط الانقباضي
1.751	12.666	1.169	12.833	Mm\hg	بين	
1.366	13.666	1.264	13.000	Mm\hg	بعد	

من خلال نتائج الجدول (16) الخاص بالمجموعة الضابطة في المباراتين الأولى والثانية تبين إن قيم الوسط الحسابي للضغط الانبساطي بلغت في الاختبارات القبلية (المباراة الأولى) (8.333) وبانحراف معياري قدره (0.516) في حين بلغ الوسط الحسابي في الاختبار بين (7.666) وبانحراف معياري قدره (1.366) أمّا في الاختبار البعدي بلغ الوسط الحسابي (8.833) وبانحراف معياري قدره (1.834).

أما نتائج المجموعة الضابطة في المباراة الثانية فقد بلغ قيم الوسط الحسابي للضغط الانبساطي في الاختبار القبلي (8.000) وبانحراف معياري قدره (1.414).

(1)قاسم حسن حسين، مصدر سبق ذكره، ص110.

في حين بلغ الوسط الحسابي في الاختبار البين (7.500) وبانحراف معياري قدره (1.760) أمّا في الاختبار البعدى بلغ الوسط الحسابي (9.166) وبانحراف معياري قدره (1.834).

ويظهر الجدول نتائج الضغط الانقباضي الخاص بالمجموعة الضابطة في المباراة الأولى فقد بلغ قيم الوسط الحسابي للضغط الانقباضي في الاختبارات القبلية (12.000) وبانحراف معياري قدره (0.0000) في حين بلغ الوسط الحسابي في الاختبار البين (12.833) وبانحراف معياري قدره (1.169) أمّا في الاختبار البعدى بلغ الوسط الحسابي (13.000) وبانحراف معياري قدره (1.264).

أما نتائج المجموعة الضابطة للمباراة الثانية فقد بلغت قيم الوسط الحسابي للضغط الانقباضي في الاختبار القبلي (12.833) وبانحراف معياري قدره (1.329) في حين بلغ الوسط الحسابي في الاختبار البين (12.666) وبانحراف معياري قدره (1.751) أمّا في الاختبار البعدى بلغ الوسط الحسابي (13.666) وبانحراف معياري قدره (1.366).

### الجدول (6)

يبين فرق الأوساط وانحرافات الفروق وقيمة ( $t$ ) ونسبة الخطأ للمتغيرات الوظيفية  
(الضغط الانبساطي والانقباضي) للمجموعة الضابطة

الدالة	نسبة الخطأ	قيمة $t$	ع-ف	س-ف	وحدة القياس	المعالجات	المتغيرات
غير معنوي	0.638	0.500	1.632	0.333-	Mm\hg	قبل	الضغط الانبساطي
غير معنوي	0.741	0.349	1.169	0.1666-	Mm\hg	بين	
غير معنوي	0.576	0.598	1.366	0.333	Mm\hg	بعد	
غير معنوي	0.185	1.536	1.329	0.833	Mm\hg	قبل	الضغط الانقباضي
غير معنوي	0.695	0.415	0.983	0.166-	Mm\hg	بين	
غير معنوي	0.235	1.348	1.211	0.666	Mm\hg	بعد	

من خلال نتائج الجدول (17) تبين توافر فروق غير معنوية للضغط الانبساطي في الاختبار القبلي إذ بلغ فرق الأوساط الحسابية في الاختبار القبلي بين المباراتين (0.333) وبانحراف معياري للفروق (1.632)، وبلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (0.500) في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.638). إذ تبين توافر فروق غير معنوية في الاختبار البين بين نتائج الاختبارين في المباراتين الأولى والثانية، إذ بلغ فرق الأوساط الحسابية بين نتائج الاختبارين للمباراتين (0.1666) وبانحراف معياري للفروق (1.169)، وبلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (0.349) في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.741). وكذلك تبين توافر فروق غير معنوية في الاختبار البعدى بين نتائج الاختبارين في المباراتين الأولى والثانية ، إذ بلغ فرق الأوساط الحسابية بين نتائج الاختبارين للمباراتين (0.333) وبانحراف معياري للفروق (1.366)، وبلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (0.598) في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.576).

كما تبين أيضاً توافر فروق غير معنوية للضغط الانقباضي في الاختبار القبلي بين نتائج الاختبارين في المباراة الأولى والثانية اذ بلغ فرق الأوساط الحسابية بين نتائج الاختبارين للمباراتين (0.833) وبانحراف معياري للفروق (1.329)، وبلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (1.536) في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.185). وتبيّن أيضاً توافر فروق غير معنوية في الاختبار البين بين نتائج الاختبارين في المباراة الأولى والثانية ، إذ بلغ فرق الأوساط الحسابية بين نتائج الاختبارين للمباراتين (0.166) وبانحراف معياري للفروق (0.983)، وبلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (0.415) في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.695). و تبيّن أيضاً توافر فروق غير معنوية في الاختبار البعدى بين نتائج الاختبارين في المباراة الأولى والثانية ، إذ بلغ فرق الأوساط الحسابية بين نتائج الاختبارين للمباراتين (0.666) وبانحراف معياري للفروق (1.211)، وبلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (1.348) في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.235).

#### 4-2-1 مناقشة نتائج المتغيرات الوظيفية للمجموعة الضابطة:-

##### 1. الضغط الانبساطي:

من خلال ما تم من عرض وتحليل النتائج المتغيرات الوظيفية (الضغط الانبساطي) وللختارات الثلاث (قبل، بين، بعد) للمجموعة الضابطة تبين بأنّ هناك توافر فروق غير معنوية لمتغير الضغط الواطئ، اذ كانت جميع المعدلات ضمن الحد الطبيعي في الشخص البالغ في أثناء الراحة، والذي يبلغ (80ملم/ز)، وتعزو الباحثة ذلك إلى تكيف الأداء الوظيفي لأجهزة الجسم الداخلية وقيامها بوظائفها الطبيعية خلال الراحة وبعد الجهد البدني، أمّا في الاختبار البعدي (بعد الجهد) فقد تبين للباحثة أنّه على الرغم من أنّ الزيادة جاءت لصالح الاختبار البعدي إلا أنّ الزيادة كانت بسيطة الفروق ولم تكن كبيرة عنها في الاختبار القبلي، وتعزو الباحثة ذلك إلى أنّ الضغط الانبساطي يعبر عن الضغط داخل الشرايين في حالة كون القلب في وضع الانبساط ويتفق رأي الباحثة مع كل من (Dirix,Kuttegn) إذا ثبتنا أنّه في "أثناء أداء التمارين الديناميكية مثل الركض والدراجات يزداد ضغط الدم الانقباضي بصورة تصاعدية في أثناء ازدياد شدة هذه التمارين نتيجة لزيادة اتساع الأوعية الدموية في جميع الأنسجة بينما يقل الضغط الانبساطي بدرجة طفيفة"<sup>(1)</sup>.

وترى الباحثة إلى انه عدم تأثر الضغط الانبساطي بعد أداء الجهد البدني انه مسألة طبيعية لدى الشخص السليم صحياً، او انه يتغير تغيراً محدوداً، أو قد لا يتغير، وذلك لأنّ ضغط الدم الانبساطي (الواطئ) يعبر عن الضغط داخل الشرايين في حال كون القلب في وضع الانبساط، ويتفق هذا مع كل من (Fox, W.Bower) و(Fisher, G.A andJensen G.R) ، إذ اشارا إلى: "أنّ ضغط الدم الانبساطي لا يتتأثر بالتمرين أو الجهد البدني، وفي الوقت الذي يصل فيه ضغط الدم الانقباضي نتيجة للجهد إلى (180ملم/زئبق) ويتبين توافر قراءات ثانية لضغط الدم الانبساطي (80) ملم زئبق وذلك لأنّه في يقاس في حال كون القلب في وضع الراحة"<sup>(2)(3)</sup>.

---

(1)Dirix A, Kuttegn R.O. K; Olympic book of sport medicine 1st, published west Germany, 1988, p142.

(2) Fox, W. Bower R.; Sportphysiology, 3ed, Edition, Brown publish Lowa, 1988, p.256.

(3) Fisher, G.A. and Jensen G.R.; Scientific Basis of Athletic conditioning, th3 edition leap, febbign, philgdephid, 1990, p.139.

## 2. الضغط الانقباضي:

من خلال ما تقدم من عرض وتحليل نتائج المتغيرات الوظيفية (الضغط العالي) تبين بأنّ هناك فروق غير معنوية وللختبارات الثلاثة (قبل، بين، بعد) في المباراتين الأولى والثانية وللمجموعة الضابطة، وتعزو الباحثة ذلك إلى تكيف الأجهزة الداخلية للجسم (القلب، والشرايين، والأوردة) في القيام بعملها الطبيعي، إذ تتولى القيام بدفع الدم إلى أجزاء الجسم كافة للحصول على حاجتها من الغذاء وباقى المواد الضرورية لعمليات التمثيل الغذائي، إذ لم تظهر فروق كبيرة في معدل الضغط العالى، إذ كانت جميع المعدلات مقاربة للحد الطبيعي في الشخص البالغ في أثناء الراحة التي بلغت ما بين (120-130) ملم/ز.

وهذا ما أكدته (كاظم جابر أمير) "في إنّ أعلى ضغط يمكن قياسه هو الضغط الانقباضي في أثناء الراحة والذي يبلغ في الحالة الطبيعية تقريباً (120ملم/ز) أو أعلى بقليل في الشخص الصحي<sup>(1)</sup>، كما تعزو الباحثة ذلك إلى المرحلة العمرية اذ ما يميز مرحلة الشباب هي مرحلة اللياقة والصحة وبما ان جميع افراد العينة كانت بعمر متقارب مع تمعتهم باللياقة الصحية فلهذا لم توجد اي فروق في متغير الضغط الانقباضي. ، وبهذا الخصوص أكد (Mc. Cinty) "أنّ معدل الضغط الدموي يتغير مع العمر والجنس"<sup>(2)</sup>.

كذلك أظهرت نتائج اختبار بعد الجهد لمتغير الضغط الانقباضي عن توافر فروق غير معنوية لدى مجموعة البحث، وتعزو الباحثة سبب ذلك إلى أنّ الزيادة في معدل الضغط الدموي ناتجة عن زيادة معدل ضربات القلب، إذ إنّ معدل ضربات القلب يتسارع في أثناء الجهد البدني، بسبب الزيادة الحاصلة في الناتج القلبي لحاجة العضلات إلى الأوكسجين والغذاء اللذان ينتقلان عبر الشعيرات الدموي الى الأنسجة العضلية عن طريق الدم، وهذا يتفق مع ما اشار اليه AstrandpOrolah (إلى أنّ الضغط الدموي بعد المجهود البدني يزداد ازيداً طردياً مع زيادة كمية

(1) كاظم جابر أمير؛ المصدر السابق، ص261.

(2) Mc. Cinty J. Bet, al. Blood pressure in Athletic Traning& sport Medicine. Pub. By American Academy of orthopedic surgeons, U.S.A, 1991, p.159-160.

الأوكسجين القصوي المستخدمة، وقد يصل إلى أكثر من (200) مل/ز ولكن عند ازدياد الجهد تزداد سعة الأوعية الدموية في العضلات القائمة بالجهد، مما يؤدي إلى نقصان المقاومة في هذه الأوعية نتيجة لجريان الدم فيها، ولكن ازدياد كمية الدم المدفوعة من قبل القلب خلال الجهد البدني يتغلب على هذا المؤشر نقصان المقاومة، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وليس نقصانه<sup>(1)</sup>.

### 4-3 عرض وتحليل نتائج المتغيرات الوظيفية للمجموعة الضابطة والتجريبية:-

الجدول (7)

يبين الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة ( $t$ ) ونسبة الخطأ والدالة في الاختبارات في المbarاة الثانية بالمتغيرات الوظيفية (الضغط الانبساطي والانقباضي) للمجموعتين الضابطة والتجريبية

الدالة	نسبة الخطأ	قيمة	المجموعة الضابطة (المbarاة الثانية)		المجموعة التجريبية (المbarاة الثانية)		وحدة القياس	المعالجات	المتغيرات
			ع	-س-	ع	-س-			
غير معنوي	0.651	0.466	1.414	8.000	1.032	8.333	Mm/hg	قبل	الضغط الانبساطي
غير معنوي	1.000	0.000	1.760	7.500	1.378	7.500	Mm/hg	بين	
غير معنوي	0.097	1.828	1.834	9.166	1.632	7.33	Mm/hg	بعد	
غير معنوي	0.358	0.964	1.329	12.833	1.048	13.500	Mm/hg	قبل	الضغط الانقباضي
غير معنوي	0.590	0.557	1.751	12.666	1.329	12.166	Mm/hg	بين	
غير معنوي	0.104	1.789	1.366	13.666	1.211	12.333	Mm/hg	بعد	

(1) AstrandpOrolah; **Text Book of work physiology**, U.S.A, 1971, p.191.

من خلال نتائج الجدول الخاص بالأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة( $t$ ) المحتسبة ونسبة الخطأ والدلالة بين نتائج الاختبارات بالمتغيرات الوظيفية في المباراة الثانية للمجموعتين الضابطة والتجريبية نرى ان :

#### **الضغط الانبساطي:**

إذ تبين من خلال الجدول أعلاه بأنه هناك فروق غير معنوي بين نتائج المجموعة الضابطة والتجريبية في المباراة الثانية حيث بلغت نتائج المجموعة التجريبية في المباراة الثانية للاختبار القبلي بوسط حسابي الوسط الحسابي (8.333) وبانحراف معياري قدره (1.032) أمّا نتائج المجموعة الضابطة في المباراة الثانية للاختبار القبلي فقد بلغ الوسط الحسابي لها (8.000) (وبانحراف معياري (1.414) وبلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (0.466)، في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.651). كما تبين كذلك بلغت نتائج المجموعة التجريبية في المباراة الثانية للاختبار البين بوسط حسابي(7.500) وبانحراف معياري قدره (1.378) أمّا نتائج المجموعة الضابطة في المباراة الثانية للاختبار البين فقد بلغ الوسط الحسابي(7.500) وبانحراف معياري قدره (1.760) وبلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (0.000)، في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (1.000) كما تبين من خلال الجدول أعلاه بأنه بلغت نتائج المجموعة التجريبية في المباراة الثانية للاختبار البعدى بوسط حسابي الوسط الحسابي (7.33) وبانحراف معياري قدره (1.632) أمّا نتائج المجموعة الضابطة في المباراة الثانية للاختبار البعدى فقد بلغ الوسط الحسابي لها (9.166) وبانحراف معياري (1.834) وبلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (1.828)، في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.097).

#### **الضغط الانقباضي:**

إذ تبين من خلال الجدول أعلاه بأنه هناك فروق غير معنوي بين نتائج المجموعة الضابطة والتجريبية في المباراة الثانية حيث بلغت نتائج المجموعة التجريبية في المباراة الثانية للاختبار القبلي بوسط حسابي الوسط الحسابي (13.500) وبانحراف معياري قدره (1.048) أمّا نتائج المجموعة الضابطة في

المباراة الثانية للاختبار القبلي فقد بلغ الوسط الحسابي لها (12.833) وبانحراف معياري (1.329) وبلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (0.964)، في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.358). كما تبين كذلك بلغت نتائج المجموعة التجريبية في المباراة الثانية للاختبار البين بوسط حسابي (12.166) وبانحراف معياري قدره (1.329) أمّا نتائج المجموعة الضابطة في المباراة الثانية للاختبار البين فقد بلغ الوسط الحسابي (12.666) وبانحراف معياري قدره (1.751) وبلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (0.557)، في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.590) كما تبين من خلال الجدول أعلاه بأنه بلغت نتائج المجموعة التجريبية في المباراة الثانية للاختبار البعدى بوسط حسابي الوسط الحسابي (12.333) وبانحراف معياري قدره (1.211) أمّا نتائج المجموعة الضابطة في المباراة الثانية للاختبار البعدى فقد بلغ الوسط الحسابي لها (13.666) وبانحراف معياري (1.366) وبلغت قيمة ( $t$ ) المحسوبة (1.789)، في حين كانت قيمة نسبة الخطأ (0.104).

#### 1-3-4 مناقشة نتائج المتغيرات الوظيفية للمجموعة الضابطة والتجريبية في المباراة الثانية:-

##### 1. الضغط الانبساطي:

من خلال نتائج المعالجات الإحصائية بين المجموعة الضابطة والتجريبية في المباراة الثانية، نرى انه كانت جميع الفروق فروقاً غير معنوية، إذ نلاحظ أولاً عدم توافر فروق معنوية في متغير الضغط الانبساطي في الاختبار (قبل، بين، بعد) بين المجموعتين، وتعزو الباحثة ذلك إلى أنَّ المتغيرات التي من شأنها أنْ تؤثر على ارتفاع الضغط الانبساطي هي نفسها على المجموعتين وعلى سبيل المثال نرى أنَّ العينة هي بعمر واحد تقربياً فضلاً عن ممارستهم لفعالية كرة القدم، والتي من شأنها أنْ تسلط الضغط نفسه على العضلات العاملة، وبالتالي رفع الضغط أو خفضه لكتل المجموعتين، ويتفق ذلك مع كل من (FoxW.Bower) و(Fisher) "أنَّ ضغط الدم الانبساطي لا يتأثر بالتمرين أو الجهد البدني، ففي الوقت الذي يصل فيه ضغط الدم الانقباضي نتيجة للجهد إلى (180) ملم/زئبق اتضحت توافر قراءات ثابتة لضغط الدم

الانبساطي (80) ملم. زئبق، وذلك لأنَّه يقاس في حال كون القلب في وضع الراحة<sup>(1)</sup>.<sup>(2)</sup>

## 2. الضغط الانقباضي:

من خلال ما تقدم من عرض وتحليل لنتائج المتغيرات الوظيفية (الضغط الانقباضي) وللمجموعتين الضابطة والتجريبية، إذ تبين توافر فروق غير معنوية، وتعزو الباحثة أيضاً الفروق غير المعنوية بين نتائج الاختبارين وللمجموعتين الضابطة والتجريبية في الممارسة الثانية في متغير الضغط الانقباضي هي نفسها التي تؤثر في المجموعتين سواء كانت درجات الحرارة أم الجهد المسلط على الجسم، إذ كانت المجموعتين قد أخذت نتائج هذه الاختبار باللعبة نفسها باستثناء المتغير الذي يتم إضافته للمجموعة التجريبية ألا وهو الماء الحاوي على الأملام المضافة، ولكن على الرغم من تلك الإضافة من الأملام إلا أنَّها لم تؤثر على ارتفاع الضغط، إذ إنَّه بما معروف بأنَّ الأملام من شأنها أنْ تؤدي إلى ارتفاع الضغط العالي، ولكن تعزو الباحثة ذلك بأنَّ عدم ارتفاع الضغط للمجموعة التجريبية جراء تناول الماء الحاوي ملح من الأملام المعدنية قد كان عاملاً إيجابياً ألا وهو المحافظة على الحالة الصحية، وذلك لأنَّ ارتفاع الضغط جراء تناول الماء الحاوي على ملح من الأملام المعدنية من شأنه أنْ يعرض حالة اللاعب الصحية إلى المخاطر وخاصة عندما يتداخل هذا الارتفاع مع ارتفاع الضغط جراء ممارسة الجهد البدني، الذي أشار إليه (Dirix) "عند أداء التمارين الديناميكية مثل الركض أو الدرجات يزداد ضغط الدم الانقباضي بصورة تصاعدية في أثناء زيادة شدة هذه التمارينات نتيجة لزيادة اتساع الأوعية الدموية في جميع الأنسجة، في حين يرتفع الضغط الانبساطي بصورة طفيفة"<sup>(3)</sup>.

(1) Fox, W. Bower R; **Sport Physiology**, 3ed, edition, Brown publishers Lowa, 1988, p.256.

(2) Fisher, G. A. and Jenesn G. R., **Sientific Basis of Atheltic conditioning the 3 dition leap**, febbingphiladephid, 1990, p.139.

(3) Dirix A., Kuttegn, **Olymic book of sport Medicine**, 1988, p42.

## الباب الخامس

### 5- الاستنتاجات والتوصيات:-

#### 1-5 الاستنتاجات:-

في ضوء نتائج البحث والحقائق العلمية توصلت الباحثة إلى الاستنتاجات الآتية:

1. إنَّ للأملاح المعدنية الأثر الكبير في تحسين الانجاز الرياضي في الفعاليات ذات الزمن الطويل.
2. حصول تغيرات فسيولوجية ، وذلك من خلال تعرض اللاعبين إلى الجهد القصوي ودون القصوي وبدرجات الحرارة العالية، والتي من الممكن أن تعود على الرياضي بتكتيكات ايجابية.
3. انخفاض ضغط الدم بصورة جيدة جراء فعل كل من المغنيسيوم والكالسيوم المضافة إلى الماء.

#### 5- التوصيات:-

في ضوء الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث، يوصي بما يأتي:

1. عدم شرب الماء الاعتيادي في أثناء المباريات الحاوي على ملح المياه نفسها المعبأة بأملاح (الصوديوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم).
2. الإفادة من التغيرات الوظيفية في برمجة التدريب في الفعاليات المختلفة الأخرى.
3. ضرورة قيام المدربيين بمعرفة وزن اللاعب قبل المباراة وبعدها لمعرفة كمية السوائل المفقودة ومحاولة تعويضها باستخدام المياه المعدلة من قبل الباحثة.
4. التأكيد على ضرورة تعويض السوائل المفقودة عند ممارسات الفعاليات الرياضية في الأجواء الحارة وأخذ جرعات الماء خلال المباراة لمحافظة على توازن السوائل والأملاح في جسم الرياضي لما لذلك في رفع القدرات البدنية والفسلジية.
5. إجراء دراسات أخرى تُعنى مثل هكذا متغيرات على فعاليات أخرى وبدرجات حرارة مختلفة.

## المصادر

- ر.ف. بوترام؛**التغذية الصحية للإنسان**، القاهرة : الدار العربية للنشر والتوزيع، 1985.
- عبد الله بحر فياض؛**تأثير التدريبات اللاهوائية بالأسلوب التكراري في بعض المتغيرات البايوكيميائية وإعداد عدائي 100 متر**، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، 2002.
- فاضل كامل منكور؛**تأثير التدريب الرياضي في ملح مكونات العرق الرئيسية ومثيلاتها في البلازما وعلاقتها بنظام إنتاج الطاقة في الجسم**، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضي، 1997.
- علي صباح عدai؛**مواد قانون كرة القدم للصالات**، بغداد: 2009.
- علي مهدي هادي الجمالي؛ وضع مؤشرات رقمية للسوائل المفقودة من خلال بعض المتغيرات الوظيفية في الدم باستخدام جهدين بدنيين باختلاف درجات الحرارة لدى لاعبي الكرة الطائرة، أطروحة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة القادسية، 2009.
- وجيه محجوب ؛ **طرائق البحث العلمي ومناهجه**. الموصل : مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، 1988.
- محمد نصر رضوان؛ **المدخل إلى فسيولوجيا الجهد البدني**. القاهرة: دار الفكر العربي، 1998.
- هزار محمد الهزاع؛ **التجارب معملية في وظائف الجهد البدني**. الاتحاد السعودي للطبع الرياضي، ب.م، 1997.
- Gerard J. Tortora, Wicholas P 'Anagnostakos: **Principles of anatomy and physiology**. Ross copyright, 4th edition, 1984

- G. S.; **Essential of exercise physiology.** Burgess publishiry company, 1981, .
- Dirix A, Kuttegn R.O. K; **Olymic book of sport medicine 1st, published west Germany,** 1988,
- Fox, W. Bower R.; **Sportphysiology, 3ed, Edition, Brown publish Lowa,** 1988.,
- Fisher, G.A. and Jensen G.R.; **Scientific Basis of Athletic conditioning,** th3 edition leap, febbign, philgdephid, 1990, p.139. Mc. Cinty J. Bet, al.**Blood pressure in Athletic Traning& sport Medicine. Pub. By American Academy of orthopedic surgons, U.S.A,** 1991.
- Fox, W. Bower R; **Sport Physiology, 3ed, edition, Brown publishers Lowa,** 1988,
- Fisher, G. A. and Jenesn G. R., **Sientific Basis of Atheletic conditioning the 3 dition leap,** febbingphiladephid, 1990,