

## دراسة مقارنة بين الاستجابات الانفعالية لمرضى ضغط الدم على مقاييس نوع مواصفات الموسيقى مقارنة مع استجابات بعض المرضى الاسوياء

م . نهى حامد طاهر / الجامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية

الجامعة البيلاروسية الحكومية / كلية العلوم الفيسيولوجية والاجتماعية / قسم علم النفس / علم النفس الطبي

### ملخص البحث

#### مشكلة البحث واهميته:-

بسبب ازدياد ضغوط الحياة بصفة مستمرة ، والسعى الدائم وراء الماديات الضرورية والاحباطات التي تواجهنا يوميا بصورة عامة ، ازداد ظهور عدد من الحالات المرضية العضوية التي لها جذور نفسية مما ادى بها بسبب شدتها الى عدم استجابتها للعلاجات التقليدية (العقاقير الطبية ) ، وهذا الامر خلق لدى المرضى عدد من الاضطرابات الانفعالية الناتجة عن قلقهم من مخاطر المرض .

ولهذا اهتم علماء النفس والاطباء بالبحث عن ايجاد طرق علاجية اخرى تكون اكثر نفعا مع هؤلاء المرضى من الناحية المادية والجسمية ومنها العلاج بالموسيقى .

لقد كشفت الدراسات الحديثة قدرة الموسيقى على رفع المزاج، والتخلص من بعض الاضطرابات العاطفية، مما تسبب في حدوث تحسن في ضغط الدم لدى المرضى، فضلا عن تحسين مهارات الاتصال الخاصة بهم، كما ان للموسيقى قدرة الى جعل المريض في حالة من الفرح والسرور، كذلك تعمل على زيادة الثقة بالنفس والتخلص من الخوف لديه.

#### اهداف البحث :-

#### يهدف البحث الحالي الى:-

1-التعرف على نوع الاستجابات الانفعالية لمرضى ضغط الدم بنوعيهما (المترتفع والمنخفض ) على مقاييس نوع مواصفات الموسيقى في ظروف (تناول الادوية ، العمل ) ، ومقارنتها مع استجابات الاسوياء في الظروف نفسها تبعا لمتغير ( الجنس ، والوظيفة ).

2-التعرف على نوع الاستجابات الانفعالية لمرضى ضغط الدم بنوعيهما (المترتفع والمنخفض ) على مقاييس نوع مواصفات الموسيقى في ظروف (عدم تناول الادوية ، اجازة العمل ) ، ومقارنتها مع استجابات الاسوياء في الظروف نفسها تبعا لمتغير ( الجنس والوظيفة ).

حدود البحث:-

يقتصر البحث على دراسة نوع استجابات الانفعالية للموسيقى لمرضى ضغط الدم بنوعيهما ( المرتفع والمنخفض ) واستجابات الاشخاص المصابين ببعض الامراض البسيطة ( الانفلونزا والسعال ) لدى عينة من الطلاب والموظفيين التابعين للجامعة البيلاروسية الحكومية في محافظة ( منسك ) للعام الدراسي 2012م.

اجراءات البحث :-

لقد اعتمدت الباحثة في هذا البحث على منهج الدراسة المقارنة ، ومن اجل تحقيق اهداف البحث قامت ببناء مقياس يقيس انواع مواصفات الموسيقى والذي ترجمته باللغة الروسية ليتناسب مع مجتمع بحثها ( البيلاروسيا ) . ولقد تالف المقياس من ( 29 ) فقرة ، وتالف المقياس نفسه من ثلاثة نغمات موسيقية وذلك للتعرف على مدى استجابات الانفعالية لافراد العينة للموسيقى . وهذه الالحان هي ( dvork,Mozart,straus ).

تألفت عينة الدراسة ( المقارنة ) من 56 فردا الذين تم تقسيمهم إلى مجموعتين . كل مجموعة تالفت من ( 28 ) فردا . المجموعة الاولى تضمنت المرضى الذين يعانون من امراض ضغط الدم ( المرتفع والمنخفض ) ، والمجموعة الثانية تالفت من المرضى الذين يعانون من امراض الانفلونزا والسعال . تم تقسيم كل مجموعة بدورها وفقا لمتغير الجنس ، والوظيفة الى ( 14 ) مريضا من الذكور و ( 14 ) من النساء ، و ( 14 ) مريضا من الموظفين و ( 14 ) من

الطلاب . وقد طبقت الباحثة المقياس عليهم مع الاستماع للاحان الموسيقية في حالتين من الظروف

1-الظرف الاول ( تناول الادوية ، والعمل )

2-الظرف الثاني ( عدم تناول الادوية ، واجازة العمل ) .

ومن اجل تطبيق المقياس قامت الباحثة باستخراج الصدق والثبات له . حيث عرضت الباحثة فقرات المقياس مع الالحان الموسيقية على مجموعة من الخبراء وذلك لاستخراج الصدق الظاهري ، كذلك استخرجت الباحثة صدق البناء والقوة التمييزية ، بالإضافة الى انها استخرجت الثبات للمقياس بطريقة الفا كرونباخ . وبذلك اصبح المقياس صالح للتطبيق .

## نتائج البحث :-

اولاً- ان الاستجابات الانفعالية لمرضى ضغط الدم تتشابه مع الاستجابات الانفعالية لمرضى المصابين بامراض (الانفلونزا والسعال). ما عدا حالتين هما:-

1-تميزت مجموعة المرض من الذكور المصابين بامراض ضغط الدم باستجابات انفعالية اعلى من (dvork) مجموعة الذكور المصابين بامراض ( الانفلونزا والسعال) في المرحلة الثانية للموسيقى

2-تميزت مجموعة المرضى من الذكور المصابين بامراض ضغط الدم باستجابات انفعالية اعلى من (Mozart) مجموعة الذكور المصابين بامراض (الانفلونزا والسعال) في المرحلة الاولى للموسيقى.

ثانيا :- ان انواع الموسيقى المستخدمة في البحث الحالي اثرا على استجابات المرضى بصورة عامة.

وبعد الحصول على نتائج الدراسة قدمت الباحثة عددا من التوصيات والاقتراحات لاستخدام الموسيقى لمرضى الذين يعانون ضغط الدم.

### Abstract

A comparative study between the emotional responses in patients with blood pressure on a scale of music types characteristics compared with responses to some Healthy patients

Nuha Hamed Taher

#### The problem of the study and its significance:

Due to the increasing pressures of life continually, and constant quest behind materialism necessary and frustrations that confront us daily in general, the greater the emergence of a number of cases of disease organic roots psychological causing them because of severity of a lack of response to conventional treatments (drugs), and this is creating in patients a number of emotional disorders resulting from concern the risk of disease

That is interested psychologists and doctors searching for ways to find other treatment be more useful with these patients in terms of material and physical, including music therapy..

The studies revealed the modern power of music to lift the mood, and get rid of some emotional disorders, causing an improvement in blood pressure in patients, as well as improving communication skills of their own, as the music's ability to make the patient in a state of joy and happiness, as well as working to increase self-confidence and get rid of the fear of the disease.

#### Aims of the research:-

1–Identify the type of emotional responses for patients with blood pressure, type two (high and low) on a scale type specification in the circumstances of the music (taking drugs, work), and compared with the responses of healthy patients in the same conditions depending on the variable (sex, and function).

2 – identify the type of emotional responses for patients with blood pressure, type two (high and low) on a scale type specifications of music in the circumstances (not taking drugs, vacation work), and compared with the responses of healthy patients in the same conditions depending on the variable (sex, and function).

#### The limits of the study:

Limited research on the study of type responses emotional music for patients with hypertension (high and low) and responses healthy patients with some minor illnesses (flu and cough) among a sample of students and staff of the University of Belarusian government in the province (Minsk) for the academic year 2012

**Research procedures:** –

Adopted researcher in this study approach to the comparative study, in order to achieve the objectives of the research has built scale measures the kinds of music and specifications, which translated to Russian language commensurate with the community discussed (Belarus). The measure of a damaged (29) item, and damaged the meter itself of three musical notes in order to identify the extent of emotional responses to the sample of the music. These melodies are ((dvork,Mozart,straus)).

The study sample consisted (comparison) of (56) individuals who were divided into two groups. Each group consisted of (28) individuals. The first group included patients who suffer from hypertension (high and low), and the second group consisted of patients who suffer from diseases flu and cough. Each group was divided in turn according to the sex variable, and function to (14) patients were male and (14) of the women, and (14) patients and staff (14) of the students. The researcher applied the measure with them to listen to the music composed by the two conditions: –

- 1 – The first envelope (taking drugs, and work)
- 2 – The second envelope (not taking drugs, and vacation work).

In order to apply the scale, the researcher extracted validity and reliability him. Where the researcher offered items scale with melodies on a group of experts in order to extract the face validity, as well as the extracted researcher construct validity and discrimination power, plus it was extracted reliability of the scale Cronbach alpha. And thus became the scale in favor of the application ..

**Results of the study:** –

First – the emotional responses of patients with blood pressure similar to the emotional responses of patients suffering from diseases (flu, cough). Except two cases: –

- 1 – characterized by a group of male disease ill blood pressure responses emotional range of top male ill (flu and cough) in the second phase of the music (dvork)
- 2 – characterized by a group of male patients suffering from diseases blood pressure responses emotional range of top male ill (flu and cough) in the first phase of the music (Mozart).

Second: – The types of music used in the current research on the impact responses of patients in general.

After obtaining the results of the study researcher presented a number of recommendations and suggestions for the use of music for patients with blood pressure.

## الفصل الاول

### التعريف بالبحث

#### اولاً:- مشكلة البحث

مع ازدياد ضغوط الحياة بصفة مستمرة ، والسعى الدائم وراء الماديات الضرورية في العصر الحالي والاحباطات التي تواجهنا بصفة كبيرة يوميا ، ازداد ظهور عدد من الحالات المرضية العضوية التي لها جذور نفسية مما ادى بها بسبب شدتها الى عدم استجابتها للعلاجات التقليدية (العقاقير الطبية ) ، وهذا الامر خلق لدى المرضى عدد من الاضطرابات الانفعالية الناتجة عن قلقهم من مخاطر المرض. (شعان، 2010، مصدر انترنت).

ان سوء الحالة الجسمية يؤدي وبالتالي الى سوء صحة الفرد النفسية وسوء تكيفه ، فاعتلال الصحة الجسمية وضعف البدن يؤديان بالفرد الى القلق والتشاؤم والنظرة الى الناس والحياة بمنظار اسود ، مما لهما من تأثير السئ على سلوك الفرد نحو نفسه ونحو الاخرين(الهابط ، 1989، 64)

ان الاضطراب العضوي يمثل تعبيرا غير كامل عن التوتر النفسي اذ لا يكون هناك مجالا للتنفس عن التوتر الانفعالي الاصلي ، ونتيجة لذلك ينشأ الاضطراب المزمن في الوظيفة الجسمية (ابو النيل وزيور، 1984، 58). لقد اظهرت نتائج عدد من الدراسات التي قام بها مجموعة من الاطباء على المرضى المترددين على مختلف العيادات بان اكثر هؤلاء المرضى كانوا من فئات المصابين بالأمراض السيكوسوماتية ، كما اشار الاطباء ايضا بان هؤلاء المرضى كانوا يخضعون لفحوصات والتحاليل الطبية ويتناولون العقاقير الطبية التي اغلبها هم ليسوا بحاجة اليها اكثر من غيرهم من الفئات المرضية الاخرى . وعندما كانوا يجدون بانها غير نافعة تزداد عندهم المخاوف ويصابون بالقلق والتوتر ، وقد يؤدي بهم هذا القلق الى زيادة شدة الاضطراب والالم الذي يشكون منه (شعان 2010، مصدر انترنت).

ولأن العامل النفسي يلعب دورا كبيرا في حدوث الأمراض السيكوسوماتية ، وفي استمراره وإثارته ، وضعف مقاومة الفرد في مواجهة المرض ، فمن هذا المنطلق اهتم علماء النفس والاطباء بالبحث عن ايجاد طرق علاجية اخرى تكون اكثر نفعا مع هؤلاء المرضى من الناحية المادية والجسمية ومنها العلاج بالموسيقى (الشقماني والفقى ، 2010، 235).

كشفت نتائج احدى الدراسات بان هناك علاقة بين الصحة والموسيقى ، حيث تعمل الموسيقى على تحقيق الاتزان بين مستويات افراز الهرمونات وسرعة التنفس ومعدل نبضات القلب ومستويات الاوكسجين في الدم ، كما ان الموسيقى تعد عنصرا من عناصر بقاء الانسان على قيد الحياة (Wolf&Wolf, 2011, 55).

للاجهاد العقلي في الوقت الحاضر على نطاق الاضطرابات الجسدية وهو قد يكثر عند الرجال نسبة الى النساء ،والذي قد يكون سببه تقلصات شديدة في الاوعية الدموية . )

DESAI,F,2001,3-4)

ان مثل هذا الاضطراب يشكل خطورة كبيرة على حياة الافراد سواء على توافقهم العام ام على توافقهم المهني والصحي ، كما ان حالة الفرد الانفعالية ولا سيما القلق النفسي والاكتئاب لهما دور مؤكّد في حدوث هذا المرض . ( Goldman,1984,37 )

ووُجِدَ ( D'Ulisse, M.E, and others ) ان للموسيقى قدرة على رفع المزاج والتخلص من بعض الاضطرابات الانفعالية المصاحبة لمرضى ضغط الدم وعلى زيادة تفاعلهم الاجتماعي وتقبل العلاج وجعل المريض في حالة من البهجة والسرور وتعزيز الثقة بالنفس والتخلص من مخاوف المرض . ( D'Ulisse,M.E,andothers,2003,404-406 ) .

واكَدَ عدُدٌ من الباحثين النفسيين في جامعة (تميل) الأمريكية ان لمواصفات نوع الموسيقى اثراً على فترة الاستماع المريض المصايب بضغط الدم لها فاذا كانت تتسم بالفرح والانشراح والاسترخاء والهدوء تؤدي إلى رغبة المريض بالاستماع لها بفترة اطول من تلك الموسيقى التي تتسم بالحزن والكآبة والبكاء وهذا عامل اساسي اثناء العلاج ( العزاوي ، 2006، مصدر انترنت).

ويمكن تلخيص مشكلة البحث بالسؤال الآتي :-

ما نوع الاستجابات الانفعالية لمرضى ضغط الدم على مقاييس مواصفات نوع الموسيقى مقارنة مع استجابات الاشخاص المصابين ببعض الامراض البسيطة ( الانفلونزا والسعال ) ؟

ثانياً :- اهمية البحث وال الحاجة اليه

ان العلاج بالموسيقى لم يصبح استخدامه فقط قاصراً على الامراض النفسية والعصبية وإنما اخذ مراحل متقدمة ، حيث اصبح اليوم يستخدم مع بعض الامراض السيكوسوماتية مثل ضغط الدم واضطرابات النوم والارق والتحكم في ضبط افرازات عدد الصماء ( قاسم ، 2011 ، مصدر انترنت ).

واظهرت نتائج دراسة قامت في امريكا بان الاستماع للموسيقى لمدة ساعة تقريباً يؤدي الى علاج مرضي الضغط العالى لانه يعمل على خفض ضغط الدم في الشريان الانقباضي ورفعه في الشريان الانبساطي ( عبيد ، 2011 ، 2 ) .

ان احدى الدراسات التي اجريت على مجموعة من الاشخاص المصابين بالامراض السيكوسوماتية ، اشارت بان مرضى ضغط الدم تصل نسبتهم الى ( 8% ) من بين الامراض النفسية الاخرى وهي نسبة خطيرة جداً ، اذ ان هذه الامراض تستمر في الانسان وتسبب له اعراض نفسية كثيرة ، ولقد ثبتت هذه الدراسة ايضاً بان افضل علاج يستخدم مع هذه الفئات المرضية هو العلاج

بالموسيقى مما له من اثر فعال في التقليل من الاضطرابات الانفعالية المصاحبة لهذه الامراض ومن اهمها التوتر والقلق والاكتئاب ، وكذلك له اثر في الحصول على الاسترخاء لدى هؤلاء المرضى من خلال المحفزات الموسيقية ، حيث تعد الموسيقى اداة ممتعة ومرحية ورخيصة في نفس الوقت .  
 (CERMAK,2005,8)

واشارت بعض الاحصائيات في التقارير التي قدمها الاطباء في مستشفيات الامراض النفسية الى ان ( 40-60% ) من المرضى الذين يترددون على الاطباء في الاختصاصات المختلفة يعانون من الاضطرابات السيكوسوماتية والتي اغلبها كانت من امراض ضغط الدم (الشيخ، 2000، 55).

كما اشارت نتائج دراسة مصرية قامت بها الطبيبة المصرية (نبيلة ميخائيل يوسف ) على مريض عمره ( 58 ) عاما كان يعاني من ضغط الدم المرتفع من ( 190/120 ) ، بان الطبيبة قد نجحت في علاجه ، حيث قدمت للمريض موسيقى مسجلة وطلبت منه الاستماع لها لمدة ساعة في اليوم الاول ، ونصف ساعة في اليوم الثاني ، وربع ساعة في الثالث ، وقد تبين في النهاية بان معدل ضغط الدم للمريض قد وصل الى ( 100/150 ).

كما تمكنت ايضا من علاج رجل يعاني من شلل نصفي مع ارتفاع ضغط الدم من ( 190/120 ) ، اذ طلبت منه التوقف عن اخذ الدواء لمدة ( 15 ) يوما لاجل التأكد من ان الدواء ليس له اثر في شفاءه اثناء الاستماع للموسيقى ، بعدها قامت الطبيبة بتعریض المريض لجرعة موسيقية لمدة ساعة في كل يوم ، واظهرت نتائج دراستها في النهاية بان المريض قد وصل معدل ضغطه في اليوم الخامس عشر الى ( 155/90 ) ، كما اتضح ايضا من خلال دراستها بان المريض قد استطاع السير على قدميه وقد فسرت الطبيبة سبب شفاءه ، بان نوع مواصفات الموسيقى التي قام المريض بالاستماع اليها كانت تتسم بعاملين مهمين هما الهدوء والاسترخاء واللذان هما اساس العلاج (المصري، 2010، مصدر انترنت).

واجريت دراسة اخرى في مصر قام بها مجموعة من الاطباء على عينة من مرضى المصابين بضغط الدم المرتفع والمنخفض جدا من المقيمين في المستشفى ، اذ عرض الاطباء عليهم مجموعة من الانغام الموسيقية على مرحلتين ، في المرحلة الاولى عرضوا عليهم الانغام الموسيقية اثناء تناولهم للعقاقير الطبية ، وفي المرحلة الثانية عرضوا عليهم الانغام الموسيقية بدون تناول العقاقير الطبية ، وفي كلا الحالتين طلب الاطباء منهم ان يصفوا نوع الانغام الموسيقية التي استمعوا لها ولقد اظهرت النتائج بان استجابات المرضى قد كانت مختلفة في كلتا الحالتين (الفارس، 2009، مصدر انترنت).

واظهرت نتائج دراسة (برناري وآخرون ) في ايطاليا بان الاستماع للموسيقى الصالحة مثل (بيتهوفن وباخ ) تؤدي الى ارتفاع سرعة نبضات القلب وسرعة تدفق تقلصات شرايين الدم وارتفاع

ضغط الدم ،واكدت هذه الدراسة ايضاً بان المرضى عبّروا عن عدم رغبتهم للاستماع لها مباشرة لأنها تميل بهم الى الشعور بالضيق والتعب والتوتر والاحباط ، كما اشار الباحثون بان الموسيقى لا تحكم فقط بالعمليات الانفعالية للفرد ، بل ايضاً بالعمليات والتغيرات الجسمية من حيث عمل القلب والأوعية الدموية ودرجات الحرارة .

وأشار هؤلاء الباحثون ايضاً بان الموسيقى والاغاني الهادئة والسعيدة تثير العواطف الايجابية لدى المرضى ، فعندما يسمع المريض هذه الاغاني تتسع لديه الأوعية الدموية وبالتالي تؤدي بدورها الى رغبتهما بالضحك والابتهاج (قاسم، 2011، مصدر انترنت).

وأشارت دراسة ( Sandhana&Chintan ) ان الموسيقى وخاصة الكلاسيكية منها اثر كبير في توليد المشاعر الايجابية لدى الفرد من حيث الشعور بالفرح والحماس والتخلص من الاكتئاب وتخفيف جميع الاضطرابات والضغوط النفسية واليأس والخوف والغضب والارق والصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم والحصول على راحة الاعصاب واسترخاء العضلات . ( Sandhana&Chintan,2004,8)

ووجد ( D'Ulisse, M.E, and others ) ان للموسيقى قدرة على رفع المزاج والتخلص من بعض الاضطرابات الانفعالية المصاحبة للامراض السيكوسوماتية وعلى زيادة تفاعلهم الاجتماعي وتقبل العلاج وجعل المريض في حالة من البهجة والسرور وتعزيز الثقة بالنفس والتخلص من مخاوف المرض . ( D'Ulisse, M.E, and others,2003,404-406 )

وقد قام الطبيب ( Weinberger ) في جامعة كورنيل ( 1997 ) بتسجيل سرعة ضربات القلب وضغط الدم والتنفس ودرجة الحرارة خلال عرض انواع مختلفة من الموسيقى على مجموعة من المرضى ضغط الدم التي تعبّر كل منها عن نوع خاص من الانفعالات وطلب منهم ذكر اي من انواع الموسيقى التي جذبّتهم اكثر من غيرها ولقد اختار اكثراً الموسيقى التي تتصف بالهدوء والتي تجلب السعادة والفرح والراحة النفسية . ( Weinberger,2004,17 )

ومن خلال ما تم استعراضه يمكن توضيح المؤشرات الآتية التي تدل على أهمية البحث :-

1- يُعد الاهتمام بنوع مواصفات الموسيقى المستخدمة في العلاج امراً ضرورياً وذلك للاسراع في عملية شفاء المريض .

2- ان الدراسة الحالية تهتم بفئة مرضية خطيرة وهي فئة مرضى ضغط الدم بنوعيها ( المرتفع والمنخفض ) وذلك لقلة الدراسات المتعلقة حول هذه الفئة ولا سيما في علاجهم .

3- ان الدراسة الحالية تعتبر دراسة تمهيدية للتعرف على خصائص انواع الموسيقى التي يفضلها مرضى ضغط الدم بنوعيهما ( المرتفع والمنخفض ) قبل استخدامها في العلاج ، حيث اكدت اغلب الدراسات ان نوع مواصفات الموسيقى التي يتم تقديمها للمرضى يجب ان تكون حسب رغبتهما .

### ثالثا : - اهداف البحث

يهدف البحث الحالي الى :-

1-التعرف على نوع الاستجابات الانفعالية لمرضى ضغط الدم بنوعيهما ( المرتفع والمنخفض ) على مقاييس نوع مواصفات الموسيقى في ظروف ( تناول الادوية ، العمل ) ، ومقارنتها مع استجابات الاشخاص في الظروف نفسها تبعاً لمتغير ( الجنس ، الوظيفة ) .

2- التعرف على نوع الاستجابات الانفعالية لمرضى ضغط الدم بنوعيهما ( المرتفع والمنخفض ) على مقاييس نوع مواصفات الموسيقى في ظروف ( عدم تناول الادوية ، اجازة العمل ) ، ومقارنتها مع استجابات الاشخاص في الظروف نفسها تبعاً لمتغير ( الجنس والوظيفة ) .

### رابعا : - حدود البحث

يقصر البحث على دراسة نوع استجابات الانفعالية للموسيقى لمرضى ضغط الدم بنوعيهما ( المرتفع والمنخفض ) واستجابات الاشخاص المصابين ببعض الامراض البسيطة ( الانفلونزا والسعال ) لدى عينة من الطلاب والموظفين التابعين للجامعة البيلاروسية الحكومية في محافظة ( منسك ) للعام الدراسي 2012م

### خامسا : - تحديد المصطلحات

1-الاستجابات الانفعالية للموسيقى :-

ا-عرفها ( ابو الحب ، 1970 )

هي كل رد فعل انجفعالي يصدر عن الفرد عند استماعه للألحان الموسيقية والتي تتخذ نتيجة لذلك صيغة تغيرات ظاهرية في السلوك مثل البكاء والحزن والسعادة والفرح ( ابو الحب ، 1970 ، 61 )

ب- عرفها ( توفيق ، 2009 )

هي تلك المشاعر الانفعالية التي تثار عند الاستماع للموسيقى نتيجة لحصول تغيرات فسيولوجية وبإثولوجية داخل جسمنا وفقاً لمدى تصوراتنا واحكامنا الذاتية للانغام الموسيقية ( توفيق ، 2009 ، مصدر انترنت )

- 2- مرض ضغط الدم :

ا- عرفه (احمد، 2011)

وهو من اشهر الامراض الحديثة الشائعة والمتعلقة بامراض القلب والاواعية الدموية ، ويعتبر مرتفعا او منخفضا اذا كان زائد او اقل عن المعدل الطبيعي ( 80/120 ) ملم زئبق نتيجة لخلل باحد العوامل الرئيسية التالية التي تحكم في ضغط الدم ( امراض القلب والاواعية الدموية ، امراض الجهاز العصبي ، امراض جهاز الهرموني وغدد الصماء ، وامراض الجهاز البولي ) ( احمد ، 2011 ، مصدر انترنت ) .

ب- عرفه (برهان ، 2011)

هو الضغط الموجود داخل شرايين الجسم الرئيسية والناتج من ضخ القلب للدم ومقاومة الشرايين الفرعية الصغيرة لمروره .

ويقسم الى نوعين :

اولا- العلوي او المرتفع : وهو الضغط الانقباضي او السيسستولي

ثانيا - السفلي او المنخفض : وهو الضغط الانبساطي او الديستولي

ويعتبر ضغط الدم عالي اذا زاد او منخفض اذا نقص ( 90/140 ). (برهان، 2011)

ج- عرفه (عثمان، 2011)

يعد ضغط الدم المناسب ( 80/120 ) ملم زئبق ، ويوصف بأنه ضغط انقباضي اذا زاد عن ( 120 ) ، ويوصف بأنه ضغط انبساطي اذا قل عن ( 80 )، وفي بعض الحالات قد يكون انخفاض ضغط الدم افضل (عثمان ، 2011 ، مصدر انترنت )

د- عرفه (عزمي ، 2012)

يقصد بمرض ضغط الدم حسب ما يشير اليه مقياس ضغط الدم الى مقدار الضغط الذي يبذل الدم على جدران الشرايين التي تقوم بنقله من القلب الى سائر اجزاء الجسم ، وفي بعض الحالات لا يستطيع الدم ان يمر بسهولة من خلال الشرايين نتيجة ضيقها واصابتها بالتصلب ، وفي هذه الحالات سيرتفع الضغط حتى يضمن استمرارية مرور الدم من خلال هذه الشرايين المصابة ، او قد يميل للانخفاض (عزمي ، 2012 مصدر انترنت ) .

3- الموسيقى

ا- عرفها (اللالئي ، 2007)

هي كل صوت منفم تسمعه الأذن وترتاح له ....سواء كان هذا الصوت بشري او حيواني او صادر من الطبيعة (اللائي ، 2007، مصدر انترنت ).

ب- عرفها (بوليصة ، 2010)

هي مجموعة اصوات متناغمة في اتفاق وانسجام ، بحيث تقبلها الاذن ويرتاح اليها الجسم (بوليصة ، 2010، مصدر انترنت ).

ج- عرفها (الزغلامي ، 2010)

الموسيقى او الموسيقا هي فن مالفة الاصوات والسكوت عبرة فترة زمنية وت تكون من عدة عناصر وهي (الحن، التجانس، الايقاع، الجرس، الصوت ، والوتيرة ).(الزغلامي، 2010، مصدرانترنت ).

وتعنى الباحثة ضغط الدم على انه ذلك المرض الذي يصيب الانسان في حالة الارتفاع اذا وصل الى معدل اعلى من (120/80) او في حالة الانخفاض اذا وصل الى معدل اقل من (80/120).

كما تعرف الباحثة الموسيقى بانها احد الفنون التي تستخدم في الطب لاغراض علاجية بسبب احتواها على مجموعة من العناصر التي تسهل العملية العلاجية عند دخولها في جسم الانسان وهي (الحن ، التجانس ، الايقاع ، الجرس ، الصوت ، والوتيرة ).

وتتبني الباحثة تعريف (توفيق ، 2009). للاستجابة الانفعالية للموسيقى كتعريفا نظريا للبحث،اما التعريف الاجرائي للاستجابات الانفعالية للموسيقى :- هي الدرجة التي يحصل عليها عينة البحث على المقياس المعد لهذا الغرض .

## الفصل الثاني

### الخلفية النظرية

#### اولا:- نظرية التحليل النفسي

يرى فرويد ان تأثير الموسيقى على الانسان له عوامل عدة وعلاج اي مرض يتم حسب دراسة وضع المرضى، وعند معرفة طفولة المريض يحدد التشخيص . فانواع الموسيقى تقوم على الاداء الحسي للعازف التي تتجلى في الحزن والهدوء والصخب ،فلا يمكن ان تعالج مريض اليأس في موسيقى حزينة فحالة الاشخاص النفسية هي التي تحدد دراسة بعد دراسة دقة كيفية العلاج ونوعية الموسيقى (البحر، 2010، مصدر انترنت).

لقد اشار الطبيب (Rangell,2009) الى ان اغلب الناس يميلون الى الاستماع للموسيقى وقد يصلون الى الحالة الذي عبر عنها (فرويد) في نظريته في التحليل النفسي (بالهلوسة الموسيقية ) وهذا يتضح من خلال استخدام الناس الدندنة اللارادية والتصفير عند العمل اوالعزف بدون وعي .  
(Rangell,2009,27)

واكد (فرويد) ان محتويات الموسيقى في الواقع ما هي الا رموز شهوانية وان نواتها احلام اليقظة وقد ذهب اتباع مدرسة (فرويد) السيكولوجية الى حد ابعد من ذلك بكثير فقالوا ان سبب ارتياح النفس للموسيقى والشعور الترجسي وما يتمثل في الموسقي من طرب وتوافق ونظم وتوازن ، كل هذه ترجع الى العملية الجنسية في حركاتها التوافقية وتدرجها من البطء الى السرعة والشدة في التوازن والانتظام ، ثم الانتهاء بانخفاض وبطء وهبوط ، فالبطء في البداية مقدمة دعابية ،والشدة التكرارية ذروة اللذة ، وما يعقب ذلك ارتخاء وارتياح بعد التوتر وقد يحمل صاحبه الى النوم (ابو الحب ،21,1970).

ويؤكد اصحاب هذه النظرية بان الناس يشعرون بالعاطفة عند استماعهم للموسيقى .اذ تترجم هذه العاطف في الدماغ ، فالعواطف السلبية تترجم في نصف الكرة اليمين للدماغ ،اما العاطف الايجابية فترجم في نصف الكرة الايسر للدماغ ( Oscar,2005,211 ).

ويرى اصحاب نظرية مدرسة التحليل النفسي الجديدة بعد دراستهم لاراء مجموعة من العازفين والملحنين الموسيقيين بان الموسيقى تثير انواعا مختلفة من الرغبات في صدر الانسان ، وبواسطة الفن الموسيقي فاتنا بدورنا يحفزنا الفرح والسرور او تغمرنا الاحزان والالم او يلهمنا الحماس او يستولي علينا الخوف والفزع او ذنب في الرقة والحنان والعطاف والحب او منتقل الى رحاب عالم الجلال والبركات والتسبيح في ملكوت السموات (ابو الحب ،21,1970).

ويرى فرويد ان المعالجين الموسيقيين عندما يضعون الموسيقى لهم يجب ان يهتموا اولا من ناحية الفترة الزمنية التي تستغرقها ، ومدى ملائمتها لجنس المريض ، وما مصدرها ، ونوعها ، والمعاني الادراكية التي يمكن ان تقدمها للمريض (Deutsch, 1999, 43).

### ثانيا : - النظرية السلوكية

ان مفاهيم هذه النظرية حول الموسيقى تستند على وجهة نظر سكرر في ان الموسيقى تعمل كحافز او مثير فعال للحصول على استجابات الفرد ، حيث قام بتجربة على مجموعة من الافراد في هولاندا اذ عرض عليهم لوحة معينة وطلب منهم تفسير ما موجود في اللوحة وبعد فترة قصيرة عرض عليهم نفس اللوحة مع الاستماع للموسيقى ، وقد رأى ان استجاباتهم قد اختلفت ، وبذلك اثبت في النهاية ان الموسيقى تساعد او تسهل الحصول على الاستجابات بصورة افضل .(Chomsky, 2004, 14)

وفي عام (1956) اكتشف الباحث السلوكي ( Leonard Meyer ) العلاقة الوثيقة بين الموسيقى والعواطف ، واكد بان الموسيقى قد تثير الصور وتسلسل الافكار عند الاستماع اليها بسبب علاقتها بالحياة الداخلية للفرد ( Davoli, 2009, 24 ).

كما تعمل الموسيقى على تصفية الافكار المتعددة في الدماغ وتحسين المزاج وتحسين الاعصاب وهي مفيدة في علاج الكآبة والارق ومشكلات القلق المفرط ، كما تعمل على رفع مستوى الانسولين الذي له تاثير ايجابي على خلايا الدماغ التي تسيطر على المزاج والرغبات والعمليات الجنسية وتقوية الذاكرة ( magar, 2011, internt ).

كذلك تعمل الموسيقى عند الاستماع اليها كنوع من التعاقد السلوكي وتشجيع هذه التعاقدات لغرض الحصول على استجابات تطورية جديدة لدى المرض . ( Marwick, 2005, 26 )

وتخترق الموسيقى عند الاستماع اليها الجسم من الداخل والخارج وذلك للتحفيز العاطفي من ادنى درجة ( الياس ، الحزن . الفزع . الاكتئاب ) الى اعلى درجة ( الفرح ، السرور ، الابتهاج ، الامل ) . كما يقوم الایقاع بعملية شد انتباه المريض للمعالج اثناء الجلسات العلاجية ، بالإضافة الى انها تعمل على تنظيم العمليات الفسيولوجية في الجسم مثل ( معدل ضربات القلب ، وضغط الدم ، والتنفس ، ودرجة الحرارة ) ( Berger, 2003, 688 ).

واكد الطبيب والمعالج السلوكي ( Bradt, 2009 ) بان الاستماع للموسيقى مفيد لمرضى القلب وضغط الدم والشريان التاجي ، حيث انه يقلل من معدل ضربات القلب والتنفس وضغط الدم بالإضافة الى التخفيف من الالم والقلق ( Bradt, 2009, 77 ).

واكد الطبيب والمعالج السلوكي ( Mark bonder ) (بان جميع انواع الموسيقى تقوم بتنشيط القشرة السمعية ، وتسبب ارتباط بين اجزاء الدماغ مع العاطفة مما تؤدي الى التنسيق الحركي والبصري وغيرها من العمليات الفكرية العليا ( Lerch,2011,Internt ).

وترى هذه النظرية بان المعالج السلوكي يميل الى استخدام الموسيقى مع المرضى لاطفاء المنعكستات الشرطية (المرضية ) والى القيام بتعليم الفرد منعكستات وارتباطات شرطية جديدة وسوية مكان الارتباطات المرضية (القاسم واخرون ، 2000-93-92)

واشار عدد من الباحثين السلوكيين في مجال العلاج بالموسيقى بان هناك عدد من العوامل التي تحدد فاعالية تاثير الموسيقى على مرضى ضغط الدم وعلى مدى استجابتهم لانغام الموسيقية وهي كالتالي :-

1-العامل الاول :- يتعلق بالمقطوعة الموسيقية نفسها ، مثلا هل تعزف الموسيقى آلة واحدة ام عدة الات ، ومدى ايقاع المقطوعة ( سريعة ، بطيئة ) او بدون ايقاع

2- العامل الثاني :- يتعلق بالمريض نفسه كحالته الصحية وعمره وثقافته وجنسه

3-العامل الثالث :- هو الجو المحيط بالمريض اثناء الاستماع مثل الديكور والالوان والتهوية ، وكلها عناصر تؤثر على درجة التركيز وبالتالي استجابة المريض لصفات الانغام الموسيقية (المصري، 2010، مصدر انترنت) .

ويرى العلماء السلوكيين ان الدور الذي تلعبه الموسيقى في العلاج هو انها تعمل على رفع معنويات المريض مما يساعد في عملية علاجه ، كذلك فان الموسيقى تعد كعامل ترفيهي لتشجيع المريض للتعبير ، وبهذه الطريقة فان المعالج يستطيع ان يثير او يهدئ الانفعالات الثائرة او يحفز الروح المعنوية الهابطة عن طريق انواع الموسيقى المثيرة او الهادئة ( الحداد ، 7,2007 ) .

### ثالثا :- النظرية الفسيولوجية

لقد ثبت علميا في الوقت الحاضر ان ذبذبات الموسيقى تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي ، اذ تؤثر كل ذبذبة او اكثر على جزء ما بالمخ خاص بعصب ما ، مما يسهم في اتاحة الفرصة للشخص المستمع كي يسترخي وهو ما يطلق عليه علماء هذه النظرية بعملية ( التخدير الطبيعي ) وتتيح هذه الحالة استجماع الارادة للتغلب على مسببات الالم ، فيبدأ الجسم في تنشيط المضادات الطبيعية والافرازات الداخلية التي تساعد الجهاز المناعي وغيره على التغلب على مصدر العلة ومكانها (عزت ، 2010، مصدر انترنت).

ومن خلال سلسلة من الدراسات للطبيب والمعالج الموسيقي (Berlyne) اكد باننا عندما نستمع الى الموسيقى فانها تحدث نشاطا عصبيا في جذع الدماغ (brain stem) وتحت المهد (hypothalamus) والتكون الشبكي (reticular formation)، وكل له دوره في اثارة العواطف ، كما قام بعض الاطباء في معهد مونترال للاعصاب في كندا باجراء اختبار دقيق عن الاستجابات العاطفية للموسيقى فاظهرت النتائج ان هناك مناطق متعددة من الدماغ تستجيب الى الاصوات الموسيقية المتناغمة المفرحة وكذلك الى الاصوات الموسيقية المتضاربة ، هذا النوع من البحوث ساعد العلماء على فهم الطريقة التي تتمكن بها انواع شتى من الموسيقى في معالجة انواع متعددة من الاضطرابات العصبية والنفسية (حسن، 2001، 34).

ان الموسيقى تنشط جريان المواد المخزونة في النصف الايسر من الدماغ عبورا من خلال الجسم الثقني (corpus callosum) حتى يتمكن نصف الدماغ الايمن والايسر من العمل بصورة متناغمة بدلا من الاختلاف ، اذ ان ادراك الموسيقى تكون مختلفة بين نصفي الدماغ . فالنصف الايمين يكون مسؤولا عن تمييز النغمة ، الاحساس الكلي بالحن ، الایقاع والنوع . اما النصف الايسر فيكون مسؤولا عن التفكير التحليلي وخصوصا الوظائف اللغوية والحسابية ، ولأن الموسيقى غير كلامية بطبيعتها فان تأثيرها يكون في النصف الايمين ، بينما الكلام التقليدي الذي يستخدمه الطبيب في اثناء العلاج مع المريض له تأثير الاساسي على الدماغ الايسر المنطقي ، لذا فان العلاج بالموسيقى يزوينا بوسائل الاتصال بين نصفي الكرة الدماغية (Platel, 1997, 230).

ان للموسيقى تأثير عضوي فعال ، فعند دخولها الى مركز السمع في القشرة الدماغية تنتقل مباشرة الى مركز الانفعالات النفسية الرئيسي والذي يتحكم بكافة العواطف والاستجابات الوجدانية وكذلك في تنظيم الاستجابات البيولوجية والنفسية (القطبي، 2010، مصدر انترنت) اذ تتأثر مجموعة متنوعة من الاستجابات الفسيولوجية بتأثير الموسيقى مثل نبضات القلب والاواعية الدموية والجهاز التنفسى ، وذلك لأن الموسيقى على اتصال مع حواسنا اكثر من اي عامل اخر من خلال المعلومات التي تصل اليها عن طريق المستقبلات السمعية في الخلايا العصبية وبالتالي تؤثر في داخلنا نوعين من الاحاسيس في شكل مجموعة من المشاعر ذات قطبين مختلفي السلبية والابيجابية (Апанасенко, 2011, 33).

ان نقطية العلاج بالموسيقى في الطب تستخدم الالساليب العلاجية بنوعيها (الاستقبالية والنشطة) مع المرضى ، اذ يفيد الاسلوب (الإسلامي) مع مرضى كبار السن في اثناء وقبل العمليات الجراحية ، من خلال الاستماع للموسيقى لمدة خمس دقائق . حيث اثبتت الدراسات وجود تحسن بنسبة (30%) لدى كبار السن ، حيث لوحظ انخفاض في القلق ومعدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم عند طول الاقامة في المستشفى. (Johnston, 1996, 54).

كما ثبت في الوقت الحاضر ان التحفيز الموسيقي له فوائد كبيرة لاطفال الخدج وذلك من خلال تحسين المعلومات الفسيولوجية والسلوكية للخدج ، من خلال الاستماع للموسيقى المرتجلة او المسجلة لمدة ثلاثة أيام متتابعة ( 20 ) اذ وجد تنظيم في معدلات ضربات القلب وتنفس الاوكرجين مع زيادة في الوزن ، وذلك نتيجة الاستماع للموسيقى لمدة ( 30 ) دقيقة للموسيقى ، حيث ساعدت الموسيقى على النوم العميق والاستيقاظ الهادئ بدل اظهار سلوك الضيق والبكاء ( Arnon, 2006,131)

وايضا ثبت علميا ان الاستماع للموسيقى المرتجلة ( الموسيقى المعروفة امام المريض ) من خلال عزف المعالج للمريض بعض الاغانى تجلب الشفاء والمتعة للمريض وتساعده على الاسترخاء ، حيث يعمل الایقاع الموسيقى من خلال العزف على تنظيم وظائف الجسم والحد من التوتر واستعادة درجة حرارة الجسم الطبيعية وتنظيم النوم وعمليات التمثيل الغذائى ومعدل التنفس . ( Roussos , 2008,Internt

وتستخدم الموسيقى كوسيلة لتحفيز المهارات الاجتماعية والاتصالية والمعرفية لاطفال التوحد وكبار السن . ( Chou, 2008,Internt )

حيث ان المحفزات الموسيقية يمكن ان تعزز المرونة العصبية في الدماغ ، والتغييرات الوظيفية في الخلايا العصبية ، ولقد اكد الاطباء ان العلاج بالموسيقى فعال في علاج الخلل الحسي والحركي والمعرفي بسبب بعض الامراض العصبية في الجهاز العصبي البشري ، لذا قاموا باستخدام هذا النوع من العلاج مع مرضى التوحد وبعض حالات الخلل العصبي لدى كبار السن مثل السكتة الدماغية ومرضى باركنسون والزهايمر وشلل الدماغ وغيرها من الامراض العصبية .

( LaGasse,B,2012,153 )

هناك عنصرين مهمين في الموسيقى يمكن ان يساعدان في علاج الخلل العصبي لدى هولاء المرضى ( التوحد والزهاي默 وشلل الدماغ .....الخ ) وهم الایقاع والصوت . فالالیقاع يمكن ان يسهل وظيفة نشاط المهارات الحركية ويمكن ايضا استعادة وظيفة مهارات الكلام والمهارات المعرفية المسؤولة عن تنظيم المعرفة الزمانية والمكانية ، اما الصوت فيعمل على اثارة الخلايا العصبية الحركية في العمود الفقري التي تصل بواسطة الاتصالات السمعية والحركية في جذع الدماغ والحلق الشوكي وهذا التاثير يجعل الجهاز الحركي في حالة استعداد ومن ثم سهولة تنفيذ . الحركات ( THAUT, M,2005,Internt )

وبعد عرض النظريات رأت الباحثة انها تمثل تفسير تكاملي في سبب استجابة المرضى للانواع المختلفة للموسيقى اثناء استماعهم لها ، ووفقا لذلك فقد تبنت الباحثة التفسير التكاملي لهذه النظريات .

### الفصل الثالث

#### منهجية البحث واجراءاته

##### اولا : - مجتمع البحث

اقتصر مجتمع البحث على طلاب وموظفي الجامعة البيilarوسية الحكومية الساكنين في الاقسام الداخلية والبالغ عددهم ( 5125 ) ، الواقع ( 2855 ) طالبا ، و ( 2270 ) موظفا . والذين ينقسمون حسب الجنس الى ( 2185 ) شخصا من الذكور، و ( 2940 ) شخصا من الإناث .

##### ثانيا : - عينة البحث

اختارت الباحثة بطريقة قصدية عينة البحث من القسم الداخلي رقم ( 10 ) التابع الى الجامعة البيilarوسية الحكومية وذلك لكثره عدد الاشخاص الساكنين فيه حيث يبلغ عدد افراده ( 936 ) طالبا ، و ( 189 ) موظفا ، اضافة الى مكان سكناها . حيث بذلت الباحثة في البحث عن عينة بحثها الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع والمنخفض من بداية تاريخ ( 24.01.2012 ) الى نهاية تاريخ ( 01.03.2012 ) وبعد ان حصلت الباحثة على عينة تبلغ ( 36 ) من الذين يعانون من ضغط الدم بواقع ( 17 ) فردا من الضغط المرتفع ، ( 19 ) فردا من الضغط المنخفض . المقسمين الى ( 16 ) فردا من الذكور ، و ( 20 ) فردا من الإناث . ولأجل القيام بتجربتها في المقارنة بين مرضى ضغط الدم والاسوياء في استجابتهم لانواع الموسيقى ، قامت بسحب عينة مقدارها ( 28 ) فردا من ذوي الضغط المرتفع والمنخفض بواقع ( 14 ) فردا من ذوي الضغط المرتفع ، و ( 14 ) فردا من ذوي الضغط المنخفض . مقسمين بالتساوي الى ( 14 ) فردا من الذكور ، و ( 14 ) فردا من الإناث . ثم قامت الباحثة بالبحث على عينة من الاسوياء اثناء اصابتهم ببعض الامراض الشائعة البسيطة ( الانفلونزا والسعال ) والتي عادة تكثر في فصل الشتاء ، حيث اختارت الباحثة ايضا عينة مشابهة للعينة الاولى . وبذلك حصلت الباحثة على عينة بحثها البالغة ( 56 ) شخصا من المرضى والعاديين والجدول ( 1 ) يوضح ذلك .

#### توزيع افراد عينة البحث

المجموع	الاسوياء	مرضى ضغط الدم	الجنس	الوظيفة
28	14	14	ذكور	موظفي
28	14	14	إناث	
56	28	28		المجموع
28	14	14	ذكور	طلبة
28	14	14	إناث	
56	28	28		المجموع

## ثالثا : - اداة البحث

نظراً لعدم توفر اداة لقياس انواع مواصفات الموسيقى ( محلية او عربية او أجنبية ) ، وعدم وجود مقياس مقنن على البيئة البيلاروسية ، في حدود علم الباحثة فقد تطلب الامر منها بناء مقياس باللغة الروسية يتسم بالصدق والثبات وذلك من اجل تطبيقه على المجتمع البيلاروسي .

**خطوات بناء المقياس :-**

**اولا:- التخطيط للمقياس**

اجري التخطيط للمقياس في ضوء مراجعة الادبيات السابقة التي اشارت الى مواصفات انواع الموسيقى المناسبة في علاج المرضى .

ثانيا : - صياغة فقرات المقياس وتعد هذه القاعدة احدى الخطوات الرئيسية الواجب اتباعها في بناء اي مقياس (Allen&yen, 1979, 118) ولقد بلغ عدد فقرات هذا المقياس من (29) فقرة ومن اجل اعتماده للتطبيق تم اتباع ما يلي :-

**1- طريقة بناء المقياس :-**

اعتمدت الباحثة في تصميم المقياس على الاوزان الثانية (نعم ، لا) ، اذ يتم اعطاء الدرجات ( 1,0 ) على كل استجابة

**2- صلاحية الفقرات :-**

للتعرف على صلاحية الفقرات ( الصدق الظاهري ) فقد عرض المقياس مع النغمات الموسيقية

بصورتها الاولية على مجموعة من الخبراء المتخصصين (dvork),(Mozart),(straus)

في علم النفس والطب النفسي مع تعريف لكل منها وعرض مختصر لاهداف البحث ، وطلب من الخبراء الحكم على صلاحية الفقرات . ومن خلال تحليل اجابات الخبراء باستخدام مربع كاي كما هو موضح في جدول (2) اتضح موافقتهم جميعاً على الفقرات والالحان الموسيقية .

## جدول (2)

## اراء المحكمين في صلاحية فقرات مقياس انواع الصفات الموسيقى

1-dvork(mstislav Rostropovich-III,adagio,ma non troppo,2004,12 :56m)				
الدلاله الاحصائية	قوة كاي المستخرجة	المعارضون	المواافقون	رقم الفقرة
دالة	8	0	8	1,2,5,6,8,9,10,13,14,15, 18, 20 ,23,27,28
دالة	4,5	1	7	3,4,7,11,12,16,17,19,21, 22,24,25,26,29.
2-mozart (andante,1999, 06:41m)				
الدلاله الاحصائية	قوة كاي المستخرجة	المعارضون	المواافقون	رقم الفقرة
دالة	8	0	8	2,3,6,7,8,10,11,12,13 ,14,15,19,20,24,25
دالة	4,5	1	7	1,4,5,9,16,17,18,21, 22,23,26,27,28,29
3-Straus(classical prestige,2000,11:57m)				
الدلاله الاحصائية	قوة كاي المستخرجة	المعارضون	المواافقون	رقم الفقرة
دالة	8	0	8	1,2,3,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17,19,20,22. 23,24,25,26,29
دالة	4,5	1	7	4,6,10,13,18,21,27,28

القيمة الجدولية لمربع كاي عند مستوى دلالة (0,05) ودرجة حرية (1) = 3,84

- 3 - اعداد تعليمات المقياس:

روعي عند اعداد التعليمات ان تكون سهلة ومفهومة وتؤكد ضرورة اختيار البديل المناسب عند الاستجابة

- 4 - تصحيح المقياس :

ويقصد به وضع درجة لاستجابة كل فرد على كل فقرة من فقرات المقياس ، ومن ثم جمع هذه الدرجات ، وقد تم تصحيح اجابات افراد العينة على فقرات المقياس بالاوزان (1,0) وبذلك بلغت اعلى درجة يمكن ان يحصل عليها الفرد (29) وادنى درجة (0) والمتوسط الفرضي (14,5).

## -5- الدراسة الاستطلاعية :-

لأجل التأكيد من وضوح فقرات المقاييس من حيث الصياغة والمعنى وكذلك مدى وضوح التعليمات وبدائل الإجابة، وأيضاً مدى رغبة الأفراد للاستماع إلى الموسيقى تم إجراء دراسة استطلاعية قامت فيها الباحثة باختيار (8) من الأفراد بواقع (4) فرداً من الطلاب و(4) فرداً من الموظفين وذلك للتأكد من فعالية بدائل المقاييس والكشف عن الصعوبات التي يمكن أن تواجه المستجيب والباحثة أثناء الاستماع للموسيقى لغرض تلافيها قبل تطبيق المقاييس، وقد تبين من هذا التطبيق أن التعليمات والفقرات وبدائل الإجابة واضحة ومفهومة لأفراد العينة بالإضافة إلى أن الموسيقى المختارة كانت ملائمة لرغبتهم.

## رابعاً : - التحليل الاحصائي للفقرات (عينة البناء)

## 1- القوة التمييزية للفقرات :-

يقصد بالقوة التمييزية للفقرة قدرتها على التمييز بين ذوي المستويات العليا والدنيا من الأفراد في الخاصية التي تقيسها الفقرة (Show, 1967, 450). ويُكاد يتفق أصحاب القياس النفسي على أن القوة التمييزية للفقرات تعد من أهم الخصائص القياسية التي ينبغي التحقق منها لفقرات المقاييس النفسية (عبد الحفيظ 2000، 112)، ولتحقيق ذلك طبقت الباحثة المقاييس بصورة عشوائية على عينة مكونة من (150) موظفاً وطالباً من أفراد القسم الداخلي.

وبعد الحصول على الدرجات الكلية لأفراد عينة التحليل الاحصائي ، رتبت الدرجات ترتيباً تنازلياً من أعلى درجة كلية إلى أدنى درجة كلية على مقياس البحث الحالي ، ومن ثم حددت (27%) من الدرجات العليا ، و (27%) من الدرجات الدنيا وذلك لتحديد المجموعتين بأفضل ما يمكن من حجم وتمايز (السيد ، 1979، 642). وقد بلغ عدد الأفراد في كل مجموعة (41) فرداً.

وتعد قيمة مربع كاي لاختبار دلالة الفروق الاحصائية بين متوسط درجات المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة من فقرات المقاييس والبالغ عددها (29) فقرة. وان قيمة مربع كاي المحسوبة تدل على القوة التمييزية لكل فقرة ، ولقد تبين كما موضح في جدول رقم (3) ان جميع الفقرات دالة احصائياً ما عدا الفقرات الآتية :-

1-dvork(12,17)

2- Mozart(4,6)

لان قيمة مربع كاي المحسوبة هي اصغر من قيمة مربع كاي الجدولية البالغة (3,83) عند مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية (1)

## 2 - معامل صدق الفقرات :-

ويمكن حسابه عن طريق ايجاد معامل الارتباط بين كل فقرة وبين الاداة ككل . ولذا فان الفقرة تكون صادقة اذا كان معامل الارتباط بينها مبين الاداة الكلية عاليًا (عباس ، 2009، 265). لذا استخدمت الباحثة معامل ارتباط بويت باسرياً بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجيب . وبعد اسحصال النتائج ومقارنة معاملات الارتباط المحسوبة بالقيمة الحرجية لمعامل الارتباط ، اظهرت النتائج ان جميع الفقرات دالة احصائياً ما عدا الفقرات التي اظهرت عدم تمييزها سابقاً . والجدول رقم (4) يوضح ذلك

## جدول (4)

## معامل الارتباط بين الفقرة والدرجة الكلية لمقياس انواع مواصفات الموسيقى

معاملات تميز الالحان الموسيقية			اسم الفقرة	ت	معاملات تميز الالحان الموسيقية			اسم الفقرة	ت
dvork	mozart	Straus			dvork	mozart	starus		
0.099*	0.443	0.323	بدون معنى	17	0.500	0.442	0.399	هادئة	1
0.453	0.399	0.230	محذفة	18	0.323	0.521	0.344	حزينة	2
0.349	0.241	0.370	بدون فائدة	19	0.411	0.399	0.287	مؤلمة	3
0.438	0.332	0.401	مبكية	20	0.199	0.049*	0.421	مخيلة	4
0.251	0.323	0.445	قصيرة	21	0.504	0.263	0.287	مشيرة	5
0.308	0.511	0.378	طويلة	22	0.424	0.022*	0.255	كتيبة	6
0.242	0.525	0.232	ممتعة	23	0.522	0.321	0.243	مقافية	7
0.303	0.291	0.399	مؤثرة	24	0.241	0.108	0.303	الهامية	8
0.243	0.352	0.554	منسية	25	0.333	0.430	0.411	ادراكية	9
0.366	0.298	0.321	مخيفة	26	0.230	0.416	0.525	توعيدية	10
0.383	0.448	0.331	سرورية	27	0.489	0.233	0.242	حالمية	11
0.263	0.424	0.087	رمزية	28	0.018*	0.461	0.438	مسترخية	12
0.262	0.275	0.377	سهلة	29	0.281	0.290	0.355	مبهجة	13
					0.241	0.235	0.265	سريعة الدخول	14
					0.418	0.333	0.375	مشوشة	15
					0.334	0.422	0.347	منشطة	16

• القيمة الجدولية تساوي 0.113 عند مستوى 0.05 ودرجة حرية (148)

الخصائص السيكومترية للمقياس :-

تشير أدبيات القياس النفسي إلى عدد من الخصائص القياسية (السيكومترية) التي يمكن أن تستخدم كمؤشرات لدقة المقاييس النفسية ، إذ يكاد علماء القياس النفسي والمتخصصون فيه يجمعون على أن خاصيتي الصدق والثبات هي من أهم الخصائص السيكومترية للمقاييس النفسية على الرغم من أن الصدق أكثر أهمية من الثبات ، لأن المقياس الصادق بطبيعته يكون ثابتا ، في حين أن المقياس الثابت قد لا يكون صادقا ، إذ قد يكون متجانسا ومتافقا في فقراته لكنه يقيس خاصية أو سمة أخرى غير التي أعد لقياسها (فرج، 1980، 33)

#### أ- صدق المقياس :

يعد الصدق من أهم الخصائص السيكومترية للاختبار ، أو الخاصية التي أعد لقياسها وعدم الفصل التأثيره بالمتغيرات الأخرى (القمشى والمعايهطة، 2000، ص 109). وتعد جوانب الصدق من أهم خصائص الاختبارات والمقاييس النفسية والتربوية(علام ، 2000، ص 186). لذا استخرجت الباحثة للمقياس الحالى نوعين من الصدق هما:

#### 1- الصدق الظاهري :

ويتم التوصل إليه من خلال حكم الخبراء على درجة قياس الاختبار للسمة المقاسة. وبما أن هذا الحكم يتصرف بدرجة من الذاتية ، لذلك يعطى الاختبار لأكثر من محكم . يمكن تقييم درجة الصدق الظاهري للاختبار من خلال التوافق بين تقديرات المحكمين . لذلك عرضت الباحثة المقياس على عدد من الخبراء والمتخصصين في الطب النفسي وعلم النفس وقد اتضحت صلاحية الفقرات . (عوده، 1992، ص 157) .

#### 2- صدق البناء :

ويشار إلى صدق المفهوم بصدق البناء أو التكوين الفرضي ويتمثل بالدرجة التي تقيس بها الآداة افتراضات السمة أو المفهوم التي بنيت لقياسها ، حيث يفترض أن كل آداة تبني على أساس نظرية معينة يمكن استخدامها في التنبؤ بأداء الفرد وعندما تكون هذه الآداة صادقة صدق بناء(عباس، 2009 ، ص 264) .

ولحساب معامل الارتباط بين درجات أفراد العينة على كل فقرة من فقرات المقياس ودرجاتهم الكلية استخرجت الباحثة معامل ارتباط بوينت باي سerial بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية على المقياس . وبعد استحصال النتائج ومقارنة معاملات الارتباط المحسوبة بالقيمة الجدولية لمعامل الارتباط تبين أن جميع الفقرات دالة إحصائيا باستثناء الفقرات ( 12,17 ) من فقرات (dvork) . والفقرات ( 6,4 ) من فقرات (Mozart) . وبذلك أصبح المقياس يتصرف بالصدق البناءي وفقا لهذا المؤشر .

## ب- ثبات المقياس :

الثبات هو دقة القياس أو الملاحظة وعدم تناقضه مع نفسه واتساقه فيما يزودنا من المعلومات عن سلوك الفرد ، والهدف من حساب الثبات هو تحديد أخطاء القياس وإيجاد طرق تقلل من هذه الأخطاء ، وبذلك يعد الثبات من الخصائص السيكومترية المهمة للمقاييس النفسية ، فهو يعطي الاتساق في فقرات المقاييس في قياس ما وضع لقياسه بصورة منتظمة (السعادي ، 2006، ص92). ولغرض الحصول على الثبات اعتمدت الباحثة على طريقة الفا للاتساق الداخلي وتستخدم هذه الطريقة في إيجاد معامل الثبات للاختبارات ذات الفقرات الموضوعية وغير الموضوعية. وتعد من أكثر الطرق شيوعا ، إذ تمتاز بتنسيقها وإمكانية الوثوق بنتائجها ، وتعتمد هذه الطريقة على حساب الارتباط بين درجات جميع فقرات المقاييس على اعتبار أن كل فقرة عبارة عن مقياس ذاته ويؤثر معامل الثبات في اتساق أداء الأفراد أي التجانس بين فقرات المقاييس ، وتعطي هذه الطريقة الحد الأعلى الذي يمكن أن يصل إليه معامل الثبات (عباس 2009 ص 270) .  
ويهدف التعرف على أعلى درجة في الثبات يمكن أن يصل إليه المقياس تم حساب الثبات بهذه الطريقة ويبلغ معامل الثبات في كل فقرات انواع صفات الموسيقى وفق الاتي :-

1-dvork(0.77) 2-mozart(0.79) 3-Straus (0.84)

## خامسا : - التطبيق النهائي للمقياس

ولغرض التحقق من اهداف البحث الحالي . فقد طبقت الباحثة المقياس وبالبالغ عدد فقراته بالنسبة للموسيقى (dvork,27) فقرة ، وموسيقى (Mozart,27) فقرة ، وموسيقى (straus,29) فقرة . على عينة البحث الرئيسية والبالغة ( 56 ) موظفا وطالبا ، وكان عدد بدائل المقياس ثنائية ( نعم / لا ) والتي اعطيت الاوزان ( 0/1 ) .

## سادسا : - اجراءات تطبيق المقارنة

بعد ان عرضت الباحثة فقرات مقاييس انواع صفات الموسيقى مع النغمات الموسيقى على الخبراء ، قامت بالبحث اولا عن المرض الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع والمنخفض ، وبعد ان وجدتهم قامت بتطبيق فقرات المقياس مع الاستماع للموسيقى عليهم وهم في ظروف العمل وفي حالة تناولهم الادوية لمدة ثلاثة ايام ، ثم قامت بالبحث عن عينة من الاسويء مصابين ببعض الامراض البسيطة الشائعة (الانف والحنجرة) وطبقت عليهم فقرات المقاييس ايضا لمدة ثلاثة ايام وهم في نفس الظروف ومن نفس العدد والجنس والوظيفة . والجدارول رقم (5,6,7) توضح تكافؤ العينتين في متغيرات .

البحث .

## - 1 - متغير الجنس :

قامت الباحثة بمكافأة المجموعتين في متغير الجنس . وبذلك انتفت الحاجة الى الوسائل الاحصائية فيها اذ ظهر ان مربع كاي فيها يساوي صفر أي ان المجموعتين التجريبية والضابطة متكافئتان في هذا المتغير ، والجدول ( 5 ) يوضح ذلك

جدول رقم (5)

## تكافؤ المجموعتان في متغير الجنس

العينة الجنس	مرضى ضغط الدم	الاسوياء	عدد افراد العينة
الذكور	14	14	28
الإناث	14	14	28
م	28	28	56

## 3 - متغير الوظيفة

قامت الباحثة بمكافأة المجموعتين في متغير الوظيفة . وبذلك انتفت الحاجة الى الوسائل الاحصائية فيها اذ ظهر ان مربع كاي فيها يساوي صفر أي ان المجموعتين التجريبية والضابطة متكافئتان في هذا المتغير ، والجدول ( 6 ) يوضح ذلك

## جدول رقم (6)

## تكافؤ العينة في متغير الوظيفة

العينة الوظيفة \ العينة	مرضى ضغط الدم	الاسوياء	عدد افراد العينة
موظفين	14	14	28
طلاب	14	14	28
م	28		56

وبعد عملية التكافؤ استطاعت الباحثة اجراء عملية المقارنة على العينة نفسها وهم في ظروف (عدم تناول الادوية ، استراحة العمل ) لمعرفة نوعية استجابتهم في كلا الحالتين . والذي سيتم توضيحه

في الفصل الرابع

سابعا :- الوسائل الاحصائية

1 - اختبار مان - وايتي Mann-Whitney لاستخراج الدلالة الاحصائية للفروق بين المجموعتين.--(Gibbons, 1971, p. 166-167)

2 - معامل ارتباط بوينت باي سيربال لاستخراج صدق البناء (برى، 2007 ، 460).

3 - مربع كاي لاستخراج التمييز بين الفقرات ، ولتحقيق التكافؤ بين عيني البحث واستخراج صدق المحكمين (عودة، 1992، 289).

4-الفا كرونباخ : لحساب الثبات للمقياس ككل (الانصاري، 2000، 81).

## الفصل الرابع

### عرض النتائج ومناقشتها

يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت اليها الباحثة بعد تطبيق التجربة على افراد العينة (المرضى والاسوياء) ، وبعد تطبيق مقياس نوع مواصفات الموسيقى اظهرت النتائج ما ياتي :-

اولاً متغير الجنس (الذكور)

موسيقى (Straus)

A- التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الذكور مع الاسوياء على نوع صفات الموسيقى (Straus). في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ):-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الذكور في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ) بلغ ( 20.1 ) . ومتوسط درجات الاسوياء بلغ ( 20.3 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (Straus).

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الذكور مقاربة من درجات المجموعة الاسوياء ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 92.5 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة والبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لانوع صفات الموسيقى والجدول (7) يوضح

## جدول رقم ( 7 )

درجات الذكور من المجموعتين ( المرضى والاسوياء ) في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ) على فقرات مقياس موسيقى ( Straus ) .

دالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي		الاسوياء		المرضى		ت		
		الدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة			
غير دالة	0.05	55	92.5	25.5	24	19.5	22	1		
				12	20	1	14	2		
				7.5	18	6	17	3		
				3	15	25.5	24	4		
				12	20	7.5	18	5		
				5	16	12	20	6		
				23	23	16	21	7		
				12	20	19.5	22	8		
				27.5	25	27.5	25	9		
				19.5	22	16	21	10		
				16	21	3	15	11		
				19.5	22	23	23	12		
				23	23	12	20	13		
				3	15	9	19	14		
				----	20.3	----	20.1	المتوسط الحسابي		
				208.5		197.5		مجموع الرتب		

B-التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الذكور مع الاسوياء على نوع صفات الموسيقى ( Straus ). في المرحلة الثانية ( عدم تناول الادوية واستراحة العمل ):-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الذكور في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ) بلغ (20.71) . ومتوسط درجات الاسویاء بلغ (20.21) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (Straus).

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الذكور مقاربة من درجات المجموعة الاسویاء ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 94 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة وبالبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية . أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لانوع صفات الموسيقى والجدول(8) يوضح ذلك

#### جدول رقم ( 9 )

درجات الذكور من المجموعتين ( المرضى والاسویاء ) في المرحلة الثانية ( عدم تناول الادوية واسترحة العمل ) على فقرات مقياس موسيقى (Straus)

دلة الفروق	مستوى الدلاله	قيمة ي		الاسویاء		المرضى		ت
		الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة	
غير دالة	0.05	55	94	13	20	1.5	14	1
				15.5	21	1.5	14	2
				9	18	7	17	3
				3.5	15	23.5	24	4
				9	18	9	18	5
				5.5	16	27	28	6
				20.5	23	15.5	21	7
				23.5	24	20.5	23	8
				25.5	25	25.5	25	9
				17.5	22	13	20	10
				17.5	22	3.5	15	11
				13	20	20.5	23	12
				20.5	23	28	29	13
				5.5	16	11	19	14
				---	20.21	---	20.71	المتوسط الحسابي
				199		207		مجموع الرتب

٢ - موسيقى (Mozart)

التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الذكور مع الاسويء على نوع صفات الموسيقى (mozart). في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل) :-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الذكور في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل) بلغ ( 22.57 ) . ومتوسط درجات الاسويء بلغ ( 19.92 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (.)

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الذكور اكبر من درجات المجموعة الاسويء ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 46.5 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة والبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اقل من القيمة الجدولية، أي وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لانوع صفات الموسيقى ولصالح المجموعة المرضى والجدول ( 9 ) يوضح

#### جدول رقم ( 9 )

درجات الذكور من المجموعتين ( المرضى والاسويء ) في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل) على فقرات مقياس موسيقى (mozart)

دلالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي الجدولية	المساوية	الاسواء	المرضى			
				الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة	ت
دالة	0.05	55	46.5	11.5	20	26	25	1
				11.5	20	7	19	2
				3.5	18	26	25	3
				11.5	20	23	24	4
				11.5	20	3.5	18	5
				1	16	7	19	6
				15.5	21	23	24	7
				3.5	18	11.5	20	8
				19.5	23	26	25	9
				17	22	19.5	23	10
				15.5	21	11.5	20	11
				7	19	19.5	23	12
				19.5	23	23	24	13
				3.5	18	28	27	14
				---	19.92	---	22.57	المتوسط الحسابي
				151.9		254.5		مجموع الرتب

B- التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الذكور مع الاسوياء على نوع صفات الموسيقى (mozart). في المرحلة الثانية (عدم تناول الادوية واستراحة العمل ):-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الذكور في المرحلة الثانية (عدم تناول الادوية واستراحة العمل ) بلغ ( 21.93 ) . ومتوسط درجات الاسوياء بلغ ( 20.64 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (.) (mozart)

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الذكور مقاربة من درجات مجموعة الاسوياء ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-واينتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 74 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة وبالبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لانوع صفات الموسيقى. والجدول (10) يوضح ذلك

## جدول رقم ( 10 )

درجات الذكور من المجموعتين ( المرضى والاسوياء ) في المرحلة الثانية (عدو تناول الادوية واستراحة العمل ) على فقرات مقياس موسيقى (mozart)

دالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي		الاسوياء		المرضى		ت
		الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة	
غير دالة	0.05	55	74	22.5	24	22.5	24	1
				10.5	20	5.5	18	2
				5.5	18	3	17	3
				1	15	25	25	4
				10.5	20	5.5	18	5
				3	17	16	22	6
				20	23	25	25	7
				10.5	20	16	22	8
				25	25	27.5	26	9
				16	22	16	22	10
				10.5	20	7	19	11
				16	22	20	23	12
				20	23	10.5	20	13
				10.5	20	27.5	26	14
				---	20.64	---	21.93	المتوسط الحسابي
				181.5		227		مجموع الرتب

## 3- موسيقى (dvork)

A- التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الذكور مع الاسوياء على نوع صفات الموسيقى (dvork) في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ):-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الذكور في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ) بلغ ( 21.28 ) . ومتodoسط درجات الاسوياء بلغ ( 20.64 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (dvork).

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الذكور مقاربة من درجات المجموعة الاسوياء ، ولغرض التعرف على دالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 94.5 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية

الواحدة والبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لانوع صفات الموسيقى والجدول (11) يوضح

### جدول رقم ( 11 )

درجات الذكور من المجموعتين ( المرضى والاسوياء ) في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ) على فقرات مقياس موسيقى (dvork)

دلالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي		الاسویاء		المرضى		ت
		الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة	
غير دالة	0.05	55	94.5	25	24	19	22	1
				8	20	5	19	2
				8	20	5	19	3
				1	15	25	24	4
				8	20	3	18	5
				2	17	25	24	6
				22	23	16	21	7
				8	20	19	22	8
				27.5	25	27.5	25	9
				19	22	16	21	10
				16	21	8	20	11
				5	19	22	23	12
				22	23	8	20	13
				8	20	8	20	14
				---	20.64	---	21.28	المتوسط الحسابي
				179.5		206.5		مجموع الرتب

B- التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الذكور مع الاسویاء على نوع صفات الموسيقى (dvork) في المرحلة الثانية (عدم تناول الادوية واستراحة العمل) :-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الذكور في المرحلة الثانية (عدم تناول الادوية واستراحة العمل) بلغ ( 21.71 ) . ومتوسط درجات الاسویاء بلغ ( 20.14 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (dvork) .

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الذكور اكبر من درجات المجموعة الاسوية ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 53.5 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة والبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اقل من القيمة الجدولية، أي وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لانوع صفات الموسيقى ولصالح المجموعة المرضى . والجدول ( 12 ) يوضح ذلك

### جدول رقم ( 12 )

درجات الذكور من المجموعتين ( المرضى والاسوية ) في المرحلة الثانية ( عدم تناول الادوية واستراحة العمل ) على فقرات مقياس موسيقى (dwork)

دلالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي الجدولية	المساوية	الاسوية		المرضى		ت
				الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة	
دلالة	0.05	55	53.5	20	20	18.5	22	1
				20	20	3	18	2
				7.5	19	7.5	19	3
				1	15	24	24	4
				20	20	24	24	5
				7.5	19	20	20	6
				21.5	23	16	21	7
				3	18	18.5	22	8
				24	24	26.5	25	9
				18.5	22	26.5	25	10
				7.5	19	7.5	19	11
				18.5	22	28	26	12
				21.5	23	20	20	13
				3	18	7.5	19	14
				---	20.14	---	21.71	المتوسط الحسابي
				193.5		247.5		مجموع الرتب

2: متغير الجنس ( الاناث )

1-موسيقى (Straus)

A-التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الإناث مع الأسواء على نوع صفات الموسيقى (Straus). في المرحلة الأولى (تناول الأدوية والعمل) :-

أظهرت النتائج أن متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الإناث في المرحلة الأولى (تناول الأدوية والعمل) بلغ (20.1). ومتوسط درجات الأسواء بلغ (20.3) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (Straus).

ومن خلال المتوسطات يلاحظ أن درجات مجموعة المرضى من الإناث مقاربة من درجات المجموعة الأسواء ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الإحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، إذ اخذت القيمة الصغرى البالغة (64.5) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة (0.05) في اختبار ذي النهاية الواحدة والبالغة (55) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لنوع صفات الموسيقى والجدول (13) يوضح

### جدول رقم ( 13 )

درجات الإناث من المجموعتين (المريض والأسواء) في المرحلة الأولى (تناول الأدوية و العمل) على فقرات مقياس موسيقى (Straus)

دلالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي		الأسواء		المريض		ت
		الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة	
غير دلالة	0.05	55	64.5	20	22	5.5	18	1
				12.5	20	16	16	2
				5.5	18	12.5	20	3
				1	15	24	24	4
				12.5	20	5.5	18	5
				5.5	18	12.5	20	6
				22.5	23	26	25	7
				12.5	20	20	22	8
				26	25	26	25	9
				12.5	20	17.5	21	10
				17.5	21	8	19	11
				20	22	22.5	23	12
				12.5	20	12.5	20	13
				3	17	28	26	14
				---	20.07	---	21.21	المتوسط الحسابي
				183.5		236.5		مجموع الرتب

B-التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الإناث مع الأسواء على نوع صفات الموسيقى (Straus). في المرحلة الثانية (عدم تناول الأدوية واستراحة العمل) :-

أظهرت النتائج أن متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الإناث في المرحلة الثانية (عدم تناول الأدوية واستراحة العمل) بلغ ( 20.36 ) . ومتوسط درجات الأسواء بلغ ( 19.71 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (Straus).

ومن خلال المتوسطات يلاحظ أن درجات مجموعة المرضى من الإناث مقاربة من درجات المجموعة الأسواء ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الإحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، إذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 85 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة والبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية . أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لنوع صفات الموسيقى والجدول (14) يوضح ذلك

جدول رقم ( 14 )

درجات الإناث من المجموعتين ( المرضى والسواء ) في المرحلة الثانية (عدم تناول الأدوية واستراحة العمل) على فقرات مقياس موسيقى (Straus)

دلالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي		السواء		المرضى		ن
		الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة	
غير دالة	0.05	55	85	14	20	21	22	1
				14	20	7.5	18	2
				7.5	18	5	17	3
				1.5	15	26	24	4
				14	20	7.5	18	5
				3.5	16	14	20	6
				24	23	18.5	21	7
				14	20	21	22	8
				27.5	25	27.5	25	9
				7.5	18	18.5	21	10
				14	20	1.5	15	11
				21	22	24	23	12
				24	23	14	20	13
				3.5	16	10	19	14
				---	19.71	---	20.36	المتوسط الحسابي
				166		216		مجموع الرتب

## 2-موسيقى (Mozart)

A-التعرف على الفروق على الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الإناث مع الأسواء على نوع صفات الموسيقى (mozart). في المرحلة الأولى (تناول الأدوية والعمل) :-

أظهرت النتائج أن متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الإناث في المرحلة الأولى (تناول الأدوية والعمل) بلغ ( 21.36 ) . ومتوسط درجات الأسواء بلغ ( 20.64 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى ( mozart ) ومن خلال المتوسطات يلاحظ أن درجات مجموعة المرضى من الإناث مقاربة من درجات المجموعة الأسواء ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، إذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 84.5 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية ( ي ) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة والبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لانواع صفات الموسيقى.

جدول رقم ( 15 )

والجدول ( 15 ) يوضح

درجات الإناث من المجموعتين ( المرضى والأسواء ) في المرحلة الأولى (تناول الأدوية والعمل ) على فقرات مقياس موسيقى ( Mozart )

دلالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي	الاسوأء		المرضى		ت	
			الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة		
غير دالة	0.05	55	84.5	24.5	24	18	22	1
				10.5	20	10.5	20	2
				4.5	18	2.5	17	3
				4.5	18	24.5	24	4
				10.5	20	6.5	19	5
				1	16	10.5	20	6
				21.5	23	15	21	7
				10.5	20	21.5	23	8
				27	25	27	25	9
				18	22	15	21	10
				15	21	6.5	19	11
				18	22	21.5	23	12
				21.5	23	10.5	20	13
				2.5	17	27	25	14
				---	20.64	---	21.36	المتوسط الحسابي
				189.5		216.5		مجموع الرتب

B-التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الإناث مع الأسواء على نوع صفات الموسيقى (mozart). في المرحلة الثانية (عدم تناول الأدوية واستراحة العمل) :-

أظهرت النتائج أن متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الإناث في المرحلة الثانية (عدم تناول الأدوية واستراحة العمل) بلغ ( 22.5 ) . ومتodoسط درجات الأسواء بلغ ( 20.64 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (.) (mozart)

ومن خلال المتوسطات يلاحظ أن درجات مجموعة المرضى من الإناث مقاربة من درجات مجموعة الأسواء ، وللทราบ على دلالة الفروق الإحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، إذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 63 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة وبالبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لنوع صفات الموسيقى. والجدول (16) يوضح ذلك

جدول رقم ( 16 )

درجات الإناث من المجموعتين ( المرضى والسواء ) في المرحلة الثانية (عدم تناول الأدوية واستراحة العمل ) على فقرات مقياس موسيقى (Mozart)

دلاله الفروق	مستوى الدلاله	قيمة ي		الاسوائاء		المرضى		ت
		الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة	
غير دلالة	0.05	55	63	22.5	24	27	26	1
				8.5	20	4	18	2
				4	18	28	27	3
				1.5	17	22.5	24	4
				8.5	20	15.5	22	5
				6	19	8.5	20	6
				19.5	23	12	21	7
				8.5	20	15.5	22	8
				25	25	25	25	9
				15.5	22	12	21	10
				12	21	4	18	11
				15.5	22	25	25	12
				19.5	23	19.5	23	13
				1.5	17	19.5	23	14
				---	20.64	---	22.5	المتوسط الحسابي
				168		238		مجموع الرتب

3-موسيقى (dvork)

A-التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الإناث مع الأسواء على نوع صفات الموسيقى (dvork) في المرحلة الأولى (تناول الأدوية والعمل ):-

أظهرت النتائج أن متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الإناث في المرحلة الأولى (تناول الأدوية والعمل ) بلغ ( 21.79 ) . ومتوسط درجات الأسواء بلغ ( 20.5 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (dvork) .

ومن خلال المتوسطات يلاحظ أن درجات مجموعة المرضى من الإناث مقاربة من درجات المجموعة الأسواء ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الإحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، إذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 75 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة وبالبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لأنواع صفات الموسيقى . والجدول (17) يوضح

جدول رقم ( 17 )

درجات الإناث من المجموعتين ( المرضى والسواء ) في المرحلة الأولى (تناول الأدوية والعمل ) على فقرات مقياس

دلالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي		السواء		المريض		ت
		الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة	
غير دالة	0.05	55	75	21.5	23	17.5	22	1
				9.5	20	9.5	20	2
				5	18	3	17	3
				3	17	24	24	4
				9.5	20	26	25	5
				1	16	9.5	20	6
				21.5	23	14	21	7
				9.5	20	17.5	22	8
				26	25	26	25	9
				17.5	22	14	21	10
				14	21	6	19	11
				17.5	22	21.5	23	12
				21.5	23	9.5	20	13
				3	17	28	26	14
				---	20.5	---	21.79	المتوسط الحسابي
				180		226		مجموع الرتب

B-التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الإناث مع الأسواء على نوع صفات الموسيقى (dvork) في المرحلة الثانية (عدم تناول الأدوية واستراحة العمل ):-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الاناث في المرحلة الثانية (عدم تناول الادوية واستراحة العمل ) بلغ (22.14) . ومتوسط درجات الاسویاء بلغ (20.57) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (dvork).

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الاناث اكبر من درجات المجموعة الاسویاء ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 61.5 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة وبالبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لنوع صفات الموسيقى . والجدول (18) يوضح ذلك

جدول رقم ( 18 )

درجات الاناث من المجموعتين ( المرضى والاسویاء ) في المرحلة الثانية (عدم تناول الادوية واستراحة العمل ) على فقرات مقياس موسيقى (dvork)

دلالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي		الاسویاء		المرضى		ت
		الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة	
غير دالة	0.05	55	61.5	8.5	20	28	27	1
				8.5	20	18.5	22	2
				2.5	18	26	25	3
				8.5	20	24	24	4
				8.5	20	2.5	18	5
				1	16	8.5	20	6
				22	23	15	21	7
				8.5	20	18.5	22	8
				26	25	26	25	9
				18.5	22	15	21	10
				15	21	8.5	20	11
				8.5	20	22	23	12
				22	23	8.5	20	13
				8.5	20	18.5	22	14
				---	20.57	---	22.14	المتوسط الحسابي
				166.5		239.5		مجموع الرتب

ثانياً -متغير الوظيفة (طلاب)

1-موسيقى (Straus)

A-التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الطلاب مع الاسوياء على نوع صفات الموسيقى (Straus). في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ):-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الطلاب في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ) بلغ ( 21.43 ) . ومتوسط درجات الاسوياء بلغ ( 20.21 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (Straus).).

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الطلاب مقاربة من درجات المجموعة الاسوياء ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة (80) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة وبالبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لانوع صفات الموسيقى والجدول (19) يوضح ذلك.

جدول رقم ( 19 )

درجات الطلاب من المجموعتين(المرضى والاسوياء) في المرحلة الاولى (تناول لادوية والعمل ) على  
فقرات مقياس موسيقى (Straus)

دالة الفروق	مستوى الدالة	قيمة ي		الاسوياع		المرضى		ت
		الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة	
غير دالة	0.05	55	80	18	22	28	28	1
				12	20	3	16	2
				7	18	7	18	3
				5	17	23.5	24	4
				12	20	7	18	5
				3	16	12	20	6
				12	20	27	27	7
				18	22	18	22	8
				25.5	25	25.5	25	9
				18	22	15	21	10
				12	20	1	15	11
				18	22	21.5	23	12
				21.5	23	23.5	24	13
				3	16	9	19	14
				---	20.21	---	21.43	المتوسط الحسابي
				185		221		مجموع الرتب

B- التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الطلاب مع الاسوياء على نوع صفات الموسيقى (Straus). في المرحلة الثانية (عدم تناول الادوية واستراحة العمل ):-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الطلاب في المرحلة الثانية (عدم تناول الادوية واستراحة العمل ) بلغ ( 22.36 ) . ومتوسط درجات الاسوياء بلغ ( 20.14 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (Straus).

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الطلاب اكبر من درجات المجموعة الاسوياء ، ولغرض التعرف على دالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان- وايتني Mann-Whitney لينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 59 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة والبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية . أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لانواع صفات الموسيقى والجدول (20) يوضح ذلك

جدول رقم ( 20 )

درجات الطلاب من المجموعتين ( المرضى والسواء ) في المرحلة الثانية ( عدم تناول الأدوية واستراحة العمل ) على فقرات مقياس موسيقى ( Straus )

دالة الفروق	مستوى الدالة	قيمة ي		الاسویاء		المرضى		ت
		الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة	
غير دالة	0.05	55	59	16	22	16	22	1
				9	20	28	26	2
				4.5	18	6	19	3
				1.5	15	23	24	4
				9	20	4.5	18	5
				3	16	9	20	6
				20	23	12.5	21	7
				9	20	16	22	8
				26	25	26	25	9
				16	22	23	24	10
				12.5	21	23	24	11
				16	22	20	23	12
				20	23	9	20	13
				1.5	15	26	25	14
				---	20.14	---	22.36	المتوسط الحسابي
				164		242		مجموع الرتب

## 2-موسيقى (Mozart)

A-التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الطلاب مع الاسویاء على نوع صفات الموسيقى ( Mozart ) . في المرحلة الاولى ( تناول الأدوية والعمل ) :-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الطلاب في المرحلة الاولى ( تناول الأدوية والعمل ) بلغ ( 22.64 ) . ومتodoth درجات الاسویاء بلغ ( 21 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى ( Mozart )

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الطلاب مقاربة من درجات المجموعة الاسویاء ، ولغرض التعرف على دالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان- واينتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 59 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية ( ي ) عند مستوى دالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة وبالبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لانوع صفات الموسيقى. والجدول ( 21 ) يوضح

جدول رقم ( 21 )

درجات الطلاب من المجموعتين ( المرضى والسواء ) في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل )  
على فقرات مقياس موسيقى (mozart)

دالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي		الاسوائاء		المرضى		ت
		الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة	
غير دالة	0.05	55	59	26	25	14.5	22	1
				7	20	28	26	2
				7	20	23	24	3
				1	17	23	24	4
				7	20	23	24	5
				2.5	18	7	20	6
				19	23	19	23	7
				7	20	14.5	22	8
				26	25	26	25	9
				14.5	22	11	21	10
				11	21	11	21	11
				14.5	22	19	23	12
				19	23	19	23	13
				2.5	18	4	19	14
				---	21	---	22.64	المتوسط الحسابي
				204.5		242		مجموع الرب

B- التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الطلاب مع الاسوائاء على نوع صفات الموسيقى (mozart) . في المرحلة الثانية ( عدم تناول الادوية واستراحة العمل ) :-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الطلاب في المرحلة الثانية ( عدم تناول الادوية واستراحة العمل ) بلغ ( 21.14 ) . ومتوسط درجات الاسوائاء بلغ ( 20.28 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (.) (mozart)

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الطلاب مقاربة من درجات مجموعة الاسوائاء ، ولغرض التعرف على دالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 82.5 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية

الواحدة والبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لانواع صفات الموسيقى. والجدول (22) يوضح ذلك

### جدول رقم ( 22 )

درجات الطلاب من المجموعتين ( المرضى والاسوياء ) في المرحلة الثانية (عدو تناول الادوية واستراحة العمل ) على فقرات مقياس موسيقى (Mozart)

دالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي		الاسوياء		المرضى		ت		
		الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة			
غير دالة	0.05	55	82.5	22.5	23	18.5	22	1		
				12	20	2.5	17	2		
				5.5	18	8	19	3		
				1	15	25	24	4		
				12	20	5.5	18	5		
				5.5	18	12	20	6		
				22.5	23	27	25	7		
				12	20	18.5	22	8		
				27	25	27	25	9		
				18.5	22	16	21	10		
				5.5	18	12	20	11		
				18.5	22	22.5	23	12		
				22.5	23	12	20	13		
				2.5	17	12	20	14		
				---	20.28	---	21.14	المتوسط الحسابي		
				187.5		218.5		مجموع الرتب		

### 3-موسيقى (dvork)

A-التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الطلاب مع الاسوياء على نوع صفات الموسيقى (dvork) في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ) :-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الطلاب في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ) بلغ ( 21.21 ) . ومتوسط درجات الاسوياء بلغ ( 19.64 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (dvork) .

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الطلاب مقاربة من درجات المجموعة الاسوية ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني (Mann-Whitney) لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة (84) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة (0.05) في اختبار ذي النهاية الواحدة والبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لانوع صفات الموسيقى . والجدول (23) يوضح ذلك.

جدول رقم ( 23 )

درجات الطلاب من المجموعتين ( المرضى والاسوياء ) في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ) على فقرات مقياس موسيقى (dwork)

دلالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي	الاسوياء		المرضى		ت	
			الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة		
غير دالة	0.05	55	84	24.5	24	18.5	22	1
				8.5	19	12.5	20	2
				4.5	18	4.5	18	3
				1	15	24.5	24	4
				12.5	20	4.5	18	5
				2	16	12.5	20	6
				22	23	15.5	21	7
				8.5	19	18.5	22	8
				26.5	25	26.5	25	9
				18.5	22	28	26	10
				15.5	21	8.5	19	11
				18.5	22	22	23	12
				22	23	12.5	20	13
				4.5	18	8.5	19	14
				---	19.64	---	21.21	المتوسط الحسابي
				189		217		مجموع الرتب

B-التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الطلاب مع الاسوياء على نوع صفات الموسيقى (dwork). في المرحلة الثانية (عدم تناول الادوية واستراحة العمل ):-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الطلاب في المرحلة الثانية (عدم تناول الأدوية واستراحة العمل ) بلغ ( 21.93 ) . ومتوسط درجات الاسویاء بلغ ( 20.64 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى ( dvork ).

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الطلاب اكبر من درجات المجموعة الاسویاء ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 76.5 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة والبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لنوع صفات الموسيقى . والجدول ( 24 )

جدول رقم ( 24 )

درجات الطلاب من المجموعتين ( المرضى والاسویاء ) في المرحلة الثانية ( عدم تناول الأدوية واستراحة العمل ) على فقرات مقياس موسيقى dvork

دلالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي	الاسویاء		المرضى		ت		
			الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة			
غير دالة	0.05	55	76.5		17	22	27	25	1
					8.5	20	27	25	2
					4	18	1.5	17	3
					17	22	24.5	24	4
					8.5	20	22	23	5
					8.5	20	8.5	20	6
					22	23	12.5	21	7
					8.5	20	17	22	8
					24.5	24	27	25	9
					17	22	17	22	10
					12.5	21	4	18	11
					4	18	22	23	12
					17	22	8.5	20	13
					1.5	17	17	22	14
					---	20.64	---	21.93	المتوسط الحسابي
					170.5		224.5		مجموع الرتب

2-متغير الوظيفة (موظفي)

1-موسيقى (Straus)

A-التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الوظيفين مع الاسوياء على نوع صفات الموسيقى (Straus). في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ):-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الوظيفين في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ) بلغ ( 21.43 ) . ومتوسط درجات الاسوياء بلغ ( 20.29 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (Straus).).

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الموظفين مقاربة من درجات المجموعة الاسوياء ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 75.5 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة والبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لنوع صفات الموسيقى والجدول (25) يوضح

جدول رقم ( 25 )

درجات الموظفين من المجموعتين ( المرضى والاسوياء ) في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ) على فرات مقياس موسيقى (Straus)

دلالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي		الاسوياء		المرضى		ت
		الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة	
غير دالة	0.05	55	75.5	22	23	18	22	1
				11.5	20	11.5	20	2
				5.5	18	2.5	17	3
				5.5	18	25	24	4
				11.5	20	5.5	18	5
				1	16	11.5	20	6
				22	23	22	23	7
				11.5	20	18	22	8
				26.5	25	26.5	25	9
				5.5	18	15.5	21	10
				15.5	21	8	19	11
				18	22	22	23	12
				22	23	11.5	20	13
				2.5	17	28	26	14
				---	20.29	---	21.43	المتوسط الحسابي
				180.5		225.5		مجموع الرتب

B-التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الموظفين مع الاسوياء على نوع صفات الموسيقى (Straus). في المرحلة الثانية ( عدم تناول الادوية واستراحة العمل ):-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الموظفين في المرحلة الثانية (عدم تناول الأدوية واستراحة العمل) بلغ (20.79). ومتوسط درجات الاسویاء بلغ (20.14) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (Straus).

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الموظفين مقارب من درجات المجموعة الاسویاء ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة (89) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة (0.05) في اختبار ذي النهاية الواحدة والبالغة (55) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية . أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لنوع صفات الموسيقى والجدول(26) يوضح ذلك

#### جدول رقم ( 26 )

درجات الموظفين من المجموعتين ( المرضى والاسویاء ) في المرحلة الثانية (عدم تناول الأدوية واستراحة العمل) على فقرات مقياس موسيقى (Straus)

دلالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي		الاسویاء		المرضى		ن
		الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة	
غير دالة	0.05	55	89	19.5	22	27	25	1
				12.5	20	27	25	2
				6.5	18	3.5	17	3
				1.5	15	25	24	4
				12.5	20	6.5	18	5
				6.5	18	12.5	20	6
				20	23	17	21	7
				12.5	20	6.5	18	8
				20	23	27	25	9
				19.5	22	17	21	10
				17	21	1.5	15	11
				12.5	20	20	23	12
				20	23	12.5	20	13
				3.5	17	9	19	14
				---	20.14	---	20.79	المتوسط الحسابي
				191		212		مجموع الرتب

2-موسيقى (Mozart)

A-التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الموظفين مع الاسویاء على نوع صفات الموسيقى (mozart). في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ):-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الموظفين في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ) بلغ ( 21 ) . ومتوسط درجات الاسویاء بلغ ( 20.07 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (.)

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الموظفين مقاربة من درجات المجموعة الاسویاء ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 82.5 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة والبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لنوع صفات الموسيقى. والجدول (27) يوضح ذلك.

جدول رقم ( 27 )

درجات الموظفين من المجموعتين ( المرضى والاسویاء) في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ) على فقرات مقياس موسيقى Mozart

دلالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي الجدولية	الاسویاء		المرضى		ت	
			الرتبة	الدرجة	الرتبة	الدرجة		
غير دلالة	0.05	55	82.5	19	22	23.5	23	1
				11	20	3	16	2
				6	18	11	20	3
				1	15	26	24	4
				11	20	6	18	5
				3	16	11	20	6
				23.5	23	15	21	7
				6	18	19	22	8
				27.5	25	27.5	25	9
				19	22	15	21	10
				15	21	19	22	11
				19	22	23.5	23	12
				23.5	23	11	20	13
				3	16	8	19	14
				---	20.07	---	21	المتوسط الحسابي
				187.5		218.5		مجموع الرتب

B-التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الموظفين مع الاسویاء على نوع صفات الموسيقى (mozart). في المرحلة الثانية (عدم تناول الادوية واستراحة العمل ):

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الموظفين في المرحلة الثانية (عدم تناول الأدوية واستراحة العمل) بلغ (21.5). ومتوسط درجات الاسویاء بلغ (20.64) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (. Mozart) ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الموظفين مقاربة من درجات مجموعة الاسویاء ، ولعرض التعرف على دلالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتنى Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة (84.5) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة (0.05) في اختبار ذي النهاية الواحدة والبالغة (55) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لانوع صفات الموسيقى. والجدول (28) يوضح ذلك

### جدول رقم ( 28 )

درجات الموظفين من المجموعتين ( المرضى والاسویاء ) في المرحلة الثانية (عدم تناول الأدوية واستراحة العمل ) على فقرات مقياس موسيقى (Mozart)

دلالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي	الاسویاء		المرضى		ت	
			الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة		
غير دلالة	0.05	55	84.5	24	24	28	27	1
				10.5	20	10.5	20	2
				4	18	3	17	3
				5.5	19	24	24	4
				10.5	20	10.5	20	5
				1.5	16	10.5	20	6
				21	23	16	21	7
				10.5	20	24	24	8
				26.5	25	26.5	25	9
				18.5	22	16	21	10
				16	21	5.5	19	11
				18.5	22	21	23	12
				21	23	10.5	20	13
				1.5	16	10.5	20	14
				---	20.64	---	21.5	المتوسط الحسابي
				189.5		216.5		مجموع الرتب

### 3-موسيقى (dvork)

A-التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الموظفين مع الاسویاء على نوع صفات الموسيقى (dvork) في المرحلة الاولى (تناول الأدوية والعمل) :-

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الموظفين في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ) بلغ ( 20.2 ) . ومتوسط درجات الاسوياء بلغ ( 19.9 ) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى ( dvork ).

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الموظفين مقاربة من درجات المجموعة الاسوياء ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 93.5 ) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) في اختبار ذي النهاية الواحدة والبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لنوع صفات الموسيقى . والجدول ( 29 ) يوضح

جدول رقم ( 29 )

درجات الموظفين من المجموعتين ( المرضى والاسوياء ) في المرحلة الاولى (تناول الادوية والعمل ) على فقرات مقياس موسيقى ( dvork )

دلالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي	الاسوياء			المرضى		ت
			الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة	الرتبة	
غير دلالة	0.05	55	93.5	23.5	24	17.5	22	1
				9	20	9	20	2
				9	20	9	20	3
				1	15	23.5	24	4
				9	20	2	18	5
				28	26	9	20	6
				21	23	9	20	7
				9	20	17.5	22	8
				26	25	26	25	9
				17.5	22	14.5	21	10
				2.5	18	26	25	11
				17.5	22	21	23	12
				21	23	9	20	13
				4	19	14.5	21	14
				---	19.9	---	20.2	المتوسط الحسابي
				198		207.5		مجموع الرتب

B-التعرف على الفروق في الاستجابات الانفعالية بين مرضى ضغط الدم من الموظفين مع الاسوياء على نوع صفات الموسيقى ( dvork ) في المرحلة الثانية ( عدم تناول الادوية واستراحة العمل )

أظهرت النتائج ان متوسط درجات مرضى ضغط الدم من الموظفين في المرحلة الثانية (عدم تناول الأدوية واستراحة العمل ) بلغ (22.7) . ومتوسط درجات الاسویاء بلغ ( 21) في استجاباتهم الانفعالية لنوع صفات الموسيقى (dvork).

ومن خلال المتوسطات يلاحظ ان درجات مجموعة المرضى من الموظفين اكبر من درجات المجموعة الاسویاء ، ولغرض التعرف على دلالة الفروق الاحصائية، تم استخدام اختبار مان-وايتني Mann-Whitney لعينتين مستقلتين ذات الحجم المتوسط، اذ اخذت القيمة الصغرى البالغة ( 69.5) وتمت مقارنتها بالقيمة الجدولية (ي) عند مستوى دلالة ( 0.05) في اختبار ذي النهاية الواحدة والبالغة ( 55 ) فوجد ان القيمة الحسابية اكبر من القيمة الجدولية، أي عدم وجود فروقاً بين المجموعتين في استجاباتهم لنوع صفات الموسيقى . والجدول (30) يوضح ذلك

جدول رقم ( 30 )

درجات الموظفين من المجموعتين ( المرضى والاسویاء ) في المرحلة الثانية ( عدم تناول الأدوية واستراحة العمل ) على فقرات مقياس موسيقى (dvork)

دلالة الفروق	مستوى الدلالة	قيمة ي	الاسویاء		المرضى		ت	
			الجدولية	المحسوبة	الرتبة	الدرجة		
غير دلالة	0.05	55	69.5	17	23	13.5	22	1
				7	19	22.5	25	2
				3	17	5	18	3
				1.5	15	19.5	24	4
				27	27	5	18	5
				19.5	24	9	20	6
				17	23	5	18	7
				9	20	25	26	8
				22.5	25	22.5	25	9
				13.5	22	11	21	10
				9	20	27	27	11
				13.5	22	17	23	12
				13.5	22	22.5	25	13
				1.5	15	27	27	14
				---	21	---	22.7	المتوسط الحسابي
				174.5		231.5		مجموع الرتب

تفسير النتائج :

ومن خلال النتائج التي توصل إليها البحث نلاحظ أن متوسطات درجات مجموعة المرضى المصابين بضغط الدم على مقاييس الثلاثة بالنسبة لمتغيري الجنس والوظيفة كان أعلى من متوسطات درجات المرضى المصابين بأمراض (الانف والحنجرة).

وعند استخدام معادلة مان وتنى تبين أن الاستجابات الانفعالية لكلا المجموعتين كانت متكافئة ما عدا النتيجة المرحلة الثانية لمتغير الجنس من الذكور للموسيقى (dvork). والمرحلة الأولى لمتغير الذكور أيضاً للموسيقى (Mozart). ويمكن تفسير هذه النتيجة على وفق التفسير التكاملى للنظريات بان هناك عدد من العوامل التي تحدد فعالية تأثير الموسيقى على مرضى ضغط الدم وعلى مدى استجابتهم للاحنام الموسيقية وهي كالتالى :-

1- العامل الأول :- يتعلق بالمقاطعه الموسيقية نفسها ، مثلاً هل تعزف الموسيقى آلة واحدة أم عدة آلات ، ومدى ايقاع المقطوعة ( سريعة ، بطيئة ) او بدون ايقاع

2- العامل الثاني :- يتعلق بالمريض نفسه كحالته الصحية وعمره وثقافته وجنسه

3- العامل الثالث :- هو الجو المحيط بالمريض أثناء الاستماع مثل الديكور والالوان والتهوية ، وكلها عناصر تؤثر على درجة التركيز وبالتالي استجابة المريض لصفات الانقام الموسيقية

كما ان الموسيقى تأثير عضوي فعال ، فعند دخولها الى مركز السمع في القشرة الدماغية تنتقل مباشرة الى مركز الانفعالات النفسية الرئيسي والذي يتحكم بكافة العواطف والاستجابات الوجدانية وكذلك في تنظيم الاستجابات البيولوجية والنفسية ، اذ تتأثر مجموعة متنوعة من الاستجابات الفسيولوجية بتأثير الموسيقى مثل نبضات القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسى ، وذلك لأن الموسيقى على اتصال مع حواسنا اكثراً من اي عامل اخر من خلال المعلومات التي تصللينا عن طريق المستقبلات السمعية في الخلايا العصبية وبالتالي تؤثر في داخلنا نوعين من الاحساسين في شكل مجموعة من المشاعر ذات قطبيين مختلفي السلبية والابيجابية

واعتماداً على تفسير النظريات ترى الباحثة بان الفرد عندما يصاب بمرض حتى لو كان مؤقت مثل الامراض (الانفلونزا والسعال) فإنه حتماً سوف يصاب ببعض الاعراض التي ترهق جسمه وهذا ما ادى الى تشابه استجاباتهم مع مرضى ضغط الدم .

الاستنتاجات:-

اولاً-ان الاستجابات الانفعالية لمرضى ضغط الدم تتشابه مع الاستجابات الانفعالية لمرضى المصابين بامراض (الانفلونزا والسعال). ما عدا حالتين هما :-

1-تميز مجموعة المرض من الذكور المصابين بامراض ضغط الدم باستجابات انفعالية اعلى من مجموعة الذكور المصابين بامراض ( الانفلونزا والسعال ) في المرحلة الثانية للموسيقى (dvork)

2-تميز مجموعة المرضى من الذكور المصابين بامراض ضغط الدم باستجابات انفعالية اعلى من مجموعة الذكور المصابين بامراض ( الانفلونزا والسعال ) في المرحلة الاولى للموسيقى (Mozart).

ثانيا :- ان انواع الموسيقى المستخدمة في البحث الحالي اثرا على استجابات المرضى بصورة عامة

التوصيات :-

من خلال نتائج البحث التي تم التوصل اليها توصي الباحثة بالاتي :-

1-العمل على زيادة تعريف الاسر والمؤسسات ذات العلاقة بخطورة الاصابة بالامراض السيكوسوماتية وخاصة مرض ضغط الدم مما له من نتائج اخرى سلبية وخاصة على القلب .

2-العمل على فتح مؤسسات علاجية غير دوائية تعمل على علاج مرض ضغط الدم بسبيل علاجية فنية مثل العلاج بالموسيقى والرسم والغناء

المقترحات:-

1-بناء برامج علاجية نفسية للحد من اعراض مرض ضغط الدم واهمها استخدام الموسيقى

2-اجراء دراسة مماثلة على عينات اخرى من فئات مرضى الامراض السيكوسوماتية

3-اجراء دراسة توضح العلاقة بين اثر الموسيقى بعوامل اخرى مثل ( السياحة . مشاهدة فلم ، المحادثة الجماعية )

## المصادر

## اولا- المصادر العربية

1- ابو الحب ، ضياء الدين: (1970)، الموسيقى وعلم النفس ، مطبعة التضامن . بغداد.

2- ابو النيل، محمود السيد ، وزبور، مصطفى (1984): الامراض السيكوسوماتية ، الامراض الجسمية النفسية المنشا ، مكتبة الخانجي ، (ط2)، القاهرة .

3- احمد، ادهم (2011): ارتفاع ضغط الدم /تعريفه، اسبابه، اعراضه ،تشخيصه، علاجه بالطب البديل (مصدر انترن特)

<http://www.tbbeeb.net/adham/articles.php?id=50>

4- الالائي ، محمد حسن (2007):تعريف الموسيقى + السلم الموسيقي (مصدر انترن特)

<http://elalaty.arabblogs.com/musical/archive/2006/11/117587.html>

5- الانصاري، بدر محمد، (2000)، قياس الشخصية، دار الكتاب الجامعي، الكويت.

6- البحر، ايوب،(2010): فوائد الموسيقى ،(مصدر انترن特)

.: <http://www.samapartsudan.com/vb/showthreed.php?t=8914>

7- برهام، ليلى ،(2011): ارتفاع ضغط الدم ((قاتل الصامت )) ،جامعة ام القرى . اليمن .

8- بري ، عدنان ماجد عبد الرحمن (2007) : طرق الحسابات الاحصائية باستخدام اكسل ،مكتبة الشقرى ، الرياض .

9- بوليسة ، محمد ،(2010): تعريف الموسيقى وعناصرها (مصدر انترن特)

<http://ngomelnil14.forums.fm/t8-topic>

10- توفيق ، سعيد ،(2009): جماليات الصوت والتعبير الموسيقي ،(مصدر انترن特)

<http://www.nizwa.com/articles.php?id=780>

11- الحداد ، رامي ،(2007): استخدام الموسيقى في العلاج النفسي ، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية ،ابحاث اليرموك، مجلد (23)، العدد (1)، اربد . الاردن .

12- حسن، رباب حمودي ،(2001): اثر العلاج بالموسيقى لخفض القلق لدى طلبة الجامعة ، رسالة ماجستير ، كلية الاداب ، الجامعة المستنصرية .

13- الزغلامي ، محمد ،(2010): تعريف الموسيقى ،(مصدر انترن特)

<http://educ4music.1forum.biz/t103-topic>

14- الساعدي ، صالح عبد الهادي حمدان ( 2006 ) : بناء برنامج ارشادي نفسي لتنمية مفهوم الذات لدى الاحداث في دور الدولة ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ( ابن رشد ) جامعة بغداد

15- السيد، فؤاد البهري، (1979)، علم النفس الاحصائي وقياس العقل البشري، ط1، الهيئة الحصرية للتأليف والنشر، القاهرة

16- شعلان ،اسامة فؤاد ، (2010) : الامراض السيكوسوماتية او النفس جسمية ،مصر، (مصدر انترنت)،

<http://chaalano.wordpress.com/category/medical/>

17- الشقمانى ، مصطفى مفتاح ، والفقى ،محمد احمد (2010):احداث الحياة والضغوط النفسية ودورها في الاصابة بالاورام السرطانية ، مجلة السائل ، العدد الخامس ، طرابلس . ليبية.

18- الشيخ ، صلاح محمد صالح ،(2000): التفاعل بين الطب النفسي وطب الجسد ، مجلة الصيدلي ، العدد الثالث ، القاهرة ، مصر .

19-- عباس ، محمد خليل ، محمد بكر موقف ، محمد مصطفى العبيسي ، فريد محمد ابو عواد ( 2009 ) : مدخل الى مناهج البحث في التربية وعلم النفس، دار مسيرة للطباعة والنشر ، عمان

20- عبد الحفيظ ، اخلاص محمد عبد ( 2000 ) : طرق البحث العلمي والتحليل الاحصائي من المجالات التربوية والنفسية والرياضية ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة .

21- عبيد ، امل فؤاد (2011): العلاج ... بالموسيقى ،(مصدر انترنت) .

<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=246412>

22- عثمان ، محمود ،(2011) : اعراض وعلامات انخفاض ضغط الدم ،(مصدر انترنت) .

.<http://albedaya-algadida.com/article-3085.html>

23- العزاوي ، قيس (2006) : سماع الموسيقا يضبط التنفس ويخفض ضغط ،(مصدر انترنت)

<http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=14810>

24- عزت ، ايها عاطف ،(2010) : الموسيقى والطب ،(مصدر انترنت).

25- علام ، صلاح الدين محمود ( 2000 ) : القياس والتقويم النفسي - اسساته وتوجهاته المعاصرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة :

25- عزمي ،حسين ،(2012): معلومات وارشادات هامة تهمك عن مرض ضغط الدم المرتفع ،(مصدر انترنت).

<http://majles.alukah.net/showthread.php?10261>

26- عودة ،احمد سليمان ، وخليل يوسف الخليلي (1992) : الاحصاء للباحث في التربية والعلوم الإنسانية ، الاردن .27- عودة، احمد سليمان و ملکاوي، فتحي حسن،(1992)، اساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم الإنسانية، ط2، اربد-الاردن، توزيع مطبعة الكتاني.

28- الفارس ،حسناء (2009): الموسيقى لعلاج الامراض النفسية ،(مصدر انترنت).

<http://healths.roro44.com/healths-102-393-0.html>

29- فرج، صفوتو، (1980): القياس النفسي، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة.

30- القاسم ، جمال ،واخرون (2000) : الاضطرابات السلوكية ، (ط1)، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ،

31- قاسم ، ناجي حسن ،(2011) : علاج امراض القلب بالموسيقى ، (مصدر انترنت) .

<http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/34-2008-05-19-17-14-.27/31360-2011-08-15-20-43-01.html>

32- القطبي ، سالم عبد الله (2010): دور الموسيقى على الانسان ،(مصدر انترنت) .

: <http://www.shefaae.net/vb/showthread.php?t=5548>

33- القمسي، مصطفى والمعايعة، خليل (2000): القياس والتقويم في التربية الخاصة ، دار الفكر ، عمان.

34- المصري ،فارس ،(2010): خبيرة مصرية تعالج ضغط الدم بالموسيقى .(مصدر انترنت)

<http://www.tunisia-cafe.com/vb/showthread.php?t=10458>

35- الهابط ، محمد سيد (1989): التكيف ولصحة النفسية : الأمراض النفسية - الأمراض العقلية - مشكلات الأطفال وعلاجها - كيف يحافظ الفرد على صحته النفسية ، ط2، المكتب الجامعي الحديث ، إسكندرية.

## ثانياً : المصادر الأجنبية

- 1–Allen, M. & Yen. W. (1979) introduction to Measurment theor California, Brook, Cole
- 2– Апанасенко, Г. Л. Музыкальная терапия: история, современность и перспективы развития / Г. Л. Апанасенко, Н. А. Савельева-Кулик //Укр. мед. журнал. – 2011. – 24 марта – С. 1–4. ((مصدر ر. باللغة الروسية.))
- 3– Arnon, S. Live Music Is Beneficial to Preterm Infants in the Neonatal Intensive Care Unit Environment /S. Arnon (et al)// Tel Aviv, Journal compilation, 2006. – vol. 33:2. – pp. 131–136.
- 4– Berger, D.S. The use of music therapy as a clinical intervention for physiologic Functional Adaptation / D. S. Berger; D. J. Schneck // Canadian, journal of scientific exploration. – 2003. – Vol. 17, № 4. – P. 687– 703.
- 5– Bradt, J. Music for stress and anxiety reduction in coronary heart disease patients (review) / J. Bradt; C. Dileo. – The Cochrane collaboration: published by John Wiley & sons, 2009. – P. 77.
- 6– CERMAK A. M. THE EFFECT OF MUSIC THERAPY AND SONGWRITING ON ANXIETY, DEPRESSION AND QUALITY OF LIFE IN CANCER PATIENTS AND THEIR FAMILIES AS MEASURED BY SELF–REPORT: a thesis ... degree of Master of Music. 29.07.05 / A. M. Cermaka. – Florida, 2005. – P.79
- 7– Chomsky, N. A. Review of B. F. Skinners Verbal behavior / N. Chomsky [Electronic resource]. – 2004. – Mode of access: <http://www.ling.uni-potsdam.de/~rvogel/grundlagen/nc59.pdf>. – Data access: 05.06.2012.
- 8– Chou, Y. THE EFFECT OF MUSIC THERAPY AND PEER–MEDIATED INTERVENTIONS ON SOCIAL–COMMUNICATIVE RESPONSES OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: a thesis. ... degree of master Music Education (Music Therapy) / Y. Chou. – Georgia. – 2008. – 116.
- 9– Davoli, C. B. Reaching urban youth exposed to violence through music therapy a literature based study: A thesis ... Degree of master of arts in creative arts therapy / C. B. Davoli. – Drexel university. – 2009. – P. 86.
- 10– Deutsch, D. The psychology of music (second edition) / D. Deutsch. – San Diego: Academic press, 1999. – P. 807.

- 11–Desai, F. A STUDY TO DETERMINE THE EFFECTIVENES OF YOGA, BIOFEEDBACK & MUSIC THERAPY IN MANAGEMENT OF HYPERTENSION. / F. Desai, O. Vyas. // The Indian Journal of Occupational Therapy. – 2001. – Vol. 33. No. 2. – Pp. 3–8.
- 12– D'Ulisse, M.E. An innovative experience within a diagnosis and cure psychiatric service in Rome. / M. E. D'Ulisse [et al] // Proceedings of the 4<sup>th</sup> European Music Therapy Congress. – 16–19 Abril 2003; Leuven, Belgium. – Pp. 404–406.
- 13– Gibbons, J.D., (1971), Non parametric statistical inference, McGraw–Hill kogakusha, LTD.
- 14– Goldman H. H. Review of General psychiatry. / H. H. Goldman. – Lebanon. Middle east Edition, 1984. – P. 374.
- 15–) Johnston, K. An introduction to music therapy: Helping the oncology patient in the ICU / K. Johnston; J. Rohaly–Davis // Philadelphia, Critical Care Nursing Quarterly. – 1996. – Vol. 18(4). – P. 54–60.
- 16–) LaGasse, B. Music and Rehabilitation: Neurological Approaches. In R. MacDonald, G. Kreutz & L. Mitchell (Eds.) / B. LaGasse; M. Thaut // Oxford: *Music, Health, and Wellbeing*. – 2012. – № 9. – Pp. 153–163.
- 17–) Lerch, D. The Mozart effect: a closer look/ D. Lerch [Electronic resource]. – 2000. Mode of access: <http://www.musicaeadoracao.com.br/ingles/mozarteffect.htm>. – Data access: 06.12.2011.
- 18– Magar, P. How Does music Affect The Brain / P. Magar. // [Electronic recourse]. – 2010. – Mode of access:  
[http://www.buzzle.com/articles/how\\_does\\_music\\_affect\\_the\\_brain.html](http://www.buzzle.com/articles/how_does_music_affect_the_brain.html). – Data access: 06.12.2011.
- 19–) Marwick, H. excellence in Teaching Research and practice – National centre for autism studios Literature Review of Autism for HM inspectorate of education / H. Marwick, A. W. Dunlop; T. Mackay. – Scotland: University of Strathclyde, 2005. – P. 91
- 20– M.Oscar(2005); Genetic influences in emotional dysfunction and alcoholism-related brain damage / M.Oscar [et al.] // The Arab National society for health research and services. Psychology research service. – Boston University school of Medicine. – 2005. – Vol. 1, № 3. – P. 211–229.

- 21–platel,H,(1997): the structural components of music perception a functional anatomical study , London, uk.
- 22– Rangell, L. Music in the head: living at the border / L. Rangell. – London: Karnac books, 2009. – P. 110.
- 23– Roussos, C. G. Music therapy – Can Music Cure illness, Disease and Disorders? Is Music Therapeutic Medicine for Improving Health? [Electronic resource]. – 2008. – Mode of access: <http://entrepreneur.pro/articles/9/1/Music-Therapy---Can-Music-Cure-Illness-Disease-and-Disorders-Is-Music-Therapeutic-Medicine-for-Improving-Health/Page1.html>. – Data access: 27.10.2011.
- 24– Sadhana, Sh. Healing by Music Therapy. / Sh. Sadhana, A. Chintan // Ragas. – 2004. – Vol. 2. No. 5. – Pp. 7–11.
- 25– THAUT, M. H. The Future of Music in Therapy and Medicine. / M. H. Thaut [Electronic resource]. – 2005. – Mode of access:  
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16597779>. – Data access: 18.12.2011.
- 26– Shaw, M. E. (1967) Scales for the Measurement. McGraw-Hill . New York.
- 27– Weinberger, N. M. Learning and Memory and Music Perception Neurobiology of Case Western Reserve. / N. M. Weinberger // Association Kuwait for development science. – 2004. – No.5 – P. 56
- 28– Wolf, L&Wolf,T. Music and health care. / L. Wolf, T. Wolf. – WolfBrown, Carnegie Hall and WolfBrown, 2011. – P. 55

## مقياس انواع مواصفات الموسيقى

حضره السيد/السيدة -----

تود الباحثة القيام بالدراسة الموسومة ( دراسة مقارنة بين الاستجابات الانفعالية لدى مرضى ضغط الدم على مقياس انواع المواصفات الموسيقى مقارنة مع استجابات بعض المرضى الاسوياء). لهذا ترجى من حضرتكم الاجابة على فقرات المقياس المقدم لكم بعد استماعكم للنغمات الموسيقية. كما ترجو الباحثة ايضا الاجابة على المعلومات الموجودة في اعلى المقياس ، مع شكر الباحثة لكم لتعاونكم معها.

Уважаемый респондент -----

**Данное исследование проводится с целью выявления особенностей эмоциональной реакции на различные музыкальные произведения у лиц с разным уровнем артериального давления и лиц с простудными заболеваниями. Для этого, пожалуйста, после прослушивания музыкальных мелодий отметить те пункты шкалы, которые соответствуют вашему состоянию под воздействием музыки: чем выше число, тем более выражено соответствующее состояние. Исследователь надеется на добросовестное отношение к исследованию и благодарит вас за сотрудничество с ними.**

الاسم الكامل -----

الجنس 1-ذكر 2- ائثى

المهنة :- (موظف ) او ( طالب )

نوع المرض 1-ضغط الدم (عالي) او (منخفض)

- الامراض الشتاينية (الانفلونزا) او (السعال ) -

Фамилия\_\_\_\_\_

Пол: 1. Мужской 2. Женский

Род занятий: – (работников) или (студент)

Тип заболевания

1 – артериальное давление (высокое) или (низкий)

2– Болезнь Зима (грипп) или (кашель)

№ n/n	акитсиреткарах	Да نعم	Нет لا	المواصفات الموسيقية	ت
1	яанийоконс			هادئة	1
2	яантсург			حزينة	2
3	яавилтсачс			مؤلمة	3
4	* яашюавытавхаз			مخيبة	4
5	яашюурилумитс			مثيرة	5
6	* анвиссерпед			كتيبة	6
7	яанжоверт			مقافية	7
8	яашюялвонходв			الهامية	8
9	яашюавижеданбо			ادراكية	9
10	яашюажоргу			توعيدية	10
11	яанълетатчем			حالية	11
12	** яашюялбалссар			مسترخية	12
13	яардоб			مبهجة	13
14	яанневонкинорп			سريعة	14

				الدخول	
15	яаниокопсеб			مشوشه	15
16	янвитка			منشطة	16
17	* * яаннелсымсеб			بدون معنى	17
18	сказочная			متكلمة	18
19	бесполезная			بدون معنى	19
20	яавискали			مبكية	20
21	яакторок			قصيرة	21
22	яаглод			طويلة	22
23	яансеретни			ممتعة	23
24	эффектная			مؤثرة	24
25	запоминающаяся			منسية	25
26	волнующая			مخيفة	26
27	гнетущая			سارة	27
28	символическая			رمزية	28
29	плавная			سهلة	29

\* الفقرات التي سقطت من مقياس موسيقى (dvork)

\* الفقرات التي سقطت من مقياس موسيقى (Mozart)

الباحثة

نهى حامد طاهر

Исследователь  
Нуха хамид тахер