



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة القادسية
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
الدراسات العليا / الماجستير

تأثير الأسلوب المنتظم والعشوائي لتعويض السوائل في بداية زمن التعرق ونسبة المفقود والمستهلك وبعض المتغيرات الفسيولوجية خلال الجهد البدني القصوي للاعب كرة السلة الناشئين

رسالة مقدمة

إلى مجلس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية
وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم الرياضة

من قبل
ديناء حمود قاسم

بأشراف :

أ. د. فلاح حسن عبد الله

٢٠١٧ م

١٤٣٨ هـ

الرحمن الرحيم

﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلًّا شَيْئًا حَتَّىٰ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾

صدق الله العظيم
سورة الأنبياء – الآية (٣٠)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقرار المشرف

أشهد بأن هذه الرسالة الموسومة بـ:

تأثير ازمنة ثابتة ومختلفة لتعويض السوائل في بداية زمن التعرق ونسبة المفقود والمستهلك في الاجواء الحارة وبعض المتغيرات الفسيولوجية خلال الجهد البدنى للاعبى كرة السلة الناشئين" والمعدة من قبل طالبة الماجستير (دينا حمود قاسم) قد تمت تحت اشرافى فى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية وهى جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير فى علوم التربية الرياضية.



المشرف

أ . د فلاح حسن عبد الله

جامعة القادسية / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

التوقيع :

التاريخ / ٢٠١٧ /

- استناداً إلى التوصيات المتوفرة أرشح هذه الرسالة إلى لجنة المناقشة لدراستها وبيان الرأي فيها.



الحمد لله

أ . م . د . علي عطشان خلف

معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا

التوقيع :

التاريخ : / ٢٠١٧ /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إقرار المقوم اللغوي

أشهد بأن هذه الرسالة الموسومة بـ:

"تأثير الأسلوب المنتظم والعشوائي لتعويض السوائل في بداية زمن التعرق ونسبة المفقود والمستهلك وبعض المتغيرات الفسيولوجية خلال الجهد البدني القصوي للاعب كرة السلة الناشئين " قد تمت مراجعتها من الناحية اللغوية تحت إشرافي وأصبحت بأسلوب علمي خالٍ من الأخطاء والتعبيرات اللغوية غير الصحيحة ولأجله وقعت.

المقوم اللغوي
د. عزيز العصاف

التاريخ ٢٠١٧/٥/٢٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إقرار لجنة المناقشة

نشهد أننا أعضاء لجنة التقويم والمناقشة قد أطلغنا على الرسالة الموسومة بـ : "تأثير ازمنة ثابتة و مختلفة لتعويض السوائل في بداية زمن التعرق ونسبة المفقود والمستهلك في الأجزاء الحارة وبعض المتغيرات الفسيولوجية خلال الجهد البدني للاعب كرة السلة الناشئين" وقد ناقشنا الطالبة (دينا حمود قاسم) في محتوياتها وفيما لها علاقة بها وأنها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة .

عضو
أ.م.د. رياض جمعة حسن
2017 / /

عضو
أ.م.د. اسعد عدنان عزيز
2017 / /

رئيس اللجنة
أ.د. أسامة أحمد حسين الطائي
2017 / /

عضو ومسؤلاً
أ.د. فلاح حسن عبد الله
2017 / /

صادقت من مجلس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جلسته ()
 المنعقدة بتاريخ (٢٠١٧ / /)

أ. د. هشام هنداوي هويدى
عميد كلية التربية البدنية
علوم الرياضة / وكالة - جامعة القادسية
التوقيع :
التاريخ : ٢٠١٧ / /

الإهاداء

❖ الى ... الشمس التي أنارت في عهد الظلمة .
الى السماء التي أمطرت وأغدقـت في زـمن الجفاف والظـمـأ .
الى من كان ولم يـزل معلـمي عند جـهـلي
وقدوتـي في حـياتـي وخلـيلـي عند شـجـونـي ..
الى النور في عـيـوني
أبي.....

❖ الى .. من حـملـتـني طـفـلاً صـغـيراً ..
ورـبـتـني أنسـانـاً كـبـيراً ..
وـحـمـلـتـ هـمـومـي دـهـراً طـوـيـلاً ..
ولـوـلاـها لـمـ أـكـنـ شـبـئـاً ..
أـهـي.....

❖ الى ... من أـسـتـظـلـ بـظـلـمـ وـأـسـتـنـيرـ بـنـورـه
الـىـ منـ يـسـكـنـ قـلـبـي وـتـعـشـقـ رـؤـيـتـهـ عـيـنـي
وـتـغـرـمـ صـوـتـهـ أـذـنـي وـتـسـعـدـ بـلـقـائـهـ جـوـارـحـي
وـتـطـمـئـنـ بـهـ نـفـسـي.....
زوجـي.....

❖ الى ... أـحـلـ الـكـلـمـات وـسـنـدـيـ فـيـ الـحـيـاةـ
أـخـواـتـي وـأـيـلـيـنـ
❖ الى رـوحـ المرـحـومـ استـاذـيـ دـلـازـمـ محمدـ عـبـاسـ
وسـجـاد
اهـدـيـ هـمـةـ جـهـدـيـ اـمـثـواـضـعـ

دـيـنـا

الشكر والتقدير

بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ((لَئِن شَكْرَتُمْ لَأُزِيدَنَّكُمْ)) صدق الله العلي العظيم، فالحمد والشكر لله العلي القدير، رب العرش العظيم، والصلوة والسلام على حبيبنا محمد (ص) وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

أتقدم بوافر الشكر والتقدير الى عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة القادسية وأساتذتها ، وأخص بالذكر كلا من عميدها الدكتور (هشام هنداوي هويدى) الذي أدهشنا بإبداعه من خلال العمل الدائم على تطوير الكلية الغالية على قلوبنا، وكماأشكر معاون العميد للشؤون العلمية الدكتور (علي عطشان المشرفاوى)، ومعاون العميد للشؤون الادارية الدكتور (مشرق عزيز اللامي)، والهيئة التدريسية

جمعها لما قدموه لنا من عون وعلم، فلهم مني كل الشكر والتقدير.

كما اتقدم بالشكر وفائق التقدير والاحترام لاستاذى والمشرف الدكتور (فلاح حسن عبد الله) لما منحني ايادى من افكاره النيرة وعطائه المميز، ما يعجز لسانى عن الشكر، واعترافا مني بكرمه أدعوه ربي ان يحفظه ويهمنحه مزيدا من الرفعة والتقدير. وبمزيد من الحب الاحترام والتقدير أتقدم بالشكر للدكتور (قيس سعيد دايم الفؤادي) بصورة خاصة لما قدمه من مساعدته وجهد، وله مني كل التقدير والاحترام. واتقدم بالشكر والتقدير لكلا من (الدكتور أسعد عدنان والدكتور أحمد عبد الزهرة والدكتور علي مهدي) أعضاء لجنه الاقرار لهم كل الاحترام.

وأتقدم بالثناء والامتنان الى عينة البحث لما قدموه لي من مساعدته وتحمل فشكرا جزيلا لهم ، ويجدرون بي أيضا ان اقدم الشكر الى فريق العمل المساعد لمساعدتى في اجراءات البحث الميدانية، فجزاهم الله عنى خير الجزاء ،

ومن الوفاء أن اتقدم بجزيل شكري وامتناني الى كل من صبر وثابر واعطى جهدا وشاركتني في اكمال طريقي اشكر والدى ووالدتي وزوجي(ابا ايلين) واخواتي ، والى الارواح التي فارقتنا مبكرا وتركت اثرها جرحا روح استاذى وسبب دخولي الى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة (د.لازم محمد عباس) رحمه الله والى الروح التي لم تفارقنا ابدا تاركة ورائها ثغرة كبيرة لا يداويعها الزمن (سجاد) وكل من وقف بجانبى او نفعنى بكلمة واحدة .

الباحثة

ملخص الرسالة

(تأثير الأسلوب المنتظم والعشوائي لتعويض السوائل في بداية زمن التعرق ونسبة المفقود والمستهلك وبعض المتغيرات الفسيولوجية خلال الجهد البدني القصوي للاعبين كرة السلة الناشئين)

المشرف

الباحثة

أ.د فلاح حسن عبد الله

دينا حمود قاسم

تهدف الرسالة الى التعرف على اي الأزمنة المختلفة افضل في تعويض السوائل في الجهد البدني للاعبين كرة السلة الناشئين ، وقد تم استعمال المنهج التجريبي لملايئته طبيعة البحث وتحقيق اهدافه وحل مشكلاته ، أما بالنسبة للعينة فقد شملت لاعبي منتخب محافظة القادسية للناشئين بكرة السلة والبالغ عددهم (١٢) لاعبا وقد بلغ متوسط الاعمار (١٥-١٧) أما بالنسبة للوزن فقد كان متوسطهم (٦٣,٥٠) ، أما بالنسبة للمتغيرات المدروسة فقد شملت متغيرات القلب والمتمثلة بمعدل ضربات القلب وحجم الضربة والناتج القلبي ومؤشر الانقباض وكمية الدم المدفوعة ، وكذلك كمية السائل المستهلك وكمية السائل المفقود والتغير في حجم بلازما الدم ولزوجة الدم ونسبة الهيموكلوبين ودرجة الحرارة والوزن ، وقد تم اجراء التجربة الرئيسية بأسلوبين ، الأسلوب الأول (المنتظم) حيث تم قياس متغيرات القلب والوزن ودرجة الحرارة وقياس حجم البلازما ولزوجة الدم قبل الجهد وبعده واعطاء الماء بشكل منتظم كل (١٠) دقائق بأي كمية ، أما الأسلوب الثاني وهو الأسلوب (العشوائي) حيث يتم فيه ايضا قياس متغيرات القلب والوزن ودرجة الحرارة وحجم البلازما ولزوجة قبل الجهد وبعد ولكن لا يتحدد اللاعب بوقت محدد لتناول السوائل وانما حسب رغبة اللاعب بالوقت والكمية ، وقد توصل البحث لعدة استنتاجات من أهمها هي أن عملية التعويض المنتظم ساهمت في التقليل من آثار التعرق نتيجة الجهد والحرارة المرتفعة وبالتالي حافظت وبشكل كبير على كل من (بداية التعرق ، الوزن، نسبة الوزن المفقود، كمية السائل المستهلك ، درجة الحرارة) مقارنة بأسلوب العشوائي.

فهرس المحتويات

الترتيب	الموضوع	رقم الصفحة
	الآية القرآنية	ب
	إقرار المشرف	ت
	إقرار المقوم اللغوي	ث
	إقرار لجنة المناقشة	ج
	الإهداع	ح
	الشكر والتقدير	خ
	ملخص الرسالة	د
	فهرس المحتويات	ذ - س
	فهرس الجداول	س - ش
	فهرس الأشكال	ش
١	الفصل الأول - التعريف بالبحث	٤ - ٢
١-١	المقدمة و أهميه البحث	٣ - ٢
٢-١	مشكلة البحث	٣
٣-١	الاهداف	٣
٤-١	الفرض	٤
٥-١	مجالات البحث	٤
٦-١	التعريف بالمصطلحات	٤
٢	الفصل الثاني	٣٤ - ٥
٢	الدراسات النظرية والدراسات السابقة	٣٢ - ٦
١ - ٢	الدراسات النظرية	٢٩ - ٦
١-١-٢	السوائل	٧ - ٦
٢-١-٢	وظائف الماء للجسم:	٨ - ٧
٣-١-٢	التعرق	٨
٤-١-٢	الغدد العرقية : (sweat Glands)	٩ - ٨
٥-١-٢	آلية أفراز العرق	١٢ - ١٠
٦-١-٢	هل يعوض الرياضيون ما يفقودونه من سوائل أثناء الجهد	١٤ - ١٢

		البدني؟
١٥ - ١٤	التدريب الرياضي في الاجواء الحارة	٧-١-٢
15	درجة حرارة الجسم الداخلية والخارجية:	٨-١-٢
24 - 15	المتغيرات الفسيولوجية :	٩-١-٢
17 - 15	القلب:	١-٩-١-٢
18	وظيفة القلب :	٢-٩-١-٢
20 - 18	Stroke Volum حجم الضربة	٣-٩-١-٢
21 - 20	الدالة القلبية	٤-١-٩-٢
22 - 21	معدل ضربات القلب :	٥-٩-١-٢
23	ناتج القلبي (الدفع القلبي)	٦-٩-١-٢
24 - 23	كمية الدم المقدورة	٧-٩-١-٢
24	الخواص الوظيفية لعضلة القلب	١٠-١-٢
٢٧ - ٢٦	بلازم الدم	١١-١-٢
٢٧	أهمية البلازم:	١٢-١-٢
28 - 27	"وظائف بروتينات البلازم:	١٣-١-٢
28 - 27	لزوجة الدم :	١٤-١-٢
31 - 30	الجهد البدني في الجو الحار لدى الأطفال والناشئة	١-٢
33 - 32	الدراسات السابقة	٢-٢
34	مناقشة الدراسات السابقة :	
٤٩ - 35	الفصل الثالث : منهجية البحث واجراءاته الميدانية	٣
36	منهج البحث	١-٣
37 - 36	مجتمع وعينة البحث	٢-٣
37	وسائل جمع المعلومات والاجهزة المستخدمة:	٣-٣
37	ادوات البحث العلمي:	١-٣-٣
38 - 37	وسائل جمع المعلومات والاجهزة المستخدمة	٢-٣-٣
38	التجربة الاستطلاعية	٤-٣
39	الاسس العلمية للاختبار	٥-٣
39	الصدق :	١-٥-٣
39	الثبات :	٢-٥-٣

39	الاختبارات والقياسات المستخدمة	٦-٣
45 - 40	ثانياً : القياسات المستخدمة في البحث	
٤٧ - ٤٦	أجزاءات البحث الميدانية	٧-٣
٤٧ - ٤٦	مواصفات السائل الذي سوف يتم التعويض فيه	١-٧-٣
٤٦	أسلوب تعويض السوائل	٢-٧-٣
٤٨ - ٤٧	التجربة الرئيسية :	٨-٣
٤٩	الوسائل الاحصائية :	٩-٣
٧٦ - ٥٠	الفصل الرابع : عرض النتائج ومناقشتها	٤
٦٠ - ٥١	عرض النتائج	١-٤
٦٠ - ٥١	عرض نتائج	١-١-٤
٧٦ - ٦٠	مناقشة النتائج :	
٦٦ - ٦٠	مناقشة نتائج قيم T ودالة الفروق لمتغيرات (الوزن ، درجة الحرارة ، لزوجة الدم ، الهيموكلوبين) قبل الجهد وبعد لأسلوب التعويض المنتظم والعشوائي	١-١-١-٤
٦٩ - ٦٦	مناقشة نتائج قيم T ودالة الفروق للمتغيرات (بداية التعرق ، الوزن ، نسبة الوزن المفقود ، كمية السائل المستهلك ، درجة الحرارة) بين الأسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي	١-٢-١-٤
٧١ - ٦٩	مناقشة نتائج قيم T ودالة الفروق للمتغيرات (الزوجة الدم ، الهيموكلوبين ، التغيير في حجم بلازما الدم ، زمن الجهد المنفذ) بين الأسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي	١-٣-١-٤
٧٤ - ٧١	مناقشة نتائج قيم T ودالة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خلال الراحة والجهد للأسلوب المنتظم والأسلوب العشوائي	١-٤-١-٤
٧٦ - ٧٤	مناقشة نتائج قيم T ودالة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خلال الجهد بين الأسلوبين المنتظم و العشوائي	١-٥-١-٤
٧٩ - ٧٨	الفصل الخامس : الاستنتاجات والتوصيات	٥

٧٨	الاستنتاجات :-	١ - ٥
٧٩	النوصيات :	٢ - ٥
٨٥ - ٨٠	المصادر	
٨٧	الملاحق	
A	الخلاصة باللغة الانكليزية	

فهرس الجداول

رقم الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
٨	يبين كمية الماء المضافة والمفقودة يوميا الى جسم الانسان	١
٣٠	الاختلافات التشريحية والوظيفية الرئيسة بين الأطفال والكبار، وأثر ذلك على نظام التحكم الحراري في الجسم	٢
٣٢	الاستجابات الفسيولوجية لدى الأطفال أثناء الجهد البدني في الجو الحار مقارنة مع الكبار	٣
٣٨	يبين توصيف العينة	٤
٤١	يبين تفاصيل بروتوكول FTT cfit kids tred mill test	٥
٥١	يبين قيمة T ودلالة الفروق لمتغيرات (الوزن ، درجة الحرارة ، لزوجة الدم ، الهيموكلوبين) قبل الجهد وبعده لأسلوب التعويض المنتظم والعشوائي	٦
٥٣	يبين قيمة T ودلالة الفروق للمتغيرات (بداية التعرق ، الوزن ، نسبة الوزن المفقود ، كمية السائل المستهلك ، درجة الحرارة) بين الاسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي	٧
٥٥	يبين قيمة T ودلالة الفروق للمتغيرات (لزوجة الدم ، الهيموكلوبين ، التغير في حجم بلازما الدم ، زمن الجهد المنفذ) بين الاسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي	٨
٥٦	يبين قيمة T ودلالة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خلال الراحة والجهد لأسلوب المنتظم	٩
٥٧	يبين قيمة T ودلالة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خلال	١٠

٥٩	الراحة والجهد للأسلوب العشوائي يبين قيمة T ودلالة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خلال الراحة والجهد بين الأسلوبين المنظم والعشوائي	١١
----	---	----

فهرس الأشكال

رقم الصفحة	عنوان الشكل	رقم الشكل
١١	يوضح عملية تنظيم الحراري	١
١٦	يوضح الشكل الخارجي للقلب	٢
١٧	يوضح تشريح القلب	٣
٣٠	معدل التعرق (ملي لتر / م 2 في الدقيقة) أثناء الجهد البدني في الجو الحار لدى ثلات مجموعات من البنين في مراحل عمرية مختلفة : ١٢,٢ سنة ، ١٣,٦ سنة ، ١٦,٧ سنة	٤
٤٢	يوضح جهاز فيزويفو لقياس مؤشرات العضلة القلبية بتقنية (Bluetooth)	٥
٤٢	يوضح واجهة برنامج فيزويفو على شاشة الحاسبة خلال الراحة والجهد البدني	٦
٤٣	يوضح جهاز السير المتحرك المستخدم في اداء الجهد البدني	٧
٤٥	يوضح قياس pcv لزوجة الدم	٨
٤٦	يوضح آلية قياس حرارة السائل باستخدام الكتروني خاص	٩
٤٧	يوضح اسلوب التعويض للسوائل خلال الجهد البدني على جهاز السير المتحرك	١٠
٤٨	يوضح تفاصيل اجراء التجربة الرئيسية والمتغيرات المدروسة في يوم الاختبار سواء بالاسلوب العشوائي او المنظم قبل وخلال وبعد الجهد البدني	١١

الفصل الاول

التعريف بالبحث

١- المقدمة واهميه البحث.

٢- مشكلة البحث .

٣- الاهداف .

٤- الفروض .

٥- مجالات البحث .

٦- التعريف بالمصطلحات .

الفصل الأول

التعريف بالبحث

١-١ المقدمة وأهمية البحث:

ان التطور السريع الذي يحصل في مجال البحوث العلمية اخذ خطأ في التقدم والرقي واصبح من متطلبات عصرنا الحالي وهذا ما نلاحظه في التطور التكنولوجي الهائل في الصناعة والزراعة والطب وغيرها من العلوم ما فاق التصور البشري ومنها المجال الرياضي الذي أصبح من الأمور التي تلقى عناية كبيرة جدا من قبل دول العالم وخاصة الدول العظمى اذ اصبحت البحوث في مجال العلوم البدنية والرياضية من سمات هذه الدول لتحقيق الانجازات العالية لصناعة الأبطال من خلال تطوير مستواهم البدني و المهارى والخططي واخذ تطور الاداء الرياضي حيزا كبيرا فأصبح كسر الرياضيين للأرقام القباسية أمر مألف سريا.

ومن الالعاب التي حضيت بعناية كبيرة في الآونة الاخيرة لعبة كرة السلة التي اصبحت تمارس بشكل كبير وتحتل مكانة جيدة بين الالعاب لما تحتويه من مزيج رائع في الاداء الفني واليقاع السريع على طول زمن المباراة الذي يبذل فيه اللاعب جهدا بدنيا كبيرا عند ادائه للتحركات الدافعية والهجومية خلال فترات المباراة الاربعة.

ونتيجة هذا الجهد العالي واليقاع السريع المستمر الذي يبذله لاعب كرة السلة اثناء فترة المنافسة تحدث له الكثير من المتغيرات الفسلجية ومن ضمنها ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل كبير بما يتاسب ونوع الجهد البدني المنفذ والذي يحتم على اجهزة الجسم الداخلية المحافظة على الحدود الطبيعية ضمن الحدود والتقليل من الاثار السلبية والتغيرات التي تطرأ عليها نتيجة ذلك الجهد البدني وعليه فأن من بين الاستجابات الفسيولوجية التي ترافق ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة الجهد البدني المبذول وفقدان السوائل عن طرق الزيادة في عمليات التعرق للمحافظة على درجة الحرارة ، تزداد الحاجة الى الماء بسبب ما يفقده الجسم من سوائل عن طريق التعرق لارتفاع درجة حرارة الجسم وارتفاع الرطوبة كأحد الأساليب التي يتتخذها الجسم لمواجهة التغيرات في درجات حرارة الأجهزة الداخلية اذ تختلف كمية السوائل المفقودة بالتعرق تبعا للنشاط الجسمي ودرجة حرارة المحيط فضلا

عن فقدان ونقص في تركيب الاملاح المعدنية مثل الصوديوم والبوتاسيوم في بلازما الدم والذي يؤدي الى اضطرابات في عمل القلب وضعف عمل العضلات فضلا عن تكون الحاجة الى الماء تكون شديدة في حالة القيام بالجهد والنشاط ذو الشدد والحجوم العالية وعليه فإن تعويض ما تم فقدانه يصبح امرا بالغ الأهمية خلال الجهد البدني لكون الماء واحد من اهم المكونات الرئيسية ووسط تحدث فيه العديد من التغيرات الفسيولوجية لأنماط الطاقة.

وتتجلى أهمية البحث في استخدام ازمنه مختلفة لتعويض السوائل في تقديم حقائق علمية عن استخدام اسلوبين للتعويض المنتظم والعشوائي للمدربين والعاملين في المجال الرياضي من خلال مراقبة بعض الاستجابات الفسيولوجية الضرورية.

٢-١ مشكلة البحث :

ان ما يفقده الرياضي في أي سباق أو جهد تحملي من السوائل عن طريق العرق تصل الى حوالي ٥% من وزن جسمه في كل ساعة وفي حالة عدم تعويض هذه السوائل المفقودة اثناء الجهد البدني لاسيما في الجو الحار ،فأن تبعات ذلك لا تقف عند حدود التأثير سلبا على الأداء البدني للرياضي ، بل تعرض حياته للخطر فعدم تعويض السوائل التي فقدها الرياضي يؤدي الى خفض قدرة الجسم على التعرق ومن ثم ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للجسم مما يقود الى التعب المبكر. بالمقابل فأن التأثيرات الإيجابية لتناول السوائل اثناء الجهد البدني تتمثل بالمحافظة على حجم بلازما الدم ، والبقاء على معدل جريان الدم الى الجلد مرتفعا مما يكفل فعالية عمل كل من الجهاز الدوري وجهاز التحكم الحراري في الجسم . وتكمّن مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤل الآتي :

أي من الأسلوبين المنظم أم العشوائي هو الأفضل لتعويض السوائل خلال الجهد البدني؟

٣-١ الأهداف :

يهدف البحث للتعرف على :

١. أثر التباين في الأزمنة لكل أسلوب لتعويض السوائل خلال الجهد البدني للاعب كرة السلة الناشئين.

٢. التعرف على أي الأزمنة المختلفة افضل في تعويض السوائل خلال الجهد البدني للاعبين كرة السلة الناشئين.

٤-١ الفروض :

يؤثر كل من الاسلوب العشوائي والاسلوب المنتظم لتعويض السوائل في المتغيرات الفسلجية (متغيرات العضلة القلبية ، نسبة المفقود والمستهلك من السوائل) خلال الجهد البدني

١. يؤثر الزمن المنتظم في تعويض السوائل إيجابيا في المتغيرات الفسلجية خلال الجهد البدني

٤-٥ مجالات البحث :

- المجال البشري : منتخب ناشئين محافظة القادسية لكرة السلة للموسم ٢٠١٦/٢٠١٥ .
- المجال الزماني : من ٤/١/٢٠١٦ ولغاية ٢٢/١/٢٠١٧ .
- المجال المكاني : مختبر الفسلجة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية .

٤-٦ التعريف بالمصطلحات :

١. الاسلوب المنتظم للتعويض : وهو اسلوب يتم فيه تعويض السوائل خلال الجهد البدني وفقا لأزمنة منتظمة مع ترك حرية للاعب وأخذ الكمية المناسبة من الماء .

٢. الاسلوب العشوائي للتعويض : وهو الاسلوب الذي يترك الحرية للاعب في اخذ مقدار الماء والفترقة الزمنية للتعويض خلال الجهد البدني .

الفصل الثاني

- ٢- الدراسات النظرية والدراسات السابقة
- ٢-١- الدراسات النظرية
- ٢-٢- الدراسات السابقة
- ٢-٣- السوائل
- ٢-٤- وظائف الماء للجسم:
- ٢-٥- التعرق
- ٤-٦- هل يعوض الرياضيون ما يفقونه من سوائل أثناء الجهد البدني؟
- ٤-٧- التدريب الرياضي في الاجواء الحارة
- ٤-٨- درجة حرارة الجسم الداخلية والخارجية:
- ٤-٩- المتغيرات الفسيولوجية :
- ٤-١٠- القلب:
- ٤-١١- وظيفة القلب :
- ٤-١٢- حجم الضربة Stroke Volum
- ٤-١٣- الدالة القلبية
- ٤-١٤- معدل ضربات القلب :
- ٤-١٥- الناتج القلبي (الدفع القلبي)
- ٤-١٦- كمية الدم المقذوفة
- ٤-١٧- الخواص الوظيفية لعضلة القلب
- ٤-١٨- بلازما الدم
- ٤-١٩- أهمية البلازما:
- ٤-٢٠- "وظائف بروتينات البلازما:
- ٤-٢١- الزوجة الدم :
- ٤-٢٢- الجهد البدني في الجو الحار لدى الأطفال والناشئة
- ٤-٢٣- الدراسات السابقة
- ٤-٢٤- مناقشة الدراسات السابقة :

الفصل الثاني

٢- الدراسات النظرية والدراسات السابقة

٢-١- الدراسات النظرية

١-١- السوائل

"يكون الماء في المتوسط ما يقرب من ٦٠٪ من وزن الجسم لدى الإنسان البالغ ٧٠٪ من وزن الجسم تبعاً لمحتوى - السليم، حيث تتراوح النسبة في الواقع بين ٥٠٪ - ٧٣٪ الجسم من الشحوم، فكلما ازدادت نسبة الشحوم في الجسم كلما انخفضت نسبة الماء في الجسم، فالماء يكون حوالي ٧٣٪ من خلايا الجسم غير الشحمية، وحوالي ١٠٪ من الخلايا الشحمية لدى الشخص البالغ. والمحتوى المائي في الجسم منسوباً إلى الأجزاء غير الشحمية يكون أكبر لدى الصغار مقارنة بالكبار، ويتناقص لدى كلا الجنسين مع ٧٤٪ في فترة العشرينات من العمر. - النمو حتى يصل إلى نسبة ٧٣٪ إن دور الماء يتضح جلياً عندما نعرف أن التفاعلات الكيميائية المتعلقة بإنتاج الطاقة في العضلات العاملة تتم في وسط مائي، وهي بالتأكيد ستتأثر سلباً بانخفاض المحتوى المائي في الجسم عن الحد الأدنى، كما أن العناصر الغذائية الضرورية والغازات والنواتج الأيضية، كلها يتم نقلها من وإلى أنسجة الجسم المختلفة عبر وسط سائل يكون الماء الجزء الرئيسي فيه. فضلاً عن، أن الماء يسهم بدور حيوي ومهم في عملية نقل الحرارة من الخلايا العضلية العاملة إلى سطح الجسم، حيث يتم تبديد الحرارة بالحمل وبالإشعاع وبتبخر العرق، وأخيراً، يساهم الماء في تلبين المفاصل وجعل حركتها أكثر سلاسة."^(١)

"تبقي كمية الماء الموجودة في الجسم ثابتة نسبياً طوال الوقت وعلى الرغم من أن تخلص الجسم من الماء يزداد باستمرار عن تناوله فإنه يتم تعديل حالة عدم التوازن بسرعة من خلال تناول مناسب للسوائل لأن مصادر استهلاك الماء والتخلص منه تكون متوازية في ظروف الحرارة العادية.

(١) الهزاع، هزاع بن محمد. كتاب التنظيم الحراري وتعويض السوائل والمنحلات أثناء الجهد البدني لدى الإنسان، ٢٠٠٦ م، ص ٣.

يحتاج الشخص البالغ الذي يعيش في ظروف جوية ذات حرارة عالية إلى حوالي ٢,٥ لتر من الماء والذي يتم التزويذ به من ثلاثة مصادر : السوائل ، الطعام ، العمليات الابيضية . (التمارين الاوكسجينية الخفية ، راجع التمارين والنشاط الرياضي) ^(١) .

٢-١-٢ وظائف الماء للجسم:

- ١- الهضم وامتصاص الغذاء / بمساعدة بعض الانزيمات يعمل الماء على التحلل المائي للغذاء .
- ٢- وسط ناقل للغذاء / يقوم الماء بنقل المواد الغذائية الذائبة فيه .
- ٣- لتوازن الضغط الاسموزي .
- ٤- للتفاعلات الحيوية .
- ٥- في تركيب سوائل الجسم . / الدم واللمف والعرق .
- ٦- طرد المخلفات .
- ٧- تقليل الاحتكاك / بين اجزاء الجسم كالعضلات والمفاصل .
- ٨- تنظيم درجة حرارة الجسم / يعمل على امتصاص الحرارة الناتجة من العمليات الكيميائية .
- ٩- للأبصار والسمع / وذلك في نقل الصوت إلى الأذن ، ويدخل في تكوين الرطوبة المائية والزجاجية للعين .
- ١٠- لمعالجة الامراض .
- ١١- لأنسجة الجسم / إذ أن ١ غم من النسيج الدهني يرتبط ب ٠.٢ غم من الماء و ٤ غم من النسيج العضلي ^(٢) .

(١) هاشم عدنان الكيلاني : فيزيولوجيا الجهد البدني والتدريبات الرياضية ، عمان ، دار حنين ، ٢٠٠٥ م ، ص ٤٠٣

(٢) محمد محمد الحمامي : التغذية والصحة للحياة والرياضة ، القاهرة ، ٢٠٠٠ ، ص ٣٤٥ .

جدول (١)

يبين كمية الماء المضاف والمفقودة يومياً إلى جسم الإنسان^(١)

الماء المضاف يومياً	الماء المضاف يومياً
البول ١٣٠٠ ملليلتر	ماء حر ١٠٠٠ ملليلتر
العرق ٦٥٠ ملليلتر	ماء في الأطعمة ١٠٠٠ ملليلتر
الرئتين ٤٥٠ ملليلتر	ماء أكسدة ٥٠٠ ملليلتر
٢٥٠٠ ملليلتر	٢٥٠٠ ملليلتر
	المجموع

٣-١-٢ التعرق

"العرق (sweat) أحد السوائل العضوية التي تفرزها الغدد العرقية الواقعة تحت الجلد نتيجة للنشاط الوظيفي للجسم بصورة عامة ونشاط الغدد العرقية بصورة خاصة ويكون هذا السائل من ماء نسبته كبيرة (٩٩.٣ - ٩٩.٥) تقربياً ونسبة (٠٠٧ - ٠٠٥) تقربياً من مواد عضوية مثل (بيوريا وحامض اللبنيك وسكر ومواد لا عضوية مثل ، الصوديوم والبوتاسيوم والحديد والكلاسيوم والفوسفات) كما يظهر مع العرق مواد دهنية وقشور الطبقة الطلائية تحت الجلد"^(٢) .

٤-١-٢ الغدد العرقية : (sweat Glands)

"تنتشر على سطح الجلد في جميع أقسام الجسم البشري ملايين من المسامات العرقية الدقيقة المفتوحة كنهايات للغدد العرقية الواقعة تحت الجلد والمسؤولة عن إفراز سائل يتكون من الماء والأملاح اللاعضوية وبعض المواد المهمة مثل الهرمونات . وتكون الغدد العرقية على نوعين :

(١) محمد سليم صالح وعبد الرحيم عشير : علم حياة الإنسان ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، ١٩٨٢ ، ص. ٣٦٠

(2) Vidya Raton : hand book of human physiology . printed at narian and sons , new Delhi , 5th . ed . 1983 . P: 194 .

١- الغدة الايكراينية Ecrine sweat – Glands

٢- الغدة الايبوكرانية Apocrine Sweat Glands

تنشر غدد ايكراين في جميع اقسام الجسم ، وتحت الجلد بصورة خاصة . وهي على هيئة انبوب دقيق ملتفة على بعضها بعض ، وتنتهي ببنوءات تظهر على سطح الجلد ، ومن الناحية الفسلجية فإن للغدد العرقية غشاء قاعديا ، وطبقة من خلايا المايوبياثيل (Myoepithelial) وخلايا مفرزة تتصرف بشكلها المكعب أو الاسطواني . وتجهز الغدد العرقية بالياف عصبية تقع خلف عقدة ألياف العصب السمبثاوي .

ويتصف السائل المفرز من غدد ايكراين بأنه نقى ومحفظ مقارنة مع ما تفرزه غدد ايبوكرانين أما بالنسبة الى غدد ايبوكرانين ، فإنها توجد تحت جلد الإبط وعظم العانة وتحت غشاء الصفن وحول حلمة الثدي ، وتقتصر بمحرر انبوبي مفرد تحت الشعر ، ويبدأ عمل هذا النوع من الغدد بعد البلوغ وتجهز هذه الغدد بالياف (Cholrenergic) العصبية .

يتصرف السائل المفرز من هذه الغدد بأنه لبني المظهر وعديم الرائحة عندما يكون حديث الافراز الا انه بعد مدة يتحلل بفعل البكتيريا ويعطي رائحة مكوناته الكريهة فضلا عن انه يؤدي الى تلطيخ الثياب بلون افرازاته .

يفرز العرق عند الانسان بمستوى ضغط مقداره (٢٥٠) ملم زئبق او أكثر ^(١).

" للتعرف على العلاقة بين درجة حرارة الجسم Core Temperature والعرق الخارجي، يؤكّد هافينيث Havenith " أن الارتفاع في درجة حرارة مركز الجسم يرفع التحفيز المركزي للغدد العرقية ، ويصاحب هذا التحفيز ارتفاع في درجة حرارة الجلد . والنتيجة هي ازدياد في العلاقة بين معدل العرق Sweat Rate ودرجة حرارة مركز الجسم التي تؤدي إلى تحسن في حالات تأقلم الشخص ^(٢) .

(1) Edward Stanton west , Wilbert R . Todd , Howard . mason , John .T. Von Bruggen : Text book of Biochemistry . ٤th . U.S.A. 1970 , P:625 .

(2) george harenith : Age predicts cardiorascular , but not thermoregulatory . responses to humid heat stress . Eur . J . Apple . physiol . , 70 , 1995 . P:95 .

ويتفق كوتمان Gitmann " مع ما ذكر هافينيث " أن التعرق المحفز بفضل التمرين يكون على علاقة مباشرة مع الحرارة الداخلية Internal Temperature^(١).

٤-١-٢ آلية أفراز العرق : mechanism of sweat secretion

" تتتألف الغدة العرقية من جزئين رئيسيين :-

١- جزء ملتف عميق في أدمة الجلد يفرز العرق .

٢- القناة التي تمر من خلال طبقي الأدمة والبشرة لتفتح في الجلد .

تقوم الغدد العرقية بافراز سائل مرشح دقيق (Ultra filtrate) يدعى بالسائل المولد أو سائل الافراز الاولى (Primar ar precursor fluid) وبعد تغير تركيز مكونات هذا السائل في اثناء مروره في قناعة الغدة العرقية يكون تركيب السائل الاولى مماثلا للبلازما باستثناء خلوه من بروتينات البلازما ويكون ضغطه التناصحي أعلى أو مشابها للضغط التناصحي للبلازما الدم^(٢).

" يكون تركيز (142) مليمول / لتر ، والكلوريد حوالي (١٠٤) مليمول / لتر ، مع وجود تراكيز قليلة لالملاح الأخرى وعند مرور السائل الاولى خلال القناة يتغير تركيبه إذ يتم اعادة امتصاص ايونات الصوديوم والكلوريد . وتعتمد درجة اعادة الامتصاص على سرعة عملية التعرق إذ أن التحفيز الضعيف للغدد العرقية يؤدي الى بطء مرور السائل الاولى خلال القنوات وبالتالي فإن جميع الايونات (Na⁺، Cl⁻) سيعاد امتصاصها تقريباً .


ومن ناحية أخرى حين يكون تحفيز الغدد العرقية كبيراً . تتكون كميات كبيرة من الافراز الاولى لهذا فإن القناة تستطيع أن تعيد نصف كمية كلوريد الصوديوم فقط أو أكثر قليلاً ، مما يؤدي إلى ارتفاع تركيز ايونات الصوديوم والكلوريد (نسبة الى الحالة السابقة) الى حد كبير تقريباً . (٦٠ مليمول / لتر ، وعليه ستختزل عملية اعادة امتصاص الماء^(٣) .

(1) Gutmann I . , Wahlefeld A W . : determination of lactate deshydrogenase and NAD. In : bermeyer H U , ed . methods of enzimaic analysis . London academic , 3 , 1976 . P;1465 .

(2) ايمان عادل الرماضي : التحليل الكيميائي للسائل العرقى المحفز للحرارة ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل ، كلية العلوم ، ١٩٩٢ ، ص ٦ .

(3) Guyton , text book of medical physiology . seven , edition . w.b . saunders company . 1986 . P:852.

"ان الاشارات العصبية القادمة من المستقبلات الحرارية للجلد والأنسجة العميقة تتكمال في المنطقة الخلفية لتحت المهداد كما أن الاشارات العصبية في المنطقة قبل البصرية تنتقل ايضا الى المنطقة الخلفية لتحت المهداد وأن جميع هذه الاشارات العصبية تؤدي في النهاية الى فقدان الحرارة او توليدتها ، والشكل (١) يوضح عملية تنظيم الحرارة في الجسم .



شكل (١)

يوضح عملية تنظيم الحراري

يعد مجموع فقدان العرق Total sweat lose مؤشراً يوضح مقدار ما يفقده الجسم من سوائل اثناء الجهد البدني (التمرين) ويتعلق مقداره بعده عوامل منها ، مكونات حمل التدريب بمختلف العلاقات بينها ودرجة حرارة المحيط وسرعة الريح ونوع الملابس والتجهيزات الرياضية ومستوى اللياقة البدنية . والتعرق أما أن يكون بصورة تبخر غير محسوس أو غير منظور أو تدريجي أو بصورة تصيب واضح للعرق على سطح الجسم . يبلغ التبخر غير المحسوس مقدار (٨٠٠ - ١٢٠٠) ملتر / يوم تقريبا ، بينما يبلغ مقدار العرق خلال العمل العضلي عند الحرارة المرتفعة ١٤ لتر / يوم

Tقربياً ، ويعد فقدان الماء من الجلد بواسطة التبخر الجلدي Insensible cutaneous evaporation (غير المحسوس) . بانه فقدان اجباري Obligatory loss عندما لا يكون هناك تعرق واضح^(١) .

٦-١-٦ هل يعوض الرياضيون ما يفقودونه من سوائل أثناء الجهد البدني؟

"يظهر من البحوث التي أجريت على الرياضيين أنهم عموماً لا يعوضون كل ما يفقودونه من سوائل عن طريق التعرق، بل أن متسابقي التحمل يعوضون ما تصل نسبته ٥٠ % فقط من مقدار ما يفقودونه من سوائل خلال الجهد البدني. كما أن - من ٤٠ الدراسات التي أجريت على رياضي كرة القدم المحترفين، وتم خلالها رصد السوائل المفقودة خلال ٩٠ دقيقة من التدريب في بداية الموسم عند درجة حرارة بلغت ٣٢ درجة مئوية ونسبة رطوبة وصلت إلى ٢٠ %، بينت نتائجها أن مقدار السوائل المشروبة أثناء التدريب بلغ ٩٧٢ ملي لتر (تراوح من ٢٣٩ إلى ١٧٢٤ ملي لتر)، وأن متوسط ما تم تعويضه نسبة إلى مقدار ما فقده اللاعبون قد بلغ ٤٥ %، كما تم تعويض ما يعادل ٢٣ % من الصوديوم المفقود عن طريق العرق، وخلاصت الدراسة إلى أن الرياضيين لا يشربون السوائل بما فيه الكفاية لكي يعوضوا ما فقدوه من ماء وصوديوم من خلال العرق. وتشير نتائج الدراسات التي قمنا بإجرائها على ناشئي كرة القدم أن ما يتناولونه من سوائل ما بين الشوطين لا يتجاوز بأي حال من الأحوال نسبة ٧٥ % من مقدار السوائل التي فقدوها خلال الشوط الأول من المباراة .

إن شرب كميات كافية من السوائل يسهم في الحد من ارتفاع درجة حرارة الجسم ويحافظ على اتزان السوائل، بل أن نتائج الدراسات تشير إلى أن معدل ارتفاع درجة حرارة الجسم يتاسب عكسياً مع كمية السوائل المتداولة أثناء الجهد البدني، وكلما انخفض مقدار السوائل المتداولة كلما ارتفعت درجة حرارة الجسم، خاصة مع استمرار الجهد البدني. كما تشير نتائج دراسة أخرى إلى أن شرب كميات كبيرة من السوائل أثناء فترة الاسترداد من جهد بدني فقد الجسم خلاله كماً من السوائل يعادل ٣ % من الوزن، قد أدى إلى استعادة حجم بلازما الدم وتوازن السوائل في الجسم بصورة أسرع من شرب كميات قليلة من السوائل، على الرغم من الزيادة الملحوظة في حجم البول"

(1) per – olef Astrand . kaare Rodahl : Textbook of work physiology ; U.S.A , 1970 . P:625 .

"ان الهدف الأساسي من تعويض الماء او السوائل هو المحافظة على حجم البلازم وبالنالي ديمومة الدورة الدموية. أن تناول الماء قبل او اثناء السباق في الأنشطة التي تزيد عن ٣٠ دقيقة وخاصة ركض المسافات الطويلة يؤدي الى شعور اللاعب بالارتياح خلال السباق مع قلة سرعة ضربات القلب وارتفاع حرارة الجسم . ويحتاج الجسم مدة تتراوح بين (٢٤-٣٦) ساعة لتعويض الماء المفقود الذي تنتج عن فقدان من (٤-٧,٥)% من وزن الجسم ويمكن تعويض الماء خلال مراحل السباقات الطويلة هذا يساعد في المحافظة على درجة حرارة الجسم ويكتفي تناول ٢٠٠ ملتر من الماء كل ٥ دقيقة خلال الاداء في تجنب الامراض الحرارية كما يساعد على رفع مستوى الاداء"^(١) .

كيف تساعد السوائل على تحسين الأداء ؟

- تعد السوائل جزءاً من دورة إنتاج الطاقة باعتبارها جزءاً من تكوين الدم اذ يساعد الماء في نقل الأوكسجين والجلوكوز إلى خلايا العضلات، وبالطبع فإن الأوكسجين يساعد الجلوکوز في إنتاج الطاقة ويقوم الدم بالخلص من النفايات والمنتجات التي تنتج أثناء توليد الخلايا العضلية للطاقة وتمررها إلى البول لإخراجها من الجسم وفقدان السوائل يقلل من حجم الدم في الجسم وهذا مايضطر القلب لبذل مجهد أكبر لتوصيل قدر كافٍ من الأوكسجين إلى الخلايا.

- تبريد الجسم، فالنشاط الرياضي يولد حرارة تخرج كمنتج ثانوي أثناء عملية إنتاج الطاقة ويساعد العرق على تبريد حرارة الجسم. أثناء تحريك العضلات ترتفع درجة حرارة الجسم بصفة عامة فيتصبب الرياضي عرقاً وأثناء تبخر العرق تبرد درجة حرارة الجلد والدم الذي يقع تحت الجلد مباشرة والدم الأكثر برودة الذي يتدفق في جميع أرجاء الجسم يساعد على الوقاية من شر الحرارة الزائدة فإذا لم تعوض السوائل التي فقدت أثناء العرق فسيختل توازن سوائل الجسم وهي مشكلة تزداد ضخامة كلما واصلت العضلات النشطة توليدها لمزيد من الحرارة^(٢).

- نقل المواد الغذائية : يقوم الماء داخل تيار الدم بنقل العناصر الغذائية الأخرى اللازمة للأداء والتي تشمل العناصر المعدنية المسممة بالإلكترونات.

(١) الهزاع، هزار بن محمد: مصدر سبق ذكره، ٢٠٠٦، ص. ٢.

(2) Willmore , J, and Costil ,D: Physiology of sport and exercise HUMAN (Kinetics , Champain IL,1994 ,P346 .

- وسادة لامتصاص الصدمات : يوفر الماء المحيط بأنسجة الجسم وأعضائه الحماية نوعاً ما من الصدمات والاحتكاكات التي تحدث أثناء التدريب.

٧-١-٢ التدريب الرياضي في الأجواء الحارة

ان عملية التدريب الرياضي في الأجواء الحارة لها تأثيرات فسيولوجية من خلال الحمل البدني الذي يمثل في هذه الحالة "عملية هجوم حادث على ذلك الجسم واجهزته الحيوية الداخلية ، فأنما تكرر هذا الهجوم بنفس الشدة والتكرار فان الجسم قد استعد لمثل ذلك بطاقة مخزونة إضافية للتعويض وسد النقص وبذلك تحصل عملية التأقلم والتكيف على الطرف الجديد ومن خلالها يتطور الجسم بأجهزته الدفاعية والتي تعد عملية تطور بالإمكانيات البدنية^(١).

تعمل اللياقة البدنية على تعزيز قدرة الفرد على تنظيم درجة حرارة الجسم عند العمل في الأجواء الحارة وينجم ذلك "من خلال تقليل مستوى الحرارة التي عندها يبدأ الجسم بإفراز العرق ، لذا نجد أن معدل نبض القلب ودرجة الحرارة المركزية لدى الاشخاص اللائقيين يكون بمستوى أقل اثناء العمل أو عند مزاولة النشاط الحركي ان زيادة التأقلم تؤدي الى تقليل النقطة (set point) أو المستوى التي يبدأ عنها افراز العرق لهذا نجد أن الفرد اللائق بدنياً يمتلك استعداداً جيداً للتأقلم مع حرارة الجو ويكون أكثر استعداداً للعمل في الجو الحار (ناديل ١٩٨٧) والشاهد المتوفرة تشير الى أهمية اللياقة البدنية في زيادة سرعة عملية التأقلم^(٢).

ان "أهم جزء من التكيف والتأقلم مع الحرارة سواء أكانت باردة أم حارة يأتي في الأسبوع الأول من التعرق للحرارة وبصورة أساسية يتم خلال العشرة أيام الأولى ، وأن التدريب الرياضي يزيد من حساسية وكفاءة الاستجابة التعرقية حيث يبدأ التعرق في درجة حرارة أقل للجسم^(٣).

(١) حمـه نـجم جـاف . صـفـاء الدـيـن طـه : الطـبـ الـرـياـضـيـ وـ التـدـريـبـ ، اـربـيلـ ، مـطـبـعـةـ جـامـعـةـ صـلاحـ الدـيـنـ ، ٢٠٠٢ـ . صـ ٦ـ .

(٢) ريسـان خـريـيطـ ، عـلـيـ تـرـكـيـ مـجـيدـ : فـسـيـولـوـجـيـاـ الـرـياـضـيـ ، بـغـدـادـ ، ٢٠٠٢ـ ، صـ ١٣٥ـ .

(٣) هـاشـم عـدنـانـ الـكـيلـانـيـ : الـأـسـسـ الـفـسـيـولـوـجـيـةـ لـلـتـدـريـبـ الـرـياـضـيـةـ ، طـ ١ـ ، الـكـوـيـتـ ، مـكـتـبـةـ الـفـلاحـ لـلـنـشـرـ وـالـتـوزـيعـ ، ٢٠٠٠ـ ، صـ ٣٣٨ـ .

ان اكبر نتیجة لعملية التعرق الشديدة هو فقدان الجسم للماء ويحدث خلال التمرين الجاد (القوي) والتعرق باستمرار يسبب للشخص فقدان ما بين ٢-١ كغم من سوائل الجسم اما بالنسبة للرياضيين الاشداء ، يفقد الجسم حوالي ٤% من وزن السائل في أوقات التدريب غير العادي ، وتعتمد كمية الماء المفقودة على وقت النشاط الجسدي وكذلك على الظروف البيئية ، لقد اثبتت الدراسات الفسلجية أن فقدان الماء نتيجة العمل المستمر وخاصة اذا نفذ في ظروف مناخية حارة ، يجب ان يعوض بسرعة قدر الامكان ويفضل أن يكون بالمقدار نفسه، و" الشرب الجزئي للماء اثناء تنفيذ عمل بدني وتحت ظروف مناخية حارة يؤخر فقدان بلازما الدم"^(١) .

٨-١ درجة حرارة الجسم الداخلية والخارجية:

"عادة يمكن ملاحظة منطقتين مختلفتين في درجة حرارتها وهما درجة حرارة الجسم الخارجية ودرجة حرارة الجسم الداخلية وعادة تكون درجة الحرارة الداخلية هي الدرجة الثابتة وتشمل درجة حرارة كل من المخ واعضاء القفص الصدري والتجويف البطني والحوض اما بالنسبة لا عضاء الجسم وانسجته الخارجية(الجلد وأكبر جزء من العضلات الهيكلية والجهاز العظمي) فأن درجة حرارة هذه المناطق تعتبر درجة حرارة خارجية ولذا فإنها نوعا لدرجة ما بدرجة حرارة البيئة الخارجية حيث ترتفع اذا ارتفعت وبالعكس ، وهذا الاختلاف يساعد على ثبات درجة حرارة البيئة الداخلية للجسم ، اذ تقوم هذه الاعضاء بتوصيل حرارة الجسم الزائدة للخارج عندما تزيد الحرارة، وعندما تزيد البرودة فان هذه الاعضاء تمنع فقدان الحرارة"^(٢) .

و"هناك حدود معينة لدرجة حرارة البيئة الخارجية يشعر الجسم فيها بعدم البرودة او السخونة اثناء حالة الراحة ، وفي هذه الحالة يصبح التمثيل الغذائي للإنتاج الطاقة في اقل مستوى له وفي حالة تغيير درجة حرارة البيئة زيادة او نقصانا" عن هذه الدرجة يزيد التمثيل الغذائي للإنتاج الطاقة ، ففي حالة زيادة البرودة يفقد الجسم طاقة حرارية لتعويض المفقود نتيجة البرودة .

(١) رisan خريبيط ، علي تركي : رisan خريبيط ، علي تركي مجيد : فسيولوجيا الرياضة ، بغداد ، ٢٠٠٢ ، ص ١٥٤ .


(٢) ابو العلا احمد عبد الفتاح:فسلفة التدريب والرياضة ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، ٢٠٠٣م ، ص ٤٩٨ .

٢-٩-المتغيرات الفسيولوجية :

"هي التي تعبر عن الحدود التي يمكن أن تعمل في ضوئها الأجهزة الحيوية للجسم ومدى استجابة الجسم للحمل الواقع عليه والتي تتم أثناء النشاط الرياضي"^(١)

٢-٩-١-القلب:

ويعتبر القلب مركز الحياة في الكائنات الحية وهو منشأ الطاقة المسببة لحركة الدم في الأوعية الدموية اذ يقوم بعمله كمضخة يأتي اليه الدم المحمل بالمواد الضارة كـ(ثاني اوكسيد الكاربون ، وحامض اللبنك) الناتجة من التفاعلات الكيميائية داخل الخلايا اثناء قيامها بوظائفها الاعتيادية من جميع اجزاء الجسم ويقوم القلب بضخ الدم المحمل بالاوكسجين من الرئتين الى سائر الجسم والى عضلة القلب نفسها^(٢).



الشكل (٢) يوضح الشكل الخارجي للقلب^(٣)

والقلب عضواً عضلي موجود في كل الفقرات مع جهاز الدوران وهو مسؤول عن ضخ الدم خلال الاوعية الدموية بواسطة التقلص اليقاعي المنتظم^(٤) ، محاط من الخارج بغشاء مكون من كيس


(١) محمد حسن علوي و أبو العلا احمد : فسيولوجيا التدريب الرياضي، القاهرة، دار الفكر العربي ، ٢٠٠٠ ، ص ١٢ .

(٢) عليش زبيون: بيولوجيا الانسان ومبادئ في التشريح والفسيولوجيا ، ط٤، دار عمان للطباعة والنشر ، عمان، ٢٠٠٢، ص ٢١٨ .

(٣) رجستر ، مونست : الدليل الشامل الى صحة القلب (كتاب القلب) ، ترجمة : حسان احمد قمحة ، ط٢ ، الدار العربية للعلوم ، بيروت ، ٢٠٠٦ ، ص ٩١ .

(4) Kumar, Abbas, Fausto: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 7th Ed. p. 556 .

يطلق عليه (التايمور Pericardium) يحميه وينع الامتناء الزائد للقلب بالدم ويمتئ الحيز بين القلب والتايمور بكمية قليلة من السائل في الحالة السوية^(١) ، ويحيطه من الداخل غشاء شفاف يسمى الشغاف وتتألف جدران القلب بصورة رئيسيّة من الخلايا العضلية^(٢) ، ويترکب جدار القلب من ثلاثة طبقات تقوم الطبقة الخارجية لعضلة القلب (النخاب Epicardium) بدور الغلاف الخارجي ثم الطبقة العضلية Myocardium الثانية وهي المسؤولة عن حركة عضلة القلب والطبقة الداخلية (الشغاف Endocardium) وهي الطبقة المبطنة لتجويف القلب والصمامات^(٣) .



الشكل (٣) يوضح تشريح القلب^(٤)

وتعد العضلة القلبية طرزاً فريداً من العضلات الموجودة في أجسام الفقريات فهي عضلات مخططة لا ارادية Involuntary Striated muscle موجودة في هذا العضو فقط ووجود التلاصق القوي لنهاياتها(الأقراص البينية)^(٥) ويختلف سمك جدار القلب تبعاً لاختلاف شدة العمل الذي يقوم به كل جزء من أجزاء القلب فيبلغ سمك جدار البطين الأيسر حوالي من (١٠-١٢ ملم) بينما يقل عن ذلك

(١) رجستر، مونست: مصدر سبق ذكره ، ص ١٦ .

(٢) عمار جاسم مسلم: قلب الرياضي، مطبعة اب، بغداد، ٢٠٠٦، ص ٢ .

(٣) ابو العلا احمد عبد الفتاح: فسيلوجيا التدريب الرياضي ، ط١، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ٢٠٠٣ ، ص ٣٩٣ .

(٤) رجستر، مونست: مصدر سبق ذكره ، ص ٤١ .

(5) Guyton & Hall : Text book of Medical physiology. 12th edition .United states of America .2011.p 101-102 .

جدار البطين الايمن ويبلغ (٥-٨مم)^(١) وبلغ سمك جدار الأذينين حوالي (٢-٣مم) وأن هذا السمك في جدار القلب فضلاً عن التجويف القلبي هما الذين يحدان حجم القلب^(٢).

٢-٩-١ وظيفة القلب :

يعد القلب من أهم أعضاء الجهاز القلبي الوعائي يذكر عبد الرحمن محمد وهاني طه " إن وظيفة القلب هي ضخ الدم الذي يصله من الأوردة إلى الشريان لتوزيعه إلى جميع أنحاء الجسم إذ إن حياة مختلف الأنسجة في الجسم تعتمد على استلام الكمية الكافية من المواد الغذائية اللازمة للبناء أو لتحرير الطاقة وكذلك توفير الأوكسجين اللازم للعمليات الحيوية لتحرير الطاقة وكذلك الكمية الكافية من المواد الغذائية الأخرى والمواد المسيطرة مثل الهرمونات والمواد المساعدة على التفاعلات الكيميائية كالأنزيمات وغيرها"^(٣). ويدرك رisan خرييط وعلي تركي " أن وظيفة القلب هي تغيير كمية الدم المتداولة إلى الأعضاء المعنية تبعاً للتغيير درجة نشاطها فعند زيادة نشاط عضو معين يزداد معه أيضاً حجم الدم المتداول إليه "^(٤). أما رشدي فتوح ويدرك "إن على القلب أن يضخ الدم بكميات تتناسب وحاجة الجسم "^(٥).

ويؤكد رisan وعلي تركي أن ما "يساعد القلب على القيام بوظائفه الخصائص التي يتمتع بها نسيجه العضلي وطبيعة تركيبه، والأعصاب المغذية للعضلة القلبية والعوامل التي تؤثر عليها "^(٦).

٣-٩-١-٢ حجم الضربة Stroke Volem

يعرف بأنه حجم الدم الذي يضخ عن البطين الايسر اثناء النبضة القلبية الواحدة^(٧)، أو هو مقدار الدم الخارج من البطينين في الضربة (خفقة) الواحدة واثناء الانقباض البطيني وعلى الرغم من شدته الناتجة عن التنببيات السمبتوانية الا انهم لا يفرغان من الدم ، "فاحجم الضربة يزداد كلما زاد

(١) <http://www.users.rcn.com>. Animal Tissues. 2010-08-13 .

(٢) محمد حسن علاوي، ابو العلا احمد: فيزيولوجيا التدريب الرياضي، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٨٤، ص ٩٤ .

(٣) عبد الرحمن محمد و هاني طه: مبادئ علم التشريح، ط٤، بغداد، مطبعة العمال المركزية، ١٩٨٨، ص ٢٤٣-٢٤٤ .

(٤) رisan خرييط وعلي تركي: فيزيولوجيا الرياضة، ٢٠٠٢ ، ص ٢٩ .

(٥) رشدي فتوح: اساسيات عامة في علم الفسيولوجيا، ط٢، الكويت، ذات السلسل للطباعة والنشر، ١٩٨٨، ص ٣١٩ .

(٦) رisan خرييط وعلي تركي: المصدر السابق، ٢٠٠٠ ، ص ٣٠ .

(٧) كاظم جابر امير: الاختبارات والقياسات الفسيولوجية في المجال الرياضي ، الكويت ١٩٩٧ ، ص ٢٥٦ .

حجم الاملاء النهائي وتعرف هذه العلاقة بين حجم الضربة وبين حجم الاملاء النهائي وقوتها باسم آلية (فرانك - ستارلنغ) وتعني زيادة الدم العائد الى القلب في نهاية الانبساط البطيني حيث تزيد من كمية الدم التي يضخه القلب في الضربة الواحدة^(١)، وأن تدفق مقدار زائد من الدم الى البطينين سوف يؤدي الى تمدد العضلة القلبية ذاتها الى طول أكبر (أي يزداد طول الالياف العضلية في نهاية الانبساط) وهذا يجعل العضلة القلبية تتقلص بقوة أكبر ، لأن تمدد (تمطر) الالياف العضلية القلبية يجعل خيوط الاكتين والميوzin تتدخل بدرجة فضلى (مثلى) تقريباً لتوليد القوة . ولذلك فان البطين في هذه الحالة يضخ تلقائياً كمية اكبر من الدم بسبب ازدياد قوة تقصصه . ويعتقد أن ازدياد طول الالياف العضلية القلبية بسبب فرط التحميل الانبساطي يؤدي الى زيادة عدد المواقع التي يمكن أن يصل اليها كامن الفعل مما يسبب زيادة في تحرر شوارد الكالسيوم داخل الخلايا العضلية ، ومن ثم ازدياد قوة التقلص ، وتساعد زيادة شدة التقلص بزيادة التحميل الانبساطي على استمرار التوازن بين نتاج البطين اليسير ونتائج البطين اليمين بحيث يبقى نتاج البطينين في الدقة متعدلاً^(٢) .

"أي أن الزيادة في حجم الدم المطروح من القلب أي الزيادة في قيمة السعة القلبية تحتاج الى زيادة في حجم القلب والاواعية الدموية لسد احتياجات العضلات وانسجة الجسم الاخرى اثناء التمارين الرياضية"^(٣) .

ولأن" ممارسة النشاط الرياضي واداء احمال بدنية يؤدي الى زيادة حجم الدم المدفوع في الضربة الواحدة اثناء الاداء"^(٤)، "فبعد التدريب يمتلا بطين اليسير بالدم في المدرب مقارنة بغير المدرب ، وهذا يعني أن هناك دماً أكثر يدخل الى القلب ، وبسبب زيادة حجم الضغط الانقباضي يدخل دم أكثر الى القلب ، وهذا يساعد على زيادة تمدد جدران البطين . وزيادة الانقباض وترتبط مع زيادة التمدد الناتج مع الانبساط الافضل للقلب المدرب ، وهذا يعني زيادة في حجم الضربة القلبية"^(٥) ، "ولهذا تزداد حجم الضربة مع معدلات الزيادة في الجهد ، حيث تزداد حجم الضربة حوالي من ٤٠-٦٠% اثناء التدريب ، و حجم الضربة لغير المدرب يكون من ٥٠-٦٠ ملليترًا وقت الراحة ،

(١) عمار جاسم مسلم : قلب الرياضي ، شركة اب للطباعة الفنية المحدودة ، بغداد ٢٠٠٦ ، ص ٤٦-٤٧.

(٢) صلاح قطان وآخرون : علم وظائف الأعضاء ، مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة دمشق ، دمشق ٢٠١١ ، ص ٥٢ .

(٣) طارق عبد الملك الامين ، قيس ابراهيم الدوري (ب،ت)، السلسلة لطلاب كلية التربية الرياضية ، دار ابن الاشر للطباعة والنشر في جامعة الموصل ص ٤٢.

(٤) عمار جاسم مسلم : قلب الرياضي ، شركة اب للطباعة الفنية المحدودة ، بغداد ٢٠٠٦ ، ص ٤٩ .

(٥) بهاء الدين ابراهيم سلامة : فيسيولوجيا الرياضة والاداء البدني (لاكتات الدم) ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط١ ، ٢٠٠٠ ، ص ٥٨ .

وعندما يبذل جهدا بدنيا يصل حجم الضربة الى ١٠٠ - ١٢٠ ملليتر ، أما حجم الضربة عند المتدرب وقت الراحة من ٨٠ - ١١٠ ملليتر ، وعند اداء جهد بدني يصل حجم الضربة الى ١٦٠ - ٢٠٠ ملليتر^(١) .

"كما يرتبط حجم الدم في الضربة الواحدة بعلاقة طردية مع VO_2 حجم الأوكسجين المستهلك من قبل الجسم ويصل حجم الدم المدفوع في الضربة الواحدة إلى حدوده القصوى غالباً عندما يكون حجم الأوكسجين المستهلك حوالي (٤٠-٦٠ %) من الحد الأعلى فقط ، كما تتأثر حجم الضربة بأوضاع الجسم أثناء الراحة والتمرين البدني"^(٢) .

"وعادة ما يكون حجم الضربات عند الرياضيين بعد التدريب أكبر بالمقارنة بقبل التدريب ، وهذا يفسر لنا قلة عدد النبضات بعد التدريب بالمقارنة بالراحة ، حيث يمكن لهذه الضربات مد الجسم بنفس مقدار الدم عن طريق دفع المزيد من الدم من القلب مع كل نبضة ولذا فإن القلب في هذه الحالة لا يحتاج للنبع الأسرع"^(٣) .

٤-١-٩-٢ الدالة القلبية Cardiac index

"وتكون من خلال تقسيم كمية الناتج القلبي على المساحة السطحية للجسم لمعرفة كمية الدم الوائلة إلى (م²) الواحد من سطح الجسم بالدقيقة الواحدة لمعرفة حقيقة الفروق ، وكما في المعادلة الآتية"^(٤) :-

$$CI = \frac{CO}{SA}$$

"حيث أن BSA تعني المساحة السطحية للجسم والتي يمكن حسابها عن طريق أخذ وزن اللاعب (كغم) وطوله (سم) ، فمثلاً أحد الرياضيين مساحته السطحية (١,٧٢) ونتاجه القلبي (٤,٧٥٠) لتر في حين كانت المساحة السطحية للاعب آخر هي (١,٨٠) ونتاجه القلبي حوالي (٥,٢٥٠) لتر ، فإن قيمة الدالة القلبية للاعب الأول هي ٢,٧٦ أما اللاعب الثاني فكانت قيمة الدالة القلبية لديه ٢,٩٠ . ومن خلال القيم السابقة يلاحظ أن كمية الدم الوائلة إلى المتر المربع الواحد في الدقيقة من سطح الجسم الأقل ناتج قلبي هي أكبر وبلغت (٣٦٢،٠ ملليتر / م² / د) في حين الأكبر بالناتج القلبي

(١) سميرة خليل محمد : مبادئ الفسيولوجيا الرياضية ، شركة ناس للطباعة ط ١، ٢٠٠٨، ص ١٥٧ .

(٢) عمار جاسم : مصدر سبق ذكره، ٢٠٠٦، ص ٤٩ .

(٣) محمد علي القط : فسيولوجيا الاداء الرياضي في السباحة ، المركز العربي للنشر ، القاهرة، ٢٠٠٦ ، ص ١١٩ .

(٤) عمار جاسم مسلم : مصدر سبق ذكره، ٢٠٠٦، ص ٥٨ .

هو اقل في كمية الدم الوائلة الى مساحة الجسم والتي بلغت (٣٤٢،٠٠ ملليلتر / م٢ د) وهذا يعني وصول اكبر كمية من الدم محملة بالمغذيات والاوكسجين لديمومة العمل العضلي^(١).

٥-٩-١-٢ معدل ضربات القلب :

وهي من المتغيرات الوظيفية التي تتأثر بالتدريب الرياضي المنتظم ، وقد يحدث أحيانا خلط بين استخدام مصطلح "معدل القلب - Heart Rate" ومصطلح "معدل النبض Pulse Rate" . فمعدل القلب هو العدد الحقيقي لضربات القلب خلال الدقيقة الواحدة ، ويعبر عنه ض / د أما معدل النبض فيقصد به الموجة التي يمكن الاحساس بها عندما تمر الشرايين القريبة من سطح الجلد وهذه الموجة قادمة نتيجة موجة من القوة تتدفع من اندفاع الدم من البطين عند انقباض عضلة القلب وتنتشر في جميع الشرايين بفضل مطاطية هذه الشرايين ، ويتطابق كل من معدل القلب ومعدل النبض عادة ، الا في حالة حدوث بعض حالات عدم انتظام ايقاع القلب (Arrhythmia) او قصور الصمامات (Valvular Defect) وهذه الحالات تعوق عملية ضغط الدم الطبيعية من القلب الى الشرايين^(٢). ويعد معدل ضربات القلب في اثناء الراحة والجهد الرياضي وبعده من المؤشرات المهمة التي يعتمد عليها المدرب عند تشكيل حمل التدريب في البرامج التدريبية ، ويمثل فهم المدرب لكيفية استجابة اجهزة الجسم المختلفة وتكليفها ومنها القلب لاداء التدريب من اهم الفوائد التطبيقية لعلم الفسيولوجيا في المجال العلمي ، فقد تناولت العديد من المصادر العلمية تعريف "معدل ضربات القلب" فقد عرفه كل من (Astrand & Rodahl) بأنه " عدد ضربات البطين في الدقيقة الواحدة"^(٣) . كما عرفة (محمد نصر الدين رضوان) بأنه " عدد نبضات القلب في الدقيقة الواحدة "^(٤).

وقد اختلف علماء الفسلجة في مقدار معدل النبض ، الا أن معظم المصادر العلمية تتفق على ان هذا المعدل يقدر في اثناء الراحة لدى الاشخاص المدربين من (٦٠-٥٠) نبضة / دقيقة ، ويمكن ان ينخفض هذا المعدل لدى الرياضيين المدربين تدريبياً عالياً وخاصة عدائى المسافات الطويلة

(١) عمار جاسم مسلم :نفس المصدر السابق، ص ٥٩.

(٢) ابو العلا عبد الفتاح ، محمد صبحي حسانين : فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي وطرق القياس والتقويم ، ط ١ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص ٥٩ ، ١٩٩٧ .

(3) Astrand , P.O and Rodahl , K (1979) : Text book of work physidog Megraw – Will book company , U.S.A .

(٤) محمد نصر الدين رضوان : طرق قياس الجهد البدني في الرياضة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص ٦٩ ، ١٩٩٨ .

والمارثون الى (٣٨-٤٠) نبضة / دقيقة^(١) ، وينظر فوكس (Fox) ان " بطيء النبض (عدد ضربات القلب) في وقت الراحة يعتبر أحد الظواهر المصاحبة للحالة التدريبية الجيدة " ، أما بعد اداء الجهد الرياضي فيرتفع هذا المعدل كلما ارتفعت شدة المجهود ومدة دوام الاداء ويصل هذا المعدل الى أكثر من (٢٢٠) نبضة / دقيقة لدى عدد من الرياضيين عند دائم مجهوداً ذا شدة عالية^(٢).

وقد أكد (قاسم المندلاوي ووجيه محجوب) ١٩٨٢ انه " خلال العمل العضلي ترتفع سرعة النبضات وتزداد دفعات الدم الى العضلات العاملة وتتوسع الشعيرات الدموية وبذلك يجري الدم من والى الخلايا بسرعة كبيرة "^(٣).

أما بعد زوال المثير (الجهد البدني) يعود معدل ضربات القلب الى الانخفاض والرجوع الى الحالة الطبيعية ، فسرعة عودة نبضات القلب الى الحالة الطبيعية يدل على عمل القلب بصورة جيدة ، اذ ترتفع كمية الدم التي يضخها القلب لتصل الى حوالي (٢٥-٣٠) لتر / دقيقة أثناء الجهد البدني عند الشخص الرياضي مما يساعد على الاستمرار بالعمل بشكل منظم ، ويصل معدل القلب عند الشخص الرياضي أثناء الراحة الى حدود (٥) لتر ، وأن هذا الارتفاع أثناء المجهود يؤدي الى زيادة معدل ضربات القلب وزيادة حجم القلب"^(٤).

ونظراً لسهولة قياس معدل ضربات القلب ، فقد أمكن عملياً استخدامه في تقنين حمل التدريب والتعرف على مدى ملائمة الحمل لمستوى الحالة التدريبية للاعب وفترة استعادة الشفاء وتقنين فترات الراحة البينية خلال التدريب الفتري ، وكذلك تحديد شدة الحمل الملائمة تبعاً لمعدل القلب ، وهذا يرجع الى ارتباط معدل القلب بكثير من العمليات الفسيولوجية الأخرى المهمة مثل ، معدل استهلاك الاوكسجين والعتبة الفارقة اللاهوائية وغيرها اثناء النشاط الرياضي ، حيث توجد علاقة طردية بين معدل القلب وبين شدة الحمل البدني ، فيكون الحمل ذات شدة منخفضة اذا كان معدل القلب اقل من (١٣٠) ضربة / دقيقة ، وعند زيادة معدل القلب اكثر من (١٨٠) ضربة / دقيقة فإن هذا الحمل يعتبر أقصى شدة^(٥).

(١) سلمى نصار وآخرون : بيولوجيا الرياضة والتدريب ، دار المعارف ، مصر ، ص ١٣٢ ، ١٩٨٢

(٢) Fox , E , L (1984) : sport physiology , Saunders College publishing company , Japan .

(٣) مظفر عبد الله شفيق : الندوة الخامسة للطب الرياضي ، المحاضرة الاولى ، القابلية البدنية والاوكسجينية عند الرياضيين ، فندق الرشيد ، بغداد ، ١٩٩٦ .

(٤) حكمت عبد الكريم فريحات : فسيولوجيا جسم الانسان ، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، ١٩٩٠ ، ص ١٣٥ .

(٥) ابو العلاء احمد ، احمد نصر الدين رضوان : فسيولوجيا اللياقة البدنية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط ١ ، ١٩٩٣ ، ص ٢٦١-٢٦٢ .

٦-٩-١ الناتج القلبي (الدفع القلبي) Cardiac Output

"يعرف الناتج القلبي بأنه حجم الدم الذي يضخه القلب في دقيقة واحدة ، ويحسب الناتج القلبي على أساس المعادلة الآتية^(١) :-

$$\text{الناتج القلبي} = \text{معدل نبض القلب في دقيقة} \times \text{حجم الضربة الواحدة}$$

"ويقاس باللتر أو المللتر ، وهو من المؤشرات المهمة في تطوير كفاءة القلب والجهاز الدوري التنفسـي ، حيث تحصل عند الرياضي زيادة في حجم الضربة وبالتالي زيادة الناتج القلبي" ، و "يقصد به الدم المدفوع من البطين الأيسر ، ويتراوح حجم الناتج القلبي ما بين ٥ - ٦ لترات / دقيقة ، ولكن أثناء التدريب تزيد حاجة العضلات لاستهلاك الأوكسجين فيرتفع الناتج القلبي^(٢) ، وبصفة عامة فإن الأعلى مستوى في الحد الأقصى لاستهلاك الأوكسجين هو الأعلى مستوى في الناتج القلبي ، وعند مقارنة الرجل والمرأة يلاحظ زيادة الناتج القلبي للمرأة عن الرجل عند اداء نفس الحمل البدني بمقدار ١,٥ - ١ لتر / دقيقة ، وهذا يعني أن الناتج القلبي للمرأة يكون أكثر عند نفس مستوى استهلاك الأوكسجين مقارنة بالرجل ، ويرجع هذا إلى نقص قدرة المرأة على حمل الأوكسجين إلى العضلات نتيجة نقص الهيمو جلوبين بالدم^(٣) .

٦-٩-٢ كمية الدم المقذوفة (EF%) Ejection Fraction

"ويعرف الجزء المتبقى من الدم بين كل انقباض وارتخاء لعضلة القلب بفرق القيمة او بفرق الجزء المندفع من البطين ، وهي توضح كمية الدم الداخل إلى البطين الذي تم ضخه فعلاً أثناء عملية الانقباض ويعبر عنه بـنسبة مؤوية تتراوح من ٦٠ - ٧٠ % وقت الراحة ويزداد عندما ينقبض البطينان في حالة بذل الجهد البدني ، وكلما زادت نسبة الدم الخارجة عن ٦٠ % دل ذلك على قوة انقباض القلب ومعادلة EF هي: حجم الضربة - حجم الدم نهاية الأنبساط^(٤) .

"ومهما كانت قوة التقلص لا يستطيع القلب ضخ كامل الدم خارج البطينين مع كل ضربة ويطلق الاطباء على الجزء الذي يضخ من الدم خارج البطين المملوء اسم (الجزء المقذوف) Ejection

(١) شتيوي العبد الله (٢٠١٢) ، علم وظائف الاعضاء ، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، ط١ ، ٢٠١٢ ص ٢٨٩.

(٢) سميحة خليل محمد : مبادئ الفسيولوجيا الرياضية ، شركة ناس للطباعة ، ط١ ، ٢٠٠٨ ، ص ١٥٥.

(٣) ابو العلا احمد عبد الفتاح : فسيولوجيا التدريب والرياضة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط١ ، ٢٠٠٣ ، ص ٤٠٥ ..

(٤) بهاء الدين ابراهيم سلامه : فسيولوجيا الرياضة والأداء البدني ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط١ ، ٢٠٠٠ م ، ص ٤٤ - ٤٥ .

، ويبلغ الجزء المقدوف السوي %٥٠ أو أكثر ، أي أن نحو نصف الدم الموجود في البطين يضخ على الأقل مع كل ضربة . Fraction

ويعد الجزء المقدوف مؤشراً جيداً على الوظيفة الاجمالية للقلب ، ويمكن أن يزداد الجزء المقدوف من القلب في الشخص السليم بنحو %٥ مع الجهد ، كما قد ينقص حتى ٢٠ إلى ٣٠ % أو أقل إذا لم يكن البطينان يقومان بوظيفتهما على نحو سوي^(١) .

٢-١-١. الخواص الوظيفية لعضلة القلب^(٢):

العضلة القلبية تشبه العضلات الهيكلية من حيث الشكل المخطط وتشبه العضلات الملساء من الناحية الوظيفية اللاإرادية إلا إنها تتميز بصفات خاصة وهي:

١. تبع قانون الكل أو عدم (All or none law):

أن أقل مؤثر يمكن أن يسبب أقصى قوة انقباض للعضلة القلبية ويمكن القول بأنه لا يوجد تدرج من ناحية القوة والانقباض ، إلا أنه قد تتغير قوة انقباض القلب قليلاً تحت تأثير عوامل مختلفة لكي يتكيف القلب مع إحتياجات الجسم ومن هذه العوامل التنبهات العصبية و الهرمونية ، وتركيز الأوكسجين والعاقير والسموم والتدريب الرياضي .

٢. صفة الانقباض المنظم الذاتي (تلقائية الانقباض القلبي):

إن الانقباض ينبع من العضلة نفسها وهذه الخاصية تُعد أولى خواص العضلة القلبية التي تظهر في الجنين ، وتبدأ انقباضات القلب الذاتية من منطقة ما تقع عند اتصال الوريد الأجوف العلوي بالأذين الأيمن وهي العقدة الجيبية الأذينية وتسمى بدليل القلب (pace maker) ومن دليل القلب تصل الانقباضات إلى مختلف أجزاء القلب وفي الإنسان فإن دليل القلب يؤدي إلى انقباض القلب بين (٦٠-٧٠) ضربة بالدقيقة .

(1) Halestrap, A. P. and Meredith, D. (2004) The SLC16 gene family from Monocarboxylate transporters (MCTs) to aromatic amino acid transporters and beyond.

(2) بهاء الدين سلامة: فسيولوجيا الرياضة. القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٩٦، ص ٢٥٨-٢٥٩ .

٣. إن المرحلة التي لا تتأثر فيها العضلة القلبية أطول من مثيلتها في العضلات الإرادية وهذه المرحلة تبقى لتشمل مرحلة الانقباض أيضاً أي أنه إذا أرسلت إشاراتان متتاليتان ووقيعت الأخيرة في مرحلة الانقباض للأولى فان عضلة القلب لن تتأثر بالإشارة الثانية.

٤. من الناحية الكيميائية الحيوية :

تستطيع عضلة القلب في أحوالها الاعتيادية أن تؤكسد حامض اللبنيك الخاص بالدم (Lactic Acid) وأيضاً كلوكوز الدم مفضلةً الحامض على السكر وهذه القدرة لعضلة القلب على استخلاص الوقود من الدم (وليس من الوقود الخاص وهو الكلايوكجين) تعزى إلى إحتواه على عدد كبير من الشعيرات الدموية .

٥. ثمة اختلاف كيميائي آخر بين العضلة القلبية والهيكلية:

تُتعطل العضلة القلبية في غياب الأوكسجين أكثر من الهيكلية كما أنها لا تتحمل تراكم حامض اللبنيك بداخلها مقارنة بالعضلة الهيكلية .

١-١-١ بلازما الدم

"تُعدّ البلازما القسم السائل من الدم وهي تحتوي على عناصر متنوعة بشكل ملائم، يقدر حجمها ب ٥٥% من حجم الدم الاجمالي وتبدو إذا فصلت عن الكريات بلون رائق يميل إلى الصفرة وتعادل لزوجتها ١٠.٥ بالنسبة للماء المقطر وهي تتعلق بالبروتينات الموجودة بها والبلازما الدموية ذات تفاعل أساسي خفيف وتتراوح كثافتها النوعية بين ١٠٣٤ و ١٠٢٥."^(١)

"والبلازما سائل معقد تجري فيه العناصر المتشكلة ويمكن الحصول عليه بأخضاع الدم المضاف له مانع للتختثر للطرد المركزي لعدة دقائق فترسب خلايا الدم ويبقى سائل رائق هو البلازما. كما يمكن الحصول من الدم على مصل الدم الذي يشبه البلازما في تركيبه فيما عدا إنه لا يحتوي على عوامل التختثر ويتم الحصول على مصل الدم بترك الدم المسحوب يتختثر بشكل طبيعي خلال دقائق حيث يتكون تركيب هلامي يحتوي خلايا الدم بينما يتختلف سائل صاف هو المصل.

(١) صباح قطان وآخرون: علم وظائف الأعضاء، دمشق، ج١، ٢٠١١، ص ٣٤٣

والبلازما سائل ضارب للصفرة الخفيفة ويكون وزنيا من ٩٣٪ ماء، ٧٪ بروتينات ومواد مذابة أخرى مثل $\text{Na}, \text{K}, \text{Ca}, \text{Cl}$ ، جلوكوز، جلسرول واحماس دهنية. كما تحتوي البلازما عازات مذابة وهرمونات وفيتامينات وانزيمات واصباغ ومخلفات خلوية مصرفية كالبوليما وحامض البوليك ومواد غذائية الاحماس الامينية، ويوجد مدى واسع لتركيز كثير من المواد المكونة للبلازما ما بين شخص طبيعي وآخر. فلا يقتصر الاختلاف في تركيز المواد على اختلاف الاشخاص بل يتعداه الى الاختلاف لدى الشخص الواحد في الأوقات المختلفة.^(١)

ت تكون بلازما الدم مابين ٥٥-٧٠٪ من حجم الدم. تتكون من ٩٣٪ ماء و ٧٪ مواد صلبة وهي:

١. البروتينات: مثل الفيبرينوجين، الالبومين، والجلوبولين.
٢. الكاربوهيدرات: واهمها الجلوكوز.
٣. مواد نيتروجينية: مثل اليوريا وحمض اليوريك.
٤. مواد غير عضوية: مثل الصوديوم، الكالسيوم وغيرها.
٥. انزيمات واجسام مضادة.

١١-٢-١ أهمية البلازما:

- أ- تعتبر الوسط السائل للمكونات الصلبة للدم.
 - ب- تعتبر وسط غذائي لاحتواها على المادة البروتينية والكريبوهيدراتية.
 - ت- تنظيم حجم الدم والسائل الخلالي والبول بفعل الضغط الاسموزي.
 - ث- لها دور في ايقاف نزيف الدم بواسطة الية التخثر.
- ج- مهمة في تشخيص كثير من الامراض بسبب احتواها على بروتينات وانزيمات واجسام مضادة.^(٢)

١٢-١-٣ وظائف بروتينات البلازما:

١. المساعدة في اعطاء الدم لزوجة معينة.

(١) شتيوي العبد الله: علم وظائف الاعضاء ،الأردن،دار المسيرة للنشر، ط١، ٢٠١٢، ص ٢٥٧.

(٢) عصام الصدفي: فسيولوجيا جسم الانسان ،عمان،دار البيازوري للنشر، ٢٠٠٦، ص ٨٥.

٢. المساهمة في تخثر الدم (فيبرينوجين)
٣. لها أثر مناعي مهم لاحتواها على الغاما غلوبولين.
٤. تسهم في إعطاء البلازما ضغطاً جرمياً الذي له أثر مهم في تبادل الماء بين الدم والسوائل الخالية، لذلك فهي تسهم في حفظ حجم الدم.
٥. تسهم في نقل كثير من العناصر كالحديد والنحاس والهرمونات والفيتامينات والغازات.^(١)

٤-١-٤ الزوجة الدم :

"هي عبارة عن قوة احتكاك الدم بجدران الشرايين والأوردة وهي بشكل أساسي تعتمد على البروتينات الموجودة في البلازما وبالأخص الفيبرينوجين وتمثل أهميتها في الحفاظ على الضغط الدموي وهي للرجال (٤٠.٧) وللنساء (٤٠.٣) غم.سم^(٢).

ترتبط لزوجة الدم بقدر ما تحتويه من الكريات الحمراء والهيموكلوبين ومكونات البلازما البروتينية ، ومقارنة الدم في الماء يلاحظ إن الدم أكثر كثافة من الماء ب (١٠٦٠ - ١٠٨٠) كما تزيد لزوجة الدم عن الماء (٤-٣) مرات ويعود التدريب الرياضي إلى حدوث بعض التغيرات المؤقتة لخصائص الدم حيث تقل درجة لزوجة الدم إثناء الإحماء نتيجة لزيادة الحرارة ويزيد حجم الدم الساري في الدورة الدموية نتيجة خروج الدم المخزون في الكبد والطحال وعند التدريب في الجو الحار مع زيادة إفراز العرق يقل حجم الدم نتيجة خروج ماء البلازما مع العرق وبالتالي تزداد كثافة الدم ولزوجته وتركيزه^(٣) .

"تعتمد لزوجة الدم بدرجة عالية على عدد خلايا الدم الحمراء بصورة طردية وبالتالي قربها من بعضها يزيد من الكثافة النوعية للدم، ولكن تعزى لزوجة الدم بشكل أكبر إلى زيادة بروتينات بلازما الدم .

أما كثافة الدم فتكون أعلى لغير الرياضيين مما عليه لدى الرياضيين وذلك لقلة نسبة بروتينات البلازما وسائل البلازما لديهم ، وإذا ما حدث تعرق شديد في التمرين الرياضي يؤدي إلى زيادة

(١) صباح قطان وآخرون: مصدر سبق ذكره، ٢٠١١، ص ٣٤٥.

(٢) <http://healths.roro44.com>

(٣) محمد حسن علاوي ، ابو العلاء احمد عبد الفتاح : مصدر سبق ذكره ، ص ١٤٦ .

نقصان حجم سائل البلازما وبالتالي زيادة لزوجة الدم بسبب زيادة المقاومة الطرفية والضغط الانقباضي لتحرير عمود الدم إلى الشريان الابهر^(١).

١-٢-الجهد البدني في الجو الحار لدى الأطفال والناشئة^(٢)

هناك العديد من الاختلافات التشريحية والوظيفية التي تجعل الأطفال أقل قدرة من الكبار على تنظيم وضبط درجة حرارة أجسامهم عند أداء جهد بدني، خاصة في الجو الحار أو الشديد الرطوبة. هذه العوامل الموضحة في الجدول رقم (١) تشمل ما يلي:

١. تعد مساحة سطح الجسم نسبة إلى كتلة الجسم لدى الأطفال كبيرة مقارنة بالكبار، مما يقود إلى زيادة التبادل الحراري بين الجلد والمحيط الخارجي، والنتيجة هي اكتساب الحرارة بصورة أكبر عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أعلى من درجة حرارة الجسم التي هي ٣٧ درجة مئوية، وإلى فقدان الحرارة بصورة أكبر عندما تكون درجة الحرارة الخارجية منخفضة. لهذا نجد أن الأطفال أقل تحملًا لدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة جداً مقارنة بالكبار، وبعكس الجهد البدني المتواصل فإن أداء جهد بدني قصير الأمد عند درجة حرارة خارجية مرتفعة قد لا يحمل تأثيراً سلبياً كبيراً على الأطفال.

(١) عمار جاسم مسلم: قلب الرياضي ، ط١ ، شركة اب للطباعة ، ٢٠٠٦ .

(٢) الهزاع، هزاع محمد. التنظيم الحراري وتعويض السوائل والمنحلات أثناء الجهد البدني لدى الإنسان. الرياض: الاتحاد السعودي للطبع الرياضي ، ٢٠٠٧ ، ص ٣ .

"جدول رقم (٢) الاختلافات التشريحية والوظيفية الرئيسية بين الأطفال والكبار، وأثر ذلك على نظام

التحكم الحراري في الجسم

الاختلافات	تأثير ذلك على التنظيم الحراري
مساحة سطح الجسم (كل كجم من وزن الجسم) أكبر لدى الأطفال مقارنة بالكبار	معدل أعلى للتبادل الحراري بين الجلد والبيئة المحيطة بالطفل.
مصوروف الطاقة لدى الأطفال أثناء المشي أو الجري أعلى من الكبار	معدل العمليات الأيضية لدى الأطفال أعلى، وبالتالي إنتاج الحرارة لديهم لكل كجم من وزن الجسم أكبر.
الجهد البدني أقل من الكبار	إمكانية التخلص من الحرارة بواسطة تبخر العرق منخفضة لدى الأطفال مقارنة بالكبار.
أقل من الكبار	انخفاض إمكانية الجسم على التخلص من الحرارة عن طريق الحمل من وسط الجسم إلى أطرافه، لدى الأطفال مقارنة بالكبار.


٢. يعد الأطفال أقل كفاءة (أقل اقتصادية) في المشي أو الجري مقارنة بالكبار. يدلنا على ذلك أن استهلاكم للأوكسجين أثناء المشي أو الجري على السير المتحرك أكبر مما هو لدى الكبار عند سرعات متماثلة.

٣. انخفاض نتاج القلب نسبة إلى استهلاك الأوكسجين لدى الأطفال مقارنة بالكبار، مما يؤدي إلى حصول تنفس شديد على الدم الصادر من القلب بين كل من العضلات العاملة والجلد، المسؤول عن التخلص من الحرارة. وبعد انخفاض حجم الضربة لدى الأطفال عاملاً مهماً في انخفاض نتاج القلب.

٤. انخفاض معدل التعرق لدى الأطفال مقارنة بالكبار، سواء كان ذلك بالمعدل المطلق (الكلي) أو نسبة إلى مساحة سطح الجسم، فالكبار يتعرقون بمعدل يساوي أو يتجاوز الشدة، لكن نادراً ما يتجاوز معدل التعرق لدى الأطفال ٣٥٠ ملي لتر لكل متر مربع (من الجلد في الساعة عند نفس الشدة من

الجهد البدني. ويوضح الشكل البياني رقم (١) رسمًا لمعدل التعرق بالدقيقة نسبة لكل متر مربع من مساحة سطح الجسم لدى ثلات مجموعات من البنين في مراحل عمرية مختلفة، ويظهر بوضوح انخفاض معدل التعرق لدى الأطفال صغار السن مقارنة بالبالغين. ويعزى انخفاض معدل التعرق لدى الأطفال إلى انخفاض قدرة الغدد العرقية على التعرق أكثر مما يعزى إلى انخفاض عدد الغدد العرقية. كما أنه من المعلوم أيضًا أن النقطة التي تبدأ فيها الغدد (Sweating threshold) العرقية بإفراز العرق والتي تعرف بعتبة التعرق تعد أعلى لدى الأطفال مقارنة بالكبار، مما يعني أن الأمر يتطلب ارتفاع درجة حرارة الجسم لدى الأطفال بشكل أكبر من الكبار قبل أن تبدأ الغدد العرقية بالتعرق.

وتشير نتائج أبحاث فسيولوجيا الجهد البدني لدى الأطفال السعوديين إلى أن معدل السوائل المفقودة من الجسم أثناء شوطي مباراة كرة القدم للناشئين بلغ ١,٧٣ لترًا في ١٥ سنة، و حوالي - الساعه، أو ما نسبته ٣,٦ % من وزن الجسم لدى الناشئين في عمر ١٤-١٣ سنة، كما هو موضحًا في الجدول رقم (٢) - ٢,٤ (%) لدى الأشبال في عمر ١١ ، والجدير بالذكر أن هذه المباراة التجريبية كانت قد أجريت في جو حار وقليل الرطوبة. لذا من الأهمية بمكان تعويض السوائل لدى الأطفال والناشئين أثناء التدريبات البدنية في الجو الحار، حتى لا يحدث لهم جفاف بسبب فقدان السوائل، وبالتالي حدوث الإصابة الحرارية^(١).



شكل رقم (٤): معدل التعرق (ملي لتر/م² في الدقيقة) أثناء الجهد البدني في الجو الحار لدى ثلات مجموعات من البنين في مراحل عمرية مختلفة: ١٢,٢ سنة، ١٣,٦ سنة، ١٦,٧ سنة

(١) هزاع محمد الهزاع: نفس المصدر السابق ، ٢٠٠٧ م ، ص ٤ .

ويوضح الجدول التالي سلسلة من الاستجابات الفسيولوجية التي تحدث لدى الأطفال مقارنة بالكبار عند أداء جهد بدني في الجو الحار، وهي استجابات تضع الطفل في موقع أكثر عرضة للإصابات الحرارية من الكبار أثناء التدريب البدني في الجو الحار.

جدول رقم: (٣) : الاستجابات الفسيولوجية لدى الأطفال أثناء الجهد البدني في الجو الحار مقارنة مع الكبار^(١).

معدل الاستجابة مقارنة بالكبار	نوع الاستجابة
أعلى لدى الأطفال	إنتاج الحرارة
أقل لدى الأطفال	معدل التعرق (كل م ٢) من الجلد
أقل لدى الأطفال	معدل التعرق (كل غدة عرقية)
أعلى لدى الأطفال	عتبة التعرق (مستهل التعرق أو بدايته)
أقل لدى الأطفال	ناتج القلب لكل لتر (O)
أعلى لدى الأطفال	جريان الدم في الجلد
أقل لدى الأطفال	كلوريد الصوديوم في العرق
أعلى لدى الأطفال	حمض اللبنيك في العرق
أسرع لدى الأطفال	معدل ارتفاع درجة حرارة الجسم
أبطأ لدى الأطفال	التأقلم مع الجو الحار

(١) الهزاع ، هزاع محمد : مصدر سبق ذكره ، ٢٠٠٧ ، ص ٦ - ص ٧ .

٢- الدراسات السابقة

١- دراسة على مهدي هادي الجمالي ٢٠٠٩

عنوان الدراسة : وضع مؤشرات رقمية للسوائل المفقودة من خلال بعض المتغيرات الفسيولوجية في الدم باستخدام جهدين بدنيين باختلاف درجات الحرارة لدى لاعبي الكرة الطائرة.

-الأهداف :

يهدف البحث إلى التعرف على :-

١- وضع مؤشرات رقمية للسوائل المفقودة جراء استخدام جهدين بدنيين باختلاف درجات الحرارة لدى لاعبي الكرة الطائرة .

٢- أثر الجهدين البدنيين باختلاف درجات الحرارة على المعايير الفسيولوجية لدى لاعبي الكرة الطائرة.

٣- أثر مستوى السوائل المفقودة على المعايير الفسيولوجية والهرمونية في الدم لدى لاعبي الكرة الطائرة .

عينة البحث :

اختيرت عينة البحث بالطريقة العمدية من لاعبي نادي الدغارة الرياضي المشارك ضمن الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة والحاصل على نتائج متميزة على الصعيد المحلي والبالغ عددهم (١٢) لاعب ضمن صفوف النادي للكرة الطائرة.

الاستنتاجات :

١- نتيجة لتأثير الجهدين البدنيين وبدرجتي الحرارة أدى إلى فقدان جزء من السائل من البلازما والسوائل البينية بشكل عام وفي الجهد البدني والمهاري القصوي وبدرجة حرارة (٤٢ - ٤٨) بشكل خاص .

٢- حصول تغيرات فسيولوجية وهرمونية للمتغيرات المدروسة وذلك من خلال تعرض اللاعبين إلى الجهد القصوي دون القصوي وبدرجات الحرارة المختلفة .

- ٣- أن شدة الجهد البدني والمهاري القصوي ودون القصوي بدرجة حرارة (٤٢ - ٤٨) درجة أدى إلى ارتفاع في منسوب الهرمونات فيد الدراسة (الثيروكسين T_3 - T_4) وهرمون الكورتيزول .
- ٤- زيادة تركيز أملاح $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ بعد فقدان السوائل من البلازما بعد الجهد البدني لاسيما في درجة حرارة (٤٢ - ٤٨) درجة مئوية .
- ٥- زيادة تركيز الأسس الهيدروجيني (PH) في الدم بالاتجاه القاعدي خلال الجهد البدني القصوي .
- ٦- ظهور فرق في وزن اللاعب (أفراد العينة) قبل القيام بالجهد وبعد الجهد البدني والمهاري (قصوي ودون القصوي) بسبب التعرق .

٢-٢ دراسة بان سمير عباس (٢٠٠٣)

عنوان الدراسة : تأثير الأجواء الحارة والباردة على العمل الوظيفي للكليتين وبعض متغيرات الدم لممارسي ركض المسافات الطويلة " .

عينة البحث :

١٥ رياضي يمثلون عدائى المنتخب الوطنى بجري المسافات الطويلة للموسم التدربي (٢٠٠٢ - ٢٠٠٣) .

الخلاصة :

اجريت الدراسة للتعرف على تأثير الأجواء الحارة والباردة على العمل الوظيفي وبعض متغيرات الدم وكذلك للتعرف على الفروق في تأثير تلك الاجواء المناخية على متغيرات البحث المدروسة .

الاستنتاجات :-

١- إن العمل الانزيمي متغير في مختلف الاجواء المناخية الحارة والباردة بسبب الزيادة الحاصلة في متطلبات الطاقة للانزيمات العاملة وذلك بدلالة الزيادة الحاصلة في المستوى الطبيعي لنسبة انزيم فوسفات الكرياتين (CP) في اتجاه العمل العضلي .

٢- تزداد قدرة الجسم على المقاومة (المناعة) في مواجهة أي تأثير خارجي سواء كان بدنيا أو فيزيائيا أو مناخيا كارتفاع درجات حرارة الجو للمحافظة على الجسم صحيا وبدنيا من خلال الزيادة الحاصلة في نسبة متغير الكلوبين في الاجواء الحارة .

مناقشة الدراسات السابقة :

من العرض السابق لبعض الدراسات التي استعانت بها الباحثة نجد تشابه في الأهداف من حيث أثر السوائل المفقودة وكذلك الجهد البدني في الأجواء الحارة وكذلك اثرها على المعايير الفسلجية.

اما اوجه الاختلاف فقد امتازت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بالجوانب التالية :

- اجرت الباحثة في الدراسة الحالية ازمنة مختلفة لتعويض السوائل.
- امتازت الدراسة الحالية بدراسة متغيرات القلب (حجم الضربة- الناتج القلبي - معدل ضربات القلب- مؤشر الانقباض - كمية الدم المدفوعة) ، وكذلك متغير كمية السائل المستهلك ونسبة السائل المفقود ودرجة الحرارة والتغير في حجم بلازما الدم ونسبة الهيموكلوبين ،في حين اكتفت دراسة علي مهدي على دراسة المعايير الفسلجية والهرمونية بالدم ، ودراسة بن سمير عباس على العمل الوظيفي للكليتين .
- اجرت الباحثة دراستها على عينة من لاعبي منتخب محافظة القادسية للناشئين بكرة السلة ، في حين كانت عينة دراسة علي مهدي هم لاعبي نادي الدغارة المشارك ضمن الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة ، وكانوا عدائى المنتخب الوطنى بجري المسافات الطويلة في دراسة بن سمير عباس .
- كان المنهج المستخدم للدراسة الحالية تجريبى أما في دراسة علي مهدي فقد كان المنهج وصفي .
- استخدام الدراسة الحالية أجهزة حديثة مثل الفيزوفلوا لقياس متغيرات القلب خلال الجهد وقبله .
- استخدمت في الدراسة الحالية اكياس حفظ السوائل المبردة لغرض التعويض اثناء الجهد ولم تستخدم الدراستين ذلك .
- تم استخدام جهاز فحص الزوجة في مكان اجراء التجربة الرئيسية وليس في المختبر وهذا اختلف عن الدراسات السابقة .

الفصل الثالث

منهجية البحث واجراءاته الميدانية

٣ - منهجية البحث واجراءاته الميدانية

١-٣ منهج البحث

٢-٣ مجتمع وعينة البحث

٣-٣ وسائل جمع المعلومات والأجهزة المستخدمة:

١-٣-٣ أدوات البحث العلمي:

٢-٣-٣ وسائل جمع المعلومات والأجهزة المستخدمة

٤-٣ التجربة الاستطلاعية

٥-٣ الأسس العلمية للاختبار

١-٥-٣ الصدق :

٢-٥-٣ الثبات :

٦-٣ الاختبارات والقياسات المستخدمة

ثانياً: القياسات المستخدمة في البحث :

٧-٣ إجراءات البحث الميدانية

٧-٣ - ١ مواصفات السائل الذي سوف يتم التعويض فيه

٧-٣-٢ أسلوب تعويض السوائل

٨-٣ التجربة الرئيسة

٩-٣ الوسائل الإحصائية

الفصل الثالث

٣- منهجية البحث واجراءاته الميدانية

١-٣ منهج البحث

أستخدمت الباحثة المنهج التجريبي لملائمة طبيعة البحث وتحقيق أهدافه وحل مشكلته والمنهج

التجريبي

٢-٣ مجتمع وعينة البحث

حددت الباحثة مجتمع البحث وهم لاعبي منتخب محافظة القادسية للناشئين بكرة السلة والبالغ عددهم (١٢) لاعباً للموسم الرياضي ٢٠١٥-٢٠١٦ ولعدم التزام (٢) من اللاعبين باداء الفحوصات والقياسات المعملية بلغ العدد النهائي للعينة (١٠) لاعبين وتم التعامل معهم بأسلوب تدوير المجموعة الواحدة الذي تم فيه إداء الأسلوبين لتعويض السوائل الاولى المنتظم وفي وقت آخر الاسلوب العشوائي إذ تم استخدام الأسلوب العشوائي والمنتظم بشكل متعاقب في نفس اليوم ولفترة زمنية كحد ادنى ٥ دقائق عند تطبيق الجهد البدني إذ طبق لاعبين أحدهما منتظم والأخر عشوائي وبعد ذلك تم تدوير الاعبين في وقت لاحق بحيث خضع نفس اللاعب للأسلوبين(المنتظم والعشوائي) وكانت مواصفات العينة كما مبين في الجدول أدناه

جدول (٤) يبيّن توصيف العينة

المعالم الاحصائية	وزن/كم	حرارة/درجة	نسبة/%	مغرام	هيما كلوبين/	اض/H.R	S.V/الملتر	ا/لتر/CO
الوسط الحسابي	63.50	36.29	42.90	13.30	13.30	68.70	74.80	5.47
الوسيط	64.00	36.25	43.00	13.33	13.33	68.50	75.00	5.48
الانحراف المعياري	2.72	0.19	0.88	0.29	0.29	1.77	2.30	0.16
معامل الالتواء	0.08	0.18	0.22	0.24	-0.04	-0.31	-0.17	
اقل قيمة	60.00	36.00	42.00	13.00	66.00	71.00	71.00	5.20
اعلى قيمة	68.00	36.60	44.00	13.67	71.00	78.00		5.72

٣-٣ وسائل جمع المعلومات والاجهزة المستخدمة:

١-٣-٣ أدوات البحث العلمي:

- المقابلة : تم اجراء المقابلة مع الخبراء والمحترفين^(١) في المجال الرياضي ولعبه كره السلة ولذلك لأخذ آراءهم حول آلية تعويض السوائل وكذلك طريقة دراسة المتغيرات الفسيولوجية

٣-٣-٢ وسائل جمع المعلومات والاجهزة المستخدمة

قطن طبی -

- أنبوب شعري يحتوي على مادة مانعة للتخثر

میزان -

٣ - ساعت توقيت عدد

- جهاز السير المتحرك (أمريكي الصنع)

- اکیاس مدرجہ لحفظ السوائل

-جهاز الفيزو فلو لقياس متغيرات العضلة القلبية (فرنسي الصنع)

-جهاز ال PCV لقياس لزوجة الدم(صيني الصنع)

-محوار لقياس درجة حرارة الجسم

-محوار لقياس درجة حرارة الجو

-محوار لقياس درجة حرارة السائل

٤- التجربة الاستطلاعية

تم اجراء التجربة الاستطلاعية في يوم (الاحد) ٢٠١٦/٨/٧ الساعة (٣) عصراً في مختبر الفسلجة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة القادسية على لاعبي عينة البحث وذلك لمعرفة الوقت المستغرق لتنفيذ الاختبارات ولكي يتمكن كادر العمل المساعد من معرفة كيفية استخدام الاجهزة والادوات فضلاً عن تقسيم الواجبات عليهم، وكذلك التأكيد من سلامة الاجهزة والادوات المختبرية المستعملة.

❖ الغرض من التجربة

١- الوقوف على السلبيات التي يمكن أن تواجه الباحث في أجراء التجربة الرئيسية .

٢- التأكيد من الأجهزة والأدوات المستعملة ومدى صلاحيتها وكفاءتها.

٣- تحديد الوقت اللازم للتجربة ولأختبار كل لاعب

٤- معرفة مدى كفاءة فريق العمل المساعد ومدى قدرته على انجاز العمل.

النتائج التي تم التوصل إليها

١. تم الوقوف على جميع السلبيات والصعوبات التي يمكن أن تواجه الباحثة في التجربة الرئيسية.

٢. تم التأكيد من سلامة وفحص الأجهزة والأدوات المستخدمة في التجربة.

٣. تم تحديد الوقت اللازم لأجراء التجربة ولأختبار كل لاعب والذي حدد بعدد لاعبين (٢) في كل يوم أحدهم بالاسلوب المنظم وألاخر العشوائي.

٤. تم تحديد الكادر المساعد وتم توزيع المهام بينهم بحسب العمل.

٣_٥ الأسس العلمية للاختبار

٣-٥-١ الصدق :

"يعني الاختبار الذي، يقيس ما وضع الاختبار من أجل قياسه"^(١) فقد حصلت الاختبارات المستخدمة في البحث على نسبة اتفاق بلغت ١٠٠% من آراء الخبراء التي تم عرضها عليهم للتأكد من الصدق.

٣_٥-٢ الثبات :

تم اجراء الاختبار على عينه قدرها (١٤) لاعب يمثلون منتخب تربية محافظة الديوانية بكرة السلة للمرحلة المتوسطة في يوم ٢٠١٦ / ٨ / ٧ وقد استمر الاختبار ٤ ايام بواقع (٣_٤) لأعوامن لكل يوم وقد استخدمت الباحثة طريقه التجزئة النصفية لاستخراج معامل الثبات وتم قياس معدل ضربات القلب بعد الجهد مباشرة وبعدها تجزئه البيانات حسب الارقام الزوجية والفردية وقد استخدم معامل الارتباط البسيط بيرسون وقد بلغ قيمة الارتباط (٠،٨٨) وهذا يعني أن الثبات عالي في اختبار (FTT).

٣-٦ الاختبارات والقياسات المستخدمة

أولاً: الاختبارات المستخدمة :

- تم عرض الاختبار على السادة الخبراء لمعرفة آرائهم ولمعرفة مدى ملائمة الاختبار لأفراد العينة وطبيعة العينة

- في دراسة Tim taken على نفس الاختبار تم استخراج الصدق وقد بلغ ٠٠٧٥ .

^(١) ذوقان عبيدات ، عبد الرحمن : البحث العلمي - مفهومه - أدواته - أساليبه ، دار الفكر العربي ، عمان ، ط ٤ ، ١٩٨٩ ص ١٥٩ .

جدول (٥) يبين تفاصيل بروتوكول Fit kids tread mill test^(١)

المراحل	السرعة كم	السرعة ميل	زاوية الميل %	زمن كل مرحلة
الاحماء ٩٠ ثانية	3.5	2.19	0	٩٠ ثانية
	3.5	2.19	1	
	4	2.40	3	
	4.5	2.70	5	
	5	3.13	7	
	5.5	3.40	9	
	6	3.70	11	
	6.5	4.00	13	
	7	4.30	15	
	7.5	4.60	15	
ملاحظة المرحلة الاخيرة بعدها يستمر العمل حتى الانتهاء (استنفاد الجهد)				

هذا الاختبار معتمد في جامعة بتركيا محدد للاعمر الصغيرة (Fit kids tread mill test) إذ يتكون البروتوكول من مجموعة مراحل كل مرحلة يتم فيها زيادة السرعة وزاوية الميل بعد اجراء الاحماء لمدة ٩٠ ثانية على الجهاز الذي تسبقه فترة كافية للأحماء قبل بدء الاختبار وكما مبين في الجدول أدناه إذ لا تتم زيادة السرعة وزاوية الميل بعد المرحلة (٩) والتي يستقر فيها اللاعب بالاداء حتى استنفاد الجهد والتوقف عن العمل.


ثانياً: القياسات المستخدمة في البحث :

قياس مؤشرات العضلة القلبية خلال الراحة والجهد باستخدام جهاز Physioflow


يعمل جهاز Physioflow على تسجيل متغيرات القلب للاعبين أثناء الجهد البدني، ويعمل هذا الجهاز وفقاً لنظام إرسال المعلومات بطريقة Bluetooth للحاسبة المرتبطة معها جهاز—the وقبل تشغيل الجهاز لابد من تثبيت الألكترودات في الاماكن التشريحية الصحيحة والمحددة من قلب الشركة المصنعة وكما مبينه تفاصيلها في الشكل (٥) . وعند أحكام الربط يبدأ تشغيل الجهاز بعد تثبيته على جذع اللاعب باحكام باستخدام حزام خاص بذلك ، وتعتبر الخطوات الاولى والأكثر أهمية هو التأكد من أن الاشارة جيدة و ما يؤكّد ذلك هو وجود اللون الاخضر اما اذا كان اللون احمر فهذا يعني ان الاشارة سيئة وبعد هذه الخطوة يتم تسجيل البيانات المطلوبة عن اللاعب التي تشمل (الاسم ، العمر ، الطول سم ، الوزن كغم ، الجنس ، تاريخ الاختبار ، رقم سري للاعب)، وبعد ادخال تلك البيانات

(1) ELLES M. W. KOTTE1: et al. (2015) **Validity and Reproducibility of a New Treadmill Protocol: The Fitkids Treadmill Test**. 2University of Applied Sciences, Utrecht, THE NETHERLANDS;3Child Development and Exercise Center .

يتم معايرة الجهاز وذلك من خلال الشروع في قياس ضغط الدم (الانقباضي ، الانبساطي) وذلك باستخدام جهاز ضغط الدم اليدوي أو الأوتوماتيكي ، من أجل الحصول على قيم ضغط الدم (لأنها تستخدم على أنها إشارة لحساب ناتج القلب) وبإمكان الشخص القيام على الاختبار بمعايرة الجهاز عندما تكون فترة العمل طويلة بتجديد القيم الخاصة بضغط الدم بغية الحصول على نتائج أكثر دقة لأن اختلاف الضغط سيغير من النتائج المستحصلة من الجهاز وبعد الانتهاء من إجراء الفحص يمكن حزن جميع البيانات التي تتضمن قيم جميع المتغيرات المراد دراستها وكذلك الفترة الزمنية مقربة لأجزاء الثانية. والجهاز يعطي قياساً لمتغيرات العضلة القلبية خلال الجهد البدني ويعرضها على واجهة البرنامج في شاشة الحاسبة ومن ثم تخزن على أكثر من صيغة منها الاكسل .



الشكل (٥) يوضح جهاز فيزو فهو لقياس مؤشرات العضلة القلبية بتقنية (Bluetooth)



الشكل (٦) يوضح واجهة برنامج الفيزوفلو على شاشة الحاسبة خلال الراحة والجهد البدني

مواصفات جهاز السير المتحرك

١. الشركة المصنعة : إمريكية

٢. الأبعاد : الطول ٣ م ، عرض حزام الركض ٩٠ سم

٣. السرعة ٤ كم / ساعة ، زاوية الميل ٢٥ %

جهاز السير المتحرك والمبين تفاصيله أعلاه مُصنع لأغراض البحث العلمي و يؤدي فيه المختبر الجهد البدني المطلوب بشكل مريح ودقيق من حيث المحافظة على سرعة الاداء طول فترة الاختبار وكذلك زاوية الميل الذي يتمكن العقل الالكتروني من تحديدها وفقاً لزاوية الميل مع الأرض وهي أحدى العوامل الرئيسية لضمان اداء الجهد البدني بشكل أكثر دقة.



الشكل (٧) يوضح جهاز السير المتحرك المستخدم في اداء الجهد البدني

❖ تحديد السائل المستهلك:

قبل الشروع بإداء الجهد البدني سواء كان للاسلوب المنتظم أم العشوائي للتعويض يتم مليء الاكياس المخصصة لحفظ السوائل والمدرجة بوحدة قياس اللتر وأجزاءه ويتم تسجيل الكمية قبل البدء وبعد الانتهاء يتم تسجيل الكمية المتبقية من الماء في الاكياس المدرجة. الفرق بين الكميتين يمثل نسبة السائل الذي تم استهلاكه خلال الجهد البدني وفقاً للاسلوب التعويض المستخدمة ويقاس بوحدة اللتر وأجزاءه

السائل المستهلك والكمية في الاكياس قبل بدء الجهد - الكمية في الاكياس بعد الجهد البدني

❖ تحديد السائل المفقود من الجسم

قبل الشروع في إداء الجهد البدني يتم قياس وزن اللاعب بوحدة قياس كغم وأجزاءه وهو بالشورت القصير فقط دون التجهيزات الرياضية الأخرى، وبعد الانتهاء من الاختبار مباشرة يتم نفس الفحص السابق ويتم تسجيل الفرق في الوزن قبل الجهد وبعده ويتم حساب نسبة السائل المفقود عن طريق نسبة المفقود من وزن اللاعب وكما يلي:

$$\text{نسبة السائل المفقود} = \frac{\text{الوزن بعد الجهد}}{\text{الوزن قبل الجهد}} * 100 \%$$

قياس لزوجة الدم ومقدار التغير في حجم البلازمما:

يتم قياس النسبة المئوية للزوجة الدم (PCV) وذلك من خلالأخذ عينة من الدم الشعيري من أحد أصابع اللاعب التي توضع في أنبوبة شعرية تحتوي على مادة EDTA مانع التخثر ويتم وضع العينة في جهاز قياس لزوجة الدم الذي يعمل وفقاً للتوقيت الآوتوماتيكي إذ يتطلب هذا الأجراء زمن قدره (٥) دقائق بعد ذلك تنفصل مكونات عينة الدم إلى قسمين تتجمع البلازمما في الأعلى بينما تكون الخلايا في الأسفل وبسرعة ١٠٠٠٠ دورة بالدقيقة بعد ذلك تنفصل مكونات عينة الدم إلى البلازمما للأعلى والخلايا للأسفل وتم هذا الإجراء قبل وبعد الجهد البدني في مكان اجراء التجربة ليعطي دقة عالية للنتائج. ويتم قياس التغير في حجم البلازمما من خلال الخطوات التالية.

- ❖ التغير في حجم الدم = $(\text{حجم الدم بعد} - \text{حجم الدم قبل}) / \text{حجم الدم قبل}$
- ❖ التغير في حجم الكريية = $(\text{حجم الكريية بعد} - \text{حجم الكريية قبل}) / \text{حجم الكريية قبل}$
- ❖ التغير في حجم البلازمما = $100 - (\text{حجم البلازمما بعد} - \text{حجم البلازمما قبل}) / \text{حجم البلازمما قبل}$
- ❖ حجم الدم = حجم الدم قبل (الهموكلوبين قبل/الهموكلوبين بعد)
- ❖ حجم الكريية بعد = حجم الدم بعد (الهيماتوكريت بعد)
- ❖ حجم الكريية قبل = حجم الدم قبل (الهيماتوكريت قبل)
- ❖ حجم البلازمما بعد = حجم الكريية بعد - حجم البلازمما قبل = حجم الدم قبل - حجم الكريية قبل



شكل رقم (٨) يوضح قياس pcv لزوجة الدم

❖ قياس هيموكلوبين الدم H.B:

وبعد أن يتم قياس لزوجة الدم سواء كان قبل الجهد أو بعده يتم التعامل مع النتيجة المستخدمة وفقاً للالمعادلة الآتية:

$$\text{الهيموكلوبين (ملغرام)} = \text{لزوجة الدم} / 1 - 3$$

فإذا كانت الزوجة لأحد أفراد العينة قبل الجهد ٤% فهذا يعني أن الهيموكلوبين يبلغ الآتي:

$$\text{الهيموكلوبين} = 1 - 3 / 4 = 13.66 \text{ ملغرام/مليتر دم}$$

❖ قياس درجة حرارة الجسم ودرجة الحرارة المختبر

تم قياس درجة حرارة الجسم لكل لاعب قبل الجهد البدني وبعد الجهد بواسطة محرار الكتروني وتم قياس الحرارة من منطقة (الأبط) حيث يتم تصفير المحرار ووضعه على المنطقة ويبدأ بالقراءة ومن خلال إشارة صوتية يطلقها الجهاز نستدل على الدرجة

أما قياس درجة حرارة المختبر من خلال مقياس معلق يقيس درجة حرارة الجو داخل المختبر ويقيس الرطوبة

٧-٣ اجراءات البحث الميدانية

١-٧-٣ مواصفات السائل الذي سوف يتم التعويض فيه

تم اعتماد عملية التعويض خلال الجهد البدني من خلال وضع (الماء) فقط مضافاً له نكهة الغرض منها اعطاء مذاقاً حلو بنسبة قليلة جداً لغرض زيادة الرغبة في تناول السوائل فضلاً عن ذلك تم تحديد درجة حرارة السائل من خلال قياس درجته باستخدام محرار خاص لقياس درجة حرارة السائل وسوف تكون حرارة السائل هي (١٧) درجة.



شكل (٩) يوضح آلية قياس حرارة السائل باستخدام الكتروني خاص

٢-٧-٣ اسلوب تعويض السوائل

- ❖ اسلوب التعويض المنتظم: يعتمد هذا الاسلوب على تعويض السوائل للاعب بشكل منتظم إذ يجب على اللاعب شرب السوائل بالوقت المحدد وهو كل ٧ دقائق بالكمية التي يحددها اللاعب.
- ❖ اسلوب التعويض العشوائي: يعني ان اللاعب غير ملزم بوقت محدد لشرب السوائل وأنما حسب رغبته وفي الوقت والكمية التي يحتاجها خلال الجهد والتي تتم بانسيابية عالية.



الشكل (١٠) يوضح اسلوب التعويض للسوائل خلال الجهد البدني على جهاز السير المتحرك


٨-٣ التجربة الرئيسية :

قامت الباحثة بأجراء التجربة الرئيسية في يوم (الاثنين) بتاريخ (٢٠١٦/٨/١٥) ولغاية يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٨/٢٩ وبواقع ٢ لاعب في كل يوم في تمام الساعة (٣) خلال الأيام التي ارتفعت فيها درجة حرارة الاجواء في العراق لتتراوح بين (٤٥-٤٠) درجة مئوية وذلك بحضور عينة البحث البالغ عددهم (١٠) لاعبين تتراوح اعمارهم (١٥-١٧) سنة حيث تم تجهيز الأدوات والأجهزة المختبرية وتحضير الأدوات اللازمة للتجربة وكان زمن التجربة الرئيسية كاملة (٣) ساعات.

و تم وزن كل لاعب بالميزان العادي وتسجيل وزنه وقياس درجة حرارة الجسم بواسطة محوار خاص للجسم وتسجيل درجة الحرارة قياس المتغيرات القلبية من خلال جهاز (الفيوفلو) (حجم الضربة - معدل ضربات القلب بالدقيقة - الناتج القلبي - كمية الدم المدفوعة % - مؤشر انقباض القلب - عمل الجانب اليسير للقلب) سجلت هذه المتغيرات لكل لاعب على حدة وبعد ذلك تم تثبيت الكيس الدرج المملوء بالسائل في جهاز السير المتحرك كما تم قياس لزوجة الدم وحجم التغيير في بلازما الدم والهيموكلوبين من خلال اخذ عينة دم لكل لاعب قبل الجهد (دم شعيري) ويوضع في جهاز الـPCV حيث يعمل الجهاز بشكل اوتوماتيكي بوقت (٥) دقائق وبسرعة دوران (١٠٠٠) دورة/دقيقة وبعد انتهاء عمل الجهاز نأخذ عينة الدم بعد ان تم فصل البلازما للأعلى وخلايا الدم للأسفل وتوضع على مسطرة مدرجة خاصة حيث يتم قياس النسبة المئوية ل الزوجة وكذلك قياس الدم من خلال معادلة خاصة وكذلك قياس مقدار التغيير في حجم بلازما الدم من خلال عدة H.B

معادلات مذكورة سابقاً وهذه الاجراءات كل تنفذ قبل الجهد وبعد ذلك يصعد اللاعب على جهاز الجري بعد أن يثبت بالجهاز كيس مدرج لحفظ السائل ويكون السائل بدرجة حرارة (١٧) ويكون هذا الكيس مدرج بوحدة التر و يوجد به ناقل يتم من خلاله سحب السائل لللاعب ويتم استخدام الاسلوب الاول (الاسلوب المنتظم) وهو أن اللاعب خلال الجهد وأنباء الركض سيقوم كل (١٠) دقائق بشرب السائل بأي كمية كانت وبشكل منتظم ويطبق هذا الأسلوب على كل العينة ثم تطبق هذه الأجراءات ذاتها ولكن بأسلوب عشوائي الذي يتتيح لكل لاعب عدم الانتظام في تناول السائل وأنما حسب رغبة اللاعب للماء او شعوره بالعطش سواء بكمية السائل او بالوقت حيث تتم حسب رغبة اللاعب وتم قياس درجة حرارة المختبر من خلال مقياس درجة حرارة الجو وقياس نسبة الرطوبة.

علماً أن طبيعة الجهد البدني المنفذ تحمل مقارب للجهد البدني المبذول في لعبة كرة السلة.



الشكل (١١) يوضح تفاصيل اجراء التجربة الرئيسية والمتغيرات المدروسة في يوم الاختبار سواء بالاسلوب العشوائي او المنتظم قبل وخلال وبعد الجهد البدني

٩- الوسائل الاحصائية :

استخدمت الباحثة الحقيقة الإحصائية spss ومنها تم استخراج الآتي :

١. الوسط الحسابي

٢. الانحراف المعياري

٣. T للعينات المترابطة

٤. T للعينات المستقلة

٥. النسبة المئوية .

٦. معامل الارتباط البسيط بيرسون

الفصل الرابع

عرض النتائج ومناقشتها

٤-١ عرض النتائج

٤-١-١ عرض نتائج

مناقشة النتائج :

٤-١-١-١ مناقشة نتائج قيم T ودالة الفروق لمتغيرات (الوزن ، درجة الحرارة ، لزوجة الدم ، الهيموكلوبين) قبل الجهد وبعده لأسلوب التعويض المنتظم والعشوائي

٤-١-٢-١ مناقشة نتائج قيم T ودالة الفروق لمتغيرات (بداية التعرق ، الوزن ، نسبة الوزن المفقود ، كمية السائل المستهلك ، درجة الحرارة) بين الأسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي

٤-١-٣-١ مناقشة نتائج قيم T ودالة الفروق لمتغيرات (لزوجة الدم ، الهيموكلوبين ، التغيير في حجم بلازما الدم ، زمن الجهد المنفذ) بين الأسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي

٤-١-٤-١ مناقشة نتائج قيم T ودالة الفروق لمتغيرات العضلة القلبية خلال الراحة والجهد للأسلوب المنتظم والأسلوب العشوائي

٤-١-٥-١ مناقشة نتائج قيم T ودالة الفروق لمتغيرات العضلة القلبية خلال الجهد بين الأسلوبين المنتظم و العشوائي

٤-١ عرض النتائج ومناقشتها

٤-١-٤ عرض نتائج

جدول (٦) يبين قيمة T ودالة الفروق لمتغيرات (الوزن ، درجة الحرارة ، لزوجة الدم ، الهيموكلوبين) قبل الجهد وبعده لأسلوب التعويض المنتظم والعشوائي

الدالة	درجة الحرية	T	الانحراف المعياري	العدد	الوسط الحسابي	القياسات	اسلوب تعويض السوائل
.003	9.000	4.025	2.71825	10	63.5000	الوزن قبل الجهد/كغم	الاسلوب المنتظم
			2.85044	10	63.0500	الوزن بعد الجهد/كغم	
.000	9.000	-22.333	.18529	10	36.2900	الحرارة قبل الجهد/درجة	الاسلوب المنتظم
			.20111	10	36.9600	الحرارة بعد الجهد/درجة	
.615	9.000	-.521	.87560	10	42.9000	لزوجة الدم قبل %/الجهد	الاسلوب العشوائي
			.70079	10	43.0000	لزوجة الدم بعد الجهد	
.607	9.000	-.533	.29314	10	13.3000	الهيموكلوبين قبل الجهد	الاسلوب العشوائي
			.23372	10	13.3340	الهيموكلوبين بعد الجهد	
.000	9.000	13.967	2.71825	10	63.5000	الوزن قبل الجهد/كغم	الاسلوب العشوائي
			2.70697	10	61.7900	الوزن بعد الجهد/كغم	
.000	9.000	-14.972	.12693	10	36.2500	الحرارة قبل الجهد/درجة	الاسلوب العشوائي
			.22211	10	37.5600	الحرارة بعد الجهد/درجة	
.000	9.000	-48.336	.87560	10	42.9000	لزوجة الدم قبل الجهد	الاسلوب العشوائي
			.83460	10	45.9100	لزوجة الدم بعد الجهد	
.000	9.000	-47.364	.29314	10	13.3000	الهيموكلوبين قبل الجهد	الاسلوب العشوائي
			.27794	10	14.3040	الهيموكلوبين بعد الجهد	

يبين الجدول (٤) قيمة T ودالة الفروق لمتغيرات (الوزن-درجة الحرارة-لزوجة الدم-الهيموكلوبين) قبل الجهد وبعده لأسلوب التعويض المنتظم والعشوائي إذ يظهر الوسط الحسابي لمتغير الوزن قبل الجهد (٦٣.٥٠) كغم وبانحراف معياري (٢٠.٧١) كغم ، أما بالنسبة للوزن بعد الجهد فقد

بلغ الوسط الحسابي (٦٣٠٥) كغم وبانحراف معياري (٢٠.٨٥) كغم ، وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٤٠٠٢) وبمستوى دلالة (٠٠٠٣) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس البعدي.

كما يبين الجدول متغير درجة الحرارة إذ يظهر الوسط الحسابي لمتغير الحرارة قبل الجهد (٣٦.٢٩) درجة وبانحراف معياري (٠٠.١٨٥)، اما بالنسبة للحرارة بعد الجهد فقد بلغ الوسط الحسابي (٣٦.٩٦) درجة وبانحراف معياري (٠٠.٢٠١١)، وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٢٢.٣٣) وبمستوى دلالة (٠٠٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس القبلي.

اما بالنسبة لمتغير لزوجة الدم فيظهر الوسط الحسابي له قبل الجهد (٤٢.٩٠) % وبانحراف معياري (٠٠.٨٧٥) ، وبعد الجهد فقد بلغ الوسط الحسابي (٤٣٠٠) % وبانحراف معياري (٠٠.٧٠٠) %، وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٠٠.٥٢١) % وبمستوى دلالة (٠٠.٦١٥) وهذا يعني لا يوجد فرق معنوي.

اما متغير الهيموكلوبين فيظهر الوسط الحسابي له قبل الجهد (١٣.٣٠٠) ملغرام وبانحراف معياري (٠٠.٢٩٣)، أما بالنسبة للهيموكلوبين بعد الجهد فقد ظهر الوسط الحسابي له (١٣.٣٣) ملغرام وبانحراف معياري (٠٠.٢٣٣) ملغرام، وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٠٠.٥٣٣) % ملغرام وبمستوى دلالة (٠٠.٦٠٧) وهذا يعني لا يوجد فرق معنوي وهذه القيم كانت للأسلوب المنتظم.

اما الاسلوب العشوائي فقد ظهر الوسط الحسابي للوزن قبل الجهد (٦٣.٥٠٠) كغم وبانحراف معياري (٢.٧١) كغم أما بالنسبة للوزن بعد الجهد فقد ظهر الوسط الحسابي له (٦١.٧٩) كغم وبانحراف معياري (٢.٧٠) كغم، وقد بلغت قيمة T المحسوبة (١٣.٩٦) وبمستوى دلالة (٠٠٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس البعدي.

وقد ظهر الوسط الحسابي للحرارة قبل الجهد (٣٦.٢٥) درجة وبانحراف معياري (٠٠.١٢٦) درجة أما بعد الجهد فقد كان الوسط الحسابي لها (٣٧.٥٦) درجة وبانحراف معياري (٠٠.٢٢) درجة وقد بلغت قيمة T المحسوبة (١٤.٩٧) درجة وبمستوى دلالة (٠٠٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس القبلي.

اما بالنسبة لمتغير الزوجة فقد كان الوسط الحسابي له قبل الجهد (٤٢.٩٠) % وبانحراف معياري (٠٠.٨٧٥) % اما بعد الجهد فقد ظهر الوسط الحسابي (٤٥.٩١) % وبانحراف معياري (٠٠.٨٣٤) % وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٤٨.٣٣) % وبمستوى دلالة (٠٠٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس القبلي.

الفصل الرابع - عرض النتائج ومناقشتها

٥٣

أما بالنسبة لمتغير الهيموكلوبين فقد كان الوسط الحسابي له قبل الجهد (١٣.٣) ملغرام وبانحراف معياري (٠٠.٢٩) ملغرام أما بعد الجهد فقد ظهر الوسط الحسابي له (١٤.٣٠) ملغرام وبانحراف معياري (٠٠.٢٧٧) ملغرام وقد بلغت قيمة T المحسوبة (-٤٧.٣) ملغرام وبمستوى دلالة (٠٠٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القباس القلب.

جدول (٧)

يبين قيمة T ودلالة الفروق للمتغيرات (بداية التعرق ، الوزن ، نسبة الوزن المفقود ، كمية السائل المستهلك ، درجة الحرارة) بين الاسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي

الدلة	درجة الحرية	T	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	N	اسلوب تعويض السائل	المتغيرات
0.78	18.00	-0.28	1.42	12.70	10.00	الاسلوب المنتظم	بداية التعرق/دقيقة
			1.73	12.90	10.00	الاسلوب العشوائي	
1.00	18.00	0.00	2.72	63.50	10.00	الاسلوب المنتظم	الوزن قبل الجهد/كغم
			2.72	63.50	10.00	الاسلوب العشوائي	
0.32	18.00	1.01	2.85	63.05	10.00	الاسلوب المنتظم	الوزن بعد الجهد/كغم
			2.71	61.79	10.00	الاسلوب العشوائي	
0.00	18.00	7.44	0.58	-0.72	10.00	الاسلوب المنتظم	نسبة الوزن المفقود/%
			0.61	-2.70	10.00	الاسلوب العشوائي	
0.00	18.00	15.51	0.27	1.76	10.00	الاسلوب المنتظم	كمية السائل المستهلك/لتر
			0.11	0.33	10.00	الاسلوب العشوائي	
0.58	18.00	0.56	0.19	36.29	10.00	الاسلوب المنتظم	درجة الحرارة قبل الجهد/درجة
			0.13	36.25	10.00	الاسلوب العشوائي	
0.00	18.00	-6.33	0.20	36.96	10.00	الاسلوب المنتظم	درجة الحرارة بعد الجهد/درجة
			0.22	37.56	10.00	الاسلوب العشوائي	

أما الجدول رقم (٥) الذي يبين قيمة T ودلالة الفروق للمتغيرات (بداية التعرق - الوزن - نسبة الوزن المفقود - كمية السائل المستهلك - درجة الحرارة) بين الاسلوبين التعويض المنتظم

والعشوائي إذ يظهر الوسط الحسابي لبداية التعرق في الأسلوب المنتظم (١٢٠.٧٠) د وبانحراف معياري (١٠.٤٢) د أما بداية التعرق بالأسلوب العشوائي فقد ظهر الوسط الحسابي (١٢٠.٩٠) د وبانحراف معياري (١٠.٤٢) د وقد بلغت قيمة T المحسوبة (-٠٠٢٨) د وبمستوى دلالة (٠.٧٨) وهذا يعني لا يوجد فرق معنوي.

اما بالنسبة للوزن قبل الجهد وبالأسلوب المنتظم فقد ظهر الوسط الحسابي له (٦٣.٥٠) كغم وبانحراف معياري (٢٠.٧٢) كغم أما قبل الجهد بالأسلوب العشوائي فقد ظهر الوسط الحسابي له (٦٣.٥٠) كغم وبانحراف معياري (٢٠.٧٢) كغم وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٠٠٠٠) كغم وبمستوى دلالة (١٠٠) وهذا يعني لا يوجد فرق معنوي.

وكان الوسط الحسابي للوزن بعد الجهد بالأسلوب المنتظم هو (٦٣.٥٠) كغم وبانحراف معياري (٢٠.٨٥) كغم أما بالنسبة بعد الجهد بالأسلوب العشوائي فقد ظهر الوسط الحسابي له (٦١.٧٩) كغم وبانحراف معياري (٢٠.٧١) كغم وقد بلغت قيمة T المحسوبة (١٠٠١) وبمستوى دلالة (٠.٣٢) وهذا يعني لا يوجد فرق معنوي.

وكان الوسط الحسابي لنسبة الوزن المفقود بالأسلوب المنتظم (-٠٠٧٢) كغم وبانحراف معياري (٠٠.٥٨) كغم اما بالنسبة للوزن المفقود بالأسلوب العشوائي فقد ظهر الوسط الحسابي له (-٢٠.٧٠) كغم وبانحراف معياري (٠٠.٦١) كغم وقد بلغت قيمة T المحسوبة (-٧٠٤٤) وبمستوى دلالة (٠٠٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح الأسلوب العشوائي.

وكان الوسط الحسابي لكمية السائل المستهلكة بالأسلوب المنتظم (١٠.٧٦) لتر وبانحراف معياري (٠٠.٢٧) لتر اما لكمية السائل المستهلكة بالأسلوب العشوائي فقد ظهر الوسط الحسابي (٠٠.٣٣) لتر وبانحراف معياري (٠٠.١١) لتر وقد بلغت قيمة T المحسوبة (١٥.٥١) لتر وبمستوى دلالة (٠٠٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح الأسلوب المنتظم.

وقد ظهر الوسط الحسابي لدرجة الحرارة قبل الجهد بالأسلوب المنتظم (٣٦.٢٩) درجة وبانحراف معياري (٠٠.١٩) درجة اما بالنسبة لدرجة الحرارة قبل الجهد بالأسلوب العشوائي كان الوسط الحسابي لها (٣٦.٢٥) درجة وبانحراف معياري (٠٠.١٣) درجة وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٠٠.٥٦) وبمستوى دلالة (٠٠.٥٨) وهذا يعني لا يوجد فرق معنوي.

اما بالنسبة لدرجة الحرارة بعد الجهد بالأسلوب المنتظم فقد ظهر الوسط الحسابي لها (٣٦.٩٦) درجة وبانحراف معياري (٠٠.٢٠) درجة اما بعد الجهد بالأسلوب العشوائي فقد ظهر الوسط

الحسابي (٣٧.٥٦) درجة وبانحراف معياري (٠٠٢٢) درجة وقد بلغت قيمة T المحسوبة (-٦.٣٣) درجة وبمستوى دلالة (٠٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح الاسلوب المنتظم.

جدول (٨)

يبين قيمة T ودلالة الفروق للمتغيرات (زوجة الدم ، الهيموكلوبين ، التغيير في حجم بلازما الدم ، زمن الجهد المنفذ) بين الاسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي

الدلاله	درجة الحرية	T	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	N	اسلوب تعويض السوائل	المتغيرات
0.00	18.00	-8.44	0.70	43.00	10.00	اسلوب المنتظم	زوجة الدم
			0.83	45.91	10.00	اسلوب العشوائي	بعد الجهد
0.00	18.00	-8.45	0.23	13.33	10.00	اسلوب المنتظم	الهيموكلوبين
			0.28	14.30	10.00	اسلوب العشوائي	بعد الجهد
0.00	18.00	9.46	3.28	-1.86	10.00	اسلوب المنتظم	التغيير في حجم البلازما
			0.79	-11.95	10.00	اسلوب العشوائي	
0.00	18.00	3.62	1.23	53.93	10.00	اسلوب المنتظم	زمن الجهد
			1.50	51.71	10.00	اسلوب العشوائي	المنفذ

وقد بين جدول رقم (٦) قيمة T ودلالة الفروق للمتغيرات (زوجة الدم-الهيموكلوبين-التغيير في حجم بلازما الدم- زمن الجهد المنفذ) بين الاسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي.

أما بالنسبة لزوجة الدم بعد الجهد بالاسلوب المنتظم فقد ظهر الوسط الحسابي (٤٣.٠٠)% وبانحراف معياري (٠٠٧٠) أما بعد الجهد بالاسلوب العشوائي فقد كان الوسط الحسابي له (٤٥.٩١)% وبانحراف معياري (٠٠٨٣)% وقد بلغت قيمة T المحسوبة (-٨.٤٤) وبمستوى دلالة (٠٠٠) وهذا يعني يوجد فرق معنوي ولصالح الاسلوب المنتظم.

أما بالنسبة للهيموكلوبين بعد الجهد بالاسلوب المنتظم فقد ظهر الوسط الحسابي (١٣.٣٣) ملغرام وبانحراف معياري (٠٠٢٣) ملغرام أما بعد الجهد بالاسلوب العشوائي ظهر الوسط الحسابي (١٤.٣٠) ملغرام وبانحراف معياري (٠٠٢٨) ملغرام وقد بلغت قيمة T المحسوبة (-٨.٤٥) ملغرام وبمستوى دلالة (٠٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح الاسلوب المنتظم.

وقد ظهر الوسط الحسابي للتغير في حجم البلازمما بالأسلوب المنتظم (١٠.٨٦) % وبانحراف معياري (٣٠.٢٨) أما بالنسبة للتغير في حجم البلازمما بالأسلوب العشوائي فقد ظهر الوسط الحسابي (١١.٩٥) % وبانحراف معياري (٠.٧٩) % وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٩.٤٦) % وبمستوى دلالة (٠.٠٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصلاح الاسلوب المنتظم.

وكان الوسط الحسابي لزمن الجهد المنفذ بالأسلوب المنتظم فقد كان الوسط الحسابي (٥٣.٩٣) د وبانحراف معياري (١٠.٢٣) د وكان الوسط الحسابي لزمن الجهد المنفذ بالأسلوب العشوائي (٥١.٧١) د وبانحراف معياري (١٠.٥٠) د وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٣.٦٢) د وبمستوى دلالة (٠.٠٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصلاح الاسلوب المنتظم.

جدول (٩)

يبين قيمة T ودلالة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خلال الراحة والجهد للأسلوب المنتظم

الدلالة	درجة الحرية	T	الانحراف المعياري	العدد	الوسط الحسابي	القياسات	المتغيرات
0.00	9.00	69.29	1.77	10.00	68.70	قبل الجهد	ض/د/HR
			3.44	10.00	169.40	بعد الجهد	
0.00	9.00	67.14	2.30	10.00	74.80	قبل الجهد	مليتر/SV
			1.93	10.00	122.80	بعد الجهد	
0.00	9.00	79.93	0.16	10.00	5.47	قبل الجهد	لتر/د/COP
			0.56	10.00	21.02	بعد الجهد	
0.00	9.00	81.76	0.09	10.00	2.94	قبل الجهد	لتر/م ^٣ /CI
			0.31	10.00	11.30	بعد الجهد	
0.46	9.00	0.78	2.37	10.00	75.40	قبل الجهد	%/EF
			4.51	10.00	74.10	بعد الجهد	

وبين جدول رقم (٧) قيمة T ودلالة الفروق لمتغيرات العضلة القلبية خلال الراحة والجهد للأسلوب المنتظم ، حيث ظهر الوسط الحسابي للمتغير HR قبل الجهد قبل الجهد (٦٨.٧٠) ض/د وبانحراف معياري (١٠.٧٧) ض/د أما HR بعد الجهد فكان الوسط الحسابي له (١٦٩.٤٠) ض/د وبانحراف معياري (٣٠.٤٤) ض/د وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٦٩.٢٩) ض/د وبمستوى دلالة

(٤٠٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس القبلي أما متغير SV قبل الجهد ظهر الوسط الحسابي له (٧٤.٨٠) مل/د وبانحراف معياري (٢٠.٣٠) مل/د وكان الوسط الحسابي SV بعد الجهد (١٢٢.٨٠) مل/د وبانحراف معياري (١٠.٩٣) مل/د وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٦٧.١٤) مل/د وبمستوى دلالة (٤٠٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس البعدي.

وبلغ الوسط الحسابي للمتغير COP قبل الجهد (٥٠.٤٧) لتر/د وبانحراف معياري (٠٠.١٦) لتر/د أما بالنسبة للـ COP بعد الجهد فقد ظهر الوسط الحسابي له (٢١٠.٢) لتر/د وبانحراف معياري (٠٠.٥٦) لتر/د وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٧٩.٩٣) لتر/د وبمستوى دلالة (٤٠٠٠) لتر/د وهذا يعني يوجد فرق معنوي ولصالح القياس البعدي ، أما بالنسبة لمتغير CI قبل الجهد فقد ظهر الوسط الحسابي له (٢٠.٩٤) لتر/م وبانحراف معياري (٠٠.٠٩) لتر/م أما متغير CL بعد الجهد كان الوسط الحسابي له (١١٠.٣٠) لتر/م وبانحراف معياري (٠٠.٣١) لتر/م وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٨١.٧٦) لتر/م وبمستوى دلالة (٤٠٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس البعدي ، وكان الوسط الحسابي للمتغير EF قبل الجهد (٧٥.٤٠)% وبانحراف معياري (٢٠.٣٧)% أما بالنسبة لمتغير EF بعد الجهد فقد ظهر الوسط الحسابي له (٧٤.١٠)% وبانحراف معياري (٤٠.٤١)% وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٧٨.٧٠)% وبمستوى دلالة (٤٠.٤٦)% وهذا يعني انه لا يوجد فرق معنوي.

جدول (١٠)

يبين قيمة T ودلالة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خلال الراحة والجهد للأسلوب العشوائي

الدلالة	درجة الحرية	T	الانحراف المعياري	العدد	الوسط الحسابي	القياسات	المتغيرات
0.00	9.00	-109.96	1.77	10.00	68.70	قبل الجهد	HR
			3.36	10.00	182.80	بعد الجهد	
0.00	9.00	-11.47	2.30	10.00	74.80	قبل الجهد	SV
			7.53	10.00	106.10	بعد الجهد	
0.00	9.00	-28.66	0.16	10.00	5.47	قبل الجهد	COP
			1.57	10.00	19.78	بعد الجهد	
0.00	9.00	-28.63	0.09	10.00	2.94	قبل الجهد	CI
			0.85	10.00	10.63	بعد الجهد	
0.00	9.00	-5.76	2.37	10.00	75.40	قبل الجهد	EF
			6.04	10.00	87.40	بعد الجهد	

وقد بين جدول رقم (٨) قيمة T المحسوبة ودلالة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خلال الراحة والجهد للأسلوب العشوائي حيث بلغ الوسط الحسابي لمتغير HR قبل الجهد (٦٨.٧٠) ض/د بانحراف معياري (١.٧٧) ض/د اما بالنسبة لبعد الجهد فقد بلغ الوسط الحسابي (١٨٢.٨٠) ض/د بانحراف معياري (٣.٣٦) ض/د وقد بلغت قيمة T المحسوبة (-١٠٩.٩٦) ض/د وبمستوى دلالة (٠.٠٠) ض/د وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس القبلي.

اما بالنسبة لمتغير (SV) فقد بلغ الوسط الحسابي قبل الجهد (٧٤.٨٠) مل/د بانحراف معياري (٢٠.٣٠) مل/د اما بالنسبة لبعد الجهد فقد بلغ الوسط الحسابي (١٠٦.١٠) مل/د بانحراف معياري (٧.٥٣) مل/د وقد بلغت قيمة T المحسوبة (١١.٤٧) مل/د وبمستوى دلالة (٠.٠٠) مل/د وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس البعدى.

وقد ظهر الوسط الحسابي لمتغير cO قبل الجهد (٥.٤٧) لتر/د وبانحراف معياري (٠.١٦) لتر/د اما بعد الجهد فقد ظهر الوسط الحسابي (١٩.٧٨) لتر/د وبانحراف معياري (١.٥٧) لتر/د وقد بلغت قيمة T المحسوبة (-٢٨.٦٦) لتر/د وبمستوى دلالة (٠.٠٠) لتر/د وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس البعدى.

وكان الوسط الحسابي لمتغير Ct قبل الجهد (٢.٩٤) لتر/م وبانحراف معياري (٠.٠٩) لتر/م اما بالنسبة لبعد الجهد فقد ظهر الوسط الحسابي (١.٦٣) لتر/م وبانحراف معياري (٠.٨٥) لتر/م وقد بلغت قيمة T المحسوبة (-٢٨.٦٣) وبمستوى دلالة (٠.٠٠) ولصالح القياس البعدى.

اما متغير EF فقد بلغ الوسط الحسابي له قبل الجهد (٧٥.٤٠) % وبانحراف معياري (٢.٣٧) % اما بعد الجهد فقد بلغ الوسط الحسابي (٨٧.٤٠) % وبانحراف معياري (٦.٠٤) % وقد بلغت قيمة T المحسوبة (-٥.٧٦) % وبمستوى دلالة (٠.٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس.

جدول (١١)

يبين قيمة T ودالة الفروق لمتغيرات العضلة القلبية خلال الراحة والجهد بين الاسلوبين المنتظم و العشوائي بعد الجهد

الدالة	درجة الحرية	T	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	العدد	الاساليب التعويض	المتغيرات
0.00	18.00	-8.81	3.44	169.40	10.00	الاسلوب المنتظم	HR
			3.36	182.80	10.00	الاسلوب العشوائي	
0.00	18.00	6.79	1.93	122.80	10.00	الاسلوب المنتظم	SV
			7.53	106.10	10.00	الاسلوب العشوائي	
0.03	18.00	2.35	0.56	21.02	10.00	الاسلوب المنتظم	COP
			1.57	19.78	10.00	الاسلوب العشوائي	
0.03	18.00	2.38	0.31	11.30	10.00	الاسلوب المنتظم	CI
			0.85	10.63	10.00	الاسلوب العشوائي	
0.00	18.00	-5.58	4.51	74.10	10.00	الاسلوب المنتظم	EF
			6.04	87.40	10.00	الاسلوب العشوائي	

وقد بين جدول رقم (٩) قيمة T ودالة الفروق لمتغيرات العضلة القلبية خلال الجهد والراحة بين الاسلوبين المنتظم والعشوائي حيث بلغ الوسط الحسابي لمتغير اقصى HR خلال الجهد بالاسلوب المنتظم (١٩٦.٤٠) ض/د وبانحراف معياري (٣٠.٤٤) ض/د اما بالنسبة للاسلوب العشوائي فقد بلغ الوسط الحسابي (١٨٢.٨٠) ض/د وبانحراف معياري (٣٠.٣٦) ض/د وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٨٠.٨١) ض/د وبمستوى دلالة (٠٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح الاسلوب العشوائي.

اما بالنسبة لمتغير اقصى SV فقد بلغ الوسط الحسابي له بالاسلوب المنتظم (١٢٢.٨٠) مل/د وبانحراف معياري (١٠.٩٣) مل/د اما بالنسبة للاسلوب العشوائي فقد بلغ الوسط الحسابي (١٠٦.١٠) مل/د وبانحراف معياري (٧.٥٣) مل/د وبلغت قيمة T المحسوبة (٦.٧٩) مل/د ومستوى دلالة (٠٠٠) مل/د وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح الاسلوب المنتظم.

وكان الوسط الحسابي للمتغير اقصى COP بالاسلوب المنتظم (٢١٠٠٢) لتر/د وبانحراف معياري (٠٠.٥٦) لتر/د في حين بلغت نسبة الوسط الحسابي له بالاسلوب العشوائي (١٩.٧٨) لتر/د

وبانحراف معياري (١٠.٥٧) لتر/د وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٢٠.٣٥) لتر/د وبمستوى دلالة (٠٠٠٣) لتر/د وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح الاسلوب المنتظم.

وظهر الوسط الحسابي للمتغير اقصى C_1 بالأسلوب المنتظم (١١.٣٠) لتر/م وبانحراف معياري (٠٠.٣١) لتر/م أما بالنسبة للأسلوب العشوائي فقد ظهر الوسط الحسابي له (١٠.٦٣) لتر/م وبانحراف معياري (٠٠.٨٥) لتر/م وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٢٠.٣٨) لتر/م وبمستوى دلالة (٠٠٠٣) لتر/م وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح الاسلوب المنتظم.

وكانت نسبة الوسط الحسابي للمتغير اقصى EF بالأسلوب المنتظم (٧٤.١٠)% وبانحراف معياري (٤.٥١)% أما بالنسبة للأسلوب العشوائي فقد بلغ الوسط الحسابي (٨٧.٤٠)% وبانحراف معياري (٦.٠٤)% وقد بلغت قيمة T المحسوبة (٥.٥٨)-% وبمستوى دلالة (٠٠٠٠) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح الاسلوب العشوائي.

مناقشة النتائج :

٤-١-١ مناقشة نتائج قيم T ودلالة الفروق لمتغيرات (الوزن ، درجة الحرارة ، لزوجة الدم ، الهيماوكلوبين) قبل الجهد وبعده لأسلوب التعويض المنتظم والعشوائي

نجد انه : ظهرت فروق معنوية في متغير الوزن للأسلوب المنتظم قبل الجهد وبعده من الجدول (٦) نجد أنه في متغير الوزن للأسلوب المنتظم ظهر أن هنالك فروقاً معنوية بين القياسيين قبل الجهد وبعده ولصالح الاختبار بعد الجهد وتعزو الباحثة انخفاض الوزن الى التعرق وفقدان السوائل نتيجة الأيض وارتفاع الطاقة بسبب الجهد البدني المستخدم الذي يبذله اللاعب والتي في درجات الحرارة المرتفعة ، وفقدان السوائل وبالتالي فقدان الوزن كون الماء يشكل (٦٠)% من وزن الجسم و(٩١)% من حجم بلازما الدم وأي ارتفاع في درجات الحرارة يرافقه زيادة في افراز العرق على سطح الجلد كأحدى وسائل تبريد الجسم والمحافظة على درجة حرارته ضمن الحدود الطبيعية لتوقيدي اجهزة الجسم وظائفها بالشكل الامثل هي حالة فسيولوجية مرتبطة بطبعية الجهد المبذول والتغيرات الكيميائية الداخلية للجسم نتيجة الفعاليات الحيوية للأعضاء الداخلية فعملية التعرق تحدث أي بداية افراز الغدة الدرقية عندما تكون درجة حرارة المحيط تتراوح (٢٧ - ٢٨) درجة مئوية مما هو الحال في درجات حرارة مرتفعة يصاحبها جهد بدني؟ أي فمن الطبيعي ان يحدث فقدان للسوائل وبالتالي فقدان الوزن ، "إذ يتعرض الجسم خلال التدريب البدني في الجو الحار لبعض التغيرات الفسيولوجية

والهرمونية منها ما هو مرتبط باستهلاك الاوكسجين وكفاءة الجهاز الدوري وسوائل الجسم وقد الوزن^(١).

أما في متغير درجة حرارة الجسم للأسلوب المنظم فقد ظهرت فروقاً معنوية بين القياسيين قبل الجهد وبعده ولصالح الاختبار بعد الجهد وترى الباحثة الارتفاع بدرجة الحرارة بعد الجهد كان نتيجة طبيعية للعمل البدني الذي يقوم به الفرد خلال التغيرات الكبيرة التي تطرأ على انقباض وارتخاء العضلات العاملة وفقاً للنظرية الانزلاقية وبذلك فإنها تنتج حرارة بدرجات تفوق الحرارة المنتجة وقت الراحة بسبب عمليات تحول الطاقة من شكل لأخر . التي تنتهي بالطاقة الحرارية خلال الجهد البدني فضلاً عن عمليات الأيض الغذائي التي تحدث بمستوى عالي وبذلك فإن درجات الحرارة سترتفع للزيادة في تلك التغيرات " كما ترتفع درجة حرارة جسم الراكض نتيجة ازدياد انتاج الحرارة بسبب شدة عمليات الأيض (الميتابوليزم)^(٢) .

"كما يؤدي ونتيجة زيادة درجة حرارة العضلات وزيادة درجة حرارة مركز الجسم أثناء التدريب في الجو الحار إلى انخفاض كمية جريان الدم في الاوعية الدموية بسبب فقدان جزء من ماء البلازما مما يزيد من كثافة الدم وصعوبة وصوله إلى العضلات العاملة وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة تراكم حامض اللبنيك (LA) في الالياف العضلية مما يسبب التعب العضلي^(٣) ، وبالتالي زيادة حرارة الجسم التي يرافقها نقصان الوزن نتيجة التعرق كما أشرنا إليها سابقاً ، " فزيادة نسبة فقدان السوائل عن (٣) % من وزن الجسم حتى في درجات الحرارة الواطئة يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة مركز الجسم".^(٤)

وفي متغير الزوجة للأسلوب المنظم وجدنا أن هناك فروقاً غير معنوية بين القياسيين قبل الجهد وبعده وتزعم الباحثة عدم ظهور الفروق إلى أن تناول السوائل المعاوضة بشكل منظم يتاسب وطبيعة الجهد المبذول الذي أعد وفقاً لطبيعة لعبة كرة السلة والجهد المبذول خلالها لهذا فإن الزوجة بطبيعتها ترتفع بعد الجهد لكن عملية التعويض بالسوائل أدت إلى عدم ارتفاعها بشكل كبير أي أنها بقيت قريبة من معدلها قبل التعويض وكما ظهر في النتائج ، وذلك بسبب الآلية الفسيولوجية في الدم

(١) ابو العلاء احمد عبد الفتاح : مصدر سبق ذكره ، ص ٥٠٢

(٢) ريسان خرييط مجيد : التحليل البيوكيميائي والفالسجي في التدريب الرياضي ، مطبعة دار الحكمة ، . جامعة البصرة، ص ١٩٩.

(3) Williams c.b . and others , circulatory and metabolic reactionto work in heat . J . apple physiol . 17 . 1961

(4) David . L . costill . A scientific approach to distance running track and field news . 1979 .

جراء تعرض أفراد العينة للجهد البدني مع الارتفاع في درجات الحرارة والتعويض المنتظم للسوائل ، "أي أن"

ولا يخفى أن الجهد في الأجزاء الحارة يعمل على تحفيز الغدة الدرقية لزيادة نسبة التعرق كأحدى الوسائل التي تعمل على تنظيم درجة الحرارة بنسبة تصل إلى ٨٠٪ مقارنة بالأساليب الأخرى، ولذلك فإن مايقوم به جسم اللاعب للمحافظة على درجة حرارته تكون على حساب فقدان جزء من السوائل ، إذ يبدأ السائل داخل الخلايا في البداية بالنقصان بسبب القيام بالجهد البدني ومن ثم يتأثر السائل داخل الخلية ، "إذ تتم آلية تعويض السوائل من داخل الخلية إلى خارج الخلية من خلال بوابات خاصة في جدار الخلية تتفذ من خلالها إلى السائل خارج الخلايا (السائل الخلالي) وبذلك سوف يتتأثر عمل القلب وهذا يؤدي إلى انخفاض قدرة وقابلية اللاعبين على العطاء في مثل هذه الأجزاء"^(١)، ولكن عملية التعويض عملت على المحافظة على مستوى الزوجة وبالتالي قدرة اللاعبين من أداء الجهد بكفاءة عالية دون حدوث التعب والمحافظة على مستوى الأداء .

فيما يخص متغير الهيموكلوبين للأسلوب المنتظم فقد ظهرت فروقاً غير معنوية بين القياسين قبل الجهد وبعده وترى الباحثة أن السبب الرئيس لذلك هو الأسلوب المستخدم لتعويض السوائل المفقودة لدى أفراد عينة البحث أثناء اداء الجهد البدني على أساس منتظمة تتناسب بشكل علمي دقيق مع طبيعة اللعبة ولهكذا فئات فضلاً عن أن حجم الدم ومقدار التغير في لزوجته لم يطرأ عليها تغيرات نتيجة فقدان السوائل فهذا يعني أن مكونات الدم في الأسلوب المنتظم محافظة على نفسها بشكل يمكن للدم من إداء وظائفه بما يتلائم وطبيعة الجهد المبذول ، فمعظم المصادر تؤكد أنه كلما زادت نسبة الأوكسجين بالدم زاد تركيز الهيموكلوبين لأن هناك علاقة طردية بينهما " فوجود هذه الغازات المختلفة في الهواء ودخولها إلى الرئتين نتيجة عملية التنفس يقلل الضغط الجزئي للأوكسجين تدريجياً ونلاحظ نصاً تدريجياً في نسبة تشعير الدم بالأوكسجين وهذا مايؤثر على نسبة تركيز الهيموغلوبين فالدم الخارج من الرئتين يكون مشبعاً بنسبة ٩٧٪ في حالة التنفس الطبيعي (الهواء الخلالي من الغازات الخانقة) وهو يحمل حوالي (٢٠) سم^٣ من الأوكسجين وهذه أكبر كمية حملها الدم من الأوكسجين إلى الجسم وبهذه الحالة يبلغ تركيز الهيموغلوبين في الشخص الاعتيادي (١٥) غم /

(١) علي مهدي هادي الجمالي: وضع مؤشرات رقمية للسوائل المفقودة من خلال بعض المتغيرات الفسيولوجية في الدم باستخدام جهدين بدنيين باختلاف درجات الحرارة لدى لاعبي الكرة الطائرة ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ،جامعة القادسية ،٢٠٠٩ ، ص ١٠٤ .

١٠٠ سم^٢ من الدم أما قلت نسبة التسبّع (تشبع الدم بالأوكسجين) فتؤدي إلى قلة تركيز الهيمو غلوبين^(١).

ولذلك فإن الجهد المبذول يقل تأثيره على الأفراد للأسلوب المنتظم على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة" فهناك عدة عوامل تؤثر على قابلية الهيمو غلوبين على الاتحاد بالأوكسجين مثل درجات الحرارة حيث درجة حرارة الجسم وزيادة حموضة الدم وارتفاع نسبة غاز ثاني أوكسيد الكاربون تعمل على تناقص قابلية الهيمو غلوبين على الاتحاد مع الأوكسجين^(٢) وقد تم التخلص من التأثير السلبي لذلك بأسلوب التعويض المنتظم للسوائل .

أما في الأسلوب العشوائي ومن الجدول (٦) نجد أنه في متغير الوزن ظهر أن هنالك فروقاً معنوية بين القياسيين قبل الجهد وبعده ولصالح الاختبار بعد الجهد والباحثة تعزو السبب في انخفاض الوزن بشكل كبير ما يقارب ٢ كغم مقارنة ما قبل الجهد نتيجة فقدان كمية كبيرة من السوائل خلال الجهد مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم استخدام أسلوب التعويض للسوائل المفقودة بشكل منتظم وإنما يتم التعويض بأسلوب عشوائي وهذا ما أثر على نتائج أفراد عينة الأسلوب العشوائي إذ أن انخفاض الوزن ما بين (٥-٢%) له اثار سلبية على عمل الاجهزه الداخلية وهذا الامر ينعكس سلباً على مقدار الجهد المبذول كون تلك التغيرات تؤثر على عمليات الأيض الغذائي ، إذ أن لدرجة الحرارة المرتفعة تأثير كبيراً في زيادة كمية العرق التي يفقدها اللاعب اثناء القيام بأداء الاختبار البدني الذي يتميز بالشدة القصوى والتي تؤثر بشكل أو بأخر في تحديد حجم السائل المفقود قبل وبعد الجهد "أن عملية فقدان السوائل من بلازما الدم والسوائل البينية عن طريق التعرق التي تتم عن طريق آلية بالغة الدقة ابتداءً من خارج الخلية إذ تتضمن السائل البيني والذي يبلغ (١٢ لتر) والبلازما (السائل الوعائي) والذي يبلغ (٣ لتر) إذ يكون هناك توازن تناصحي ما بين السائلين ، أما من داخل الخلية والذي يبلغ (٢٥ لتر) فتحصل آلية فقدان بسبب الانحدار التناصحي ما بين السائل البيني والسائل داخل الخلية لغرض حصول عملية التوازن المائي في الجسم ، وهذا يبين أن الأثر الاكبر في عملية فقدان السوائل من البلازما يعود إلى درجة الحرارة المرتفعة التي تزيد من لزوجة الدم وعدم جريان الدم في الاوعية الدموية بسهولة والذي يسبب فقدان السوائل من بلازما الدم"^(٣) .

(١) فاسن حسن حسين ، ومنصور جميل العنبي : اللياقة البدنية وطرق تحقيقها ، مطبعة التعليم العالي، بغداد، ١٩٨٨.

(٢) محمد سليم صالح وعبد الرحيم محمد: علم حياة الإنسان ، جامعة الموصل ، ١٩٨٣ ، ص ٤٤٩

(٣) علي مهدي هادي الجمالي: مصدر سبق ذكره ، ص ١٠٤

"ويؤكد على ذلك (ken sparks) انه مع بداية عملية التعرق يحدث انتقال لماء الجسم بين ردهتين داخل الخلية وخارجها وهو ما يسبب فقدان السوائل (Dehydration) مما يؤدي الى قلة حجم الدم^(١).

أما في متغير درجة حرارة الجسم للأسلوب العشوائي فأظهرت النتائج فروقاً معنوية بين القياسيين قبل الجهد وبعده ولصالح الاختبار بعد الجهد تعزو الباحثة الارتفاع بدرجة الحرارة لدى أفراد الأسلوب العشوائي بشكل كبير إلى الزيادة الكبيرة في عملية التعرق نتيجة الجهد البدني العالي في الأجواء الحارة لأن عملية التعويض لم تكن بالأسلوب المناسب الذي يتوافق مع طبيعة أفراد العينة بل كانت بأسلوب عشوائي وهذا ما رفع من درجة حرارة الجسم أكثر من درجة مئوية مما له تأثير سلبي كبير ، إذ تعتبر عملية توازن السوائل بالجسم أثناء الجهد في غاية الالهامية لدى جميع الرياضيين ، وكلما كان توازن تلك السوائل في صورته الطبيعية ساعد ذلك على تخلص الجسم من درجات الحرارة عن طريق الغدد العرقية وحافظ على معدل ضربات القلب وضغط الدم ولزوجته في صورته الطبيعية ، " بينما فقدان سوائل الجسم أثناء التدريب وبدرجات حرارة مرتفعة يؤثر سلباً على كفاءة وحيوية الرياضي"^(٢) . فنتيجة لفقدان الرياضي كمية من الماء أكثر من فقدانه للأملاح يخرج الماء الموجود داخل الخلية إلى خارج الخلية لحفظ التوازن وتسمى هذه الحالة التوازن التناصحي (Osmotic equilibrium) وبالتالي فإن الرياضي الذي يقوم بنشاط رياضي يجعله يعرق من دون تعويض للماء المفقود تحدث تغيرات كبيرة في دمه نتيجة لخروج كميات اضافية من الماء إلى خارج الجسم بسبب التعرق الناتج عن استمرار أداء التمارين الرياضية لاسيما في الأجواء الحارة مما يؤدي إلى قلة حجم الدم وهو يسبب زيادة تركيز الالكترولاليات فيما تبقى من حجم الدم واستمرار الرياضي بفقدان كميات أخرى من العرق يؤدي إلى انتقال آلية التعرق إلى حجم الدم ، وبالتالي يفقد جسم الرياضي سوائل وأملاح تقدر بحوالي (٣-٢) لتر في الساعة عند بذل الجهد في الأجواء الحارة^(٣) ،

وهو ما يرفع درجة حرارة الجسم لدى أفراد عينة البحث أثناء ادائهم الجهد البدني في الأجواء الحارة بل كان تعويض السوائل للأسلوب العشوائي مما زاد من لزوجة الدم بشكل كبير ويعتبر عامل معيق للأداء فإن زيادة اللزوجة تعمل على زيادة حرارة الجسم وهو ما يحد قلة قدرة الرياضي على الأداء المثالي ، إذ تعتمد لزوجة الدم بدرجة عالية على عدد خلايا الدم الحمراء بصورة طردية وبالتالي

(1) Ken sparks and cary bjorklund , long distance runners guide to training and racing , prentice hall . 1984 .

(2) بهاء الدين ابراهيم سلامة : مصدر سبق ذكره ، ص ١٠٦ .

(3) Scott k . powers & ; Exercise physiology ' chapter 15 . U.K. 2001 . P:409.

قربها من بعضها التي يزداد فيها تجاذب جزيئات السائل وهو مايزيد من الكثافة النوعية للدم ، وحدث تعرق شديد في التمرين الرياضي قد يؤدي إلى زيادة نقصان حجم سائل البلازما وبالتالي زيادة لزوجة الدم بسبب زيادة المقاومة الطرفية والضغط الانقباضي لتحريك عمود الدم إلى الشريان الابهر^(١).

أما متغير الهيموكلوبين للأسلوب العشوائي فقد أظهرت النتائج فروقاً معنوية بين القياسيين قبل الجهد وبعده لصالح بعد الجهد وتعزى الباحثة ذلك إلى التعويض العشوائي للسوائل إذ أن فقدان كمية كبيرة من السوائل دون التعويض المستمر خلال الجهد ساهم في إحداث تغير في حجم بلازما الدم الأمر الذي أدى إلى حدوث تغير في توزيع نسبة مكونات الدم أو مايسما الهيماتوكريت وبذلك حدث زيادة مؤقتة نتيجة زيادة نسبة الخلايا الحمراء منسوبة إلى بلازما الدم ولكن هذا سرعان ما يعود إلى وضعه الطبيعي بعد الجهد وعند تعويض السوائل بشكل كامل ، "أن فقدان الماء يؤدي إلى انخفاض حجم بلازما الدم وينخفض حجم بلازما الدم اثناء فقدان الماء المصحوب بفقدان الوزن بنسبة ٤% وينخفض تبعاً لذلك حجم الدم فقدان الماء من الجسم يمكن اعتباره هبوط حجم السائل الموجود مابين الخلايا "الأنسجة" والسائل الموجود داخل الخلايا ايضاً ويحدث في تلك الخلايا التي تتسم بهبوط كمية الماء فيها"^(٢) لأن نسبة الأوكسجين في الدم ترتبط بتركيز الهيموغلوبين في الدم " فأي عامل يؤدي إلى زيادة اتحاد الأوكسجين بالهيموغلوبين والذي يسمى بالاوكسي هيموغلوبين يؤدي إلى زيادة في تشبع الدم بالأوكسجين وكلما زاد تشبع الدم بالأوكسجين زاد تركيز الهيموغلوبين وجود خليط من الغازات وبنسب مختلفة وزائدة عن الحد الطبيعي في هواء الشهيق فإنها يزاحم الأوكسجين لأخذ مكان على جزيئه الهيموغلوبين بعد أن يعود الهيموغلوبين إلى الرئتين ليجهز بكمية جديدة من الأوكسجين إلى الجسم وهذه العملية الفسيولوجية المستمرة تتأثر في حالة وجود ثاني اوكسيد الكاربون مثلًا في الرئتين بوصفها محطة لتلوث الهواء المستنشق حيث تحصل عملية تنافسية بين الأوكسجين وثاني اوكسيد الكاربون للارتباط بجزيئه الهيموغلوبين "^(٣) نتيجة الجهد العالي وارتفاع درجة حرارة المحيط وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الجسم وفقدان سوائل الجسم أن آلية فقدان السوائل في الدم تتم عن طريق ثلاثة مناطق هي: (داخل الخلية ، خارج الخلية ، ما بين الخلايا) أوردة - شرايين ، وأن أول من يتأثر بعملية فقدان هو السائل خارج الخلية ومن ثم يأتي دور السائل داخل الخلية وذلك بسبب وجود بوابات خاصة ذات طبيعة نصف نفاذية تتفذ من خلالها السوائل والمواد الذائبة في الدم من خلال

(١) : هارولد هاربر : الكيمياء الفسلجية ، ترجمة كنعان جميل ، ج ٢ ، ط ١ ، مطبعة التعليم العالي ، بغداد ، ١٩٨٨ ص ٤٩٦ .

(٢) رisan خرييط و ابو العلا عبد الفتاح : التدريب الرياضي ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، ط ١ ، ٢٠١٦ ، ص ٦٢٩ .

(٣) هاربر : الكيمياء الفسلجية ، المصدر السابق ، ١٩٨٨ ، ص ٤٩٦ ،

الخلية إلى خارج الخلية وذلك لتعويض المفقود وخلق حالة من التوازن في الدم ، "إذ أن عملية فقدان السوائل تعتمد على مجموعة من العوامل (التغيير في درجة الحرارة - ورطوبة المحيط - والتغيير في طول التمارين وشدة) ^(١) .

٤-٢-١-١ مناقشة نتائج قيم T ودلالة الفروق للمتغيرات (بداية التعرق ، الوزن ، نسبة الوزن المفقود ، كمية السائل المستهلك ، درجة الحرارة) بين الأسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي من الجدول (٧) نجد أنه في متغير بداية التعرق ظهر أن هنالك فروقاً غير معنوية بين المجموعتين وتعزو الباحثة السبب إلى أن بداية التعرق تعطي مؤشراً عن أن درجة حرارة الرياضي بدأت بالارتفاع إلى مستويات عالية مقارنة بوقت الراحة الأمر الذي تطلب من الجسم أن ينظم ذلك الارتفاع من خلال عدة آليات من أهمها هو التبريد عن طريق التعرق ولذلك نلاحظ أن بداية الزمن الذي حدث فيه تعرق ملموس وواضح كان متساوياً في كلا الأسلوبين على اعتبار أن الجسم في هذه المرحلة لم يستنفذ بعد من السائل المغوض وفي الوقت نفسه يعتبر رد فعل لتنظيم درجة الحرارة. فضلاً عن مرحلة التعرق تمر بمراحل كيميائية ثابتة للأفراد مع الاختلافات الفردية بينه إذ يفرز العرق عند الإنسان بمستوى ضغط مقداره (٢٥٠) مل زئبق أو أكثر ^(٢) ، وتنتمي السيطرة على هذا المستوى من الضغط وعلى نشاط الغدد العرقية نفسها بوساطة الجهاز العصبي المستقل (Autonomic nervous system) ^(٣). وعن طريق (Adrenal cortical steroids) التي تؤثر في مقدار المواد المكونة للعرق ^(٤) .

"أن نشاط الغدد العرقية يحدث بعد إطلاق ألياف العصب السباتاوي مادة Cholinergic التي يسيطر عليها من خلال مركز التنظيم الحراري الذي يقع في مركز تحت المهد "Hypothalamus" ^(٥).

يسدل من ذلك أن ارتفاع درجة حرارة مركز الجسم عملية تسبق إفراز العرق وأن التعرق عملية حياتية ضرورية تهدف إلى تشتت هذه الحرارة التي ترتفع باستمرار الحافز وزيادته .

(١) غايتون وهول : مصدر سبق ذكره ، ١٩٩٧ ، ص ٣٤٨ .

(2) Edward Stanton west , Wilbert R . Todd , Howard . mason , John . T. Von Bruggen : Text book of Biochemistry . 4ed . U.S.A. 1970 , P:625 .

(3) Pedersen S.A : Reduced sweating in adults with growth hormone deficiency . the lancet , vol . 11 , no . 8064 , 1989 . P:682 .

(4) Edward S.w . , and etul , , Po.cit ., P:625 .

(5) Fortney S.M . , Nadel E.R . , Wenger G.B . and Bore J. R. : effect of blood volume on sweating rate and body fluids in exercising humans , . J Apple physiol . 51 (6) , 1981 . P:1597 .

ولم تظهر فروق معنوية في متغير الوزن قبل اداء الجهد البدني كون أفراد العينة في حالة راحة وكذلك نفس اللاعبين تعرضوا للأسلوبين المنتظم والعشوائي خلال التجربة بأوقات مختلفة وعليه لم تظهر فروق كون وزن اللاعب ثابت لم يتغير .

وفي متغير الوزن بعد الجهد أيضاً ظهر أن هنالك فروقاً غير معنوية بين المجموعتين ، وتعزو الباحثة السبب إلى أن فقدان السوائل لجسم لعينة البحث كان أقل بالأسلوب المنتظم لتعويض السوائل مقارنة بأسلوب التعويض العشوائي ومع ذلك لم تظهر فروق دالة في الأوساط الحسابية لأن آلية فقدان السوائل نتيجة الجهد البدني العالي والحرارة المرتفعة كانت واحدة لكن الفرق في آلية التعويض على الرغم من وجود خاصية كيمائية لعملية فقدان السوائل نتيجة التعرق وعملية التنظيم الحراري لا تسمح بحدوث فروق كبيرة ، إذ أن كمية السوائل المفقودة عن طريق عملية التعرق لها علاقة بالجهد البدني ودرجة حرارة المحيط لكن الغدد العرقية تعمل على المحافظة على إفرازها بمعدلات واحدة حتى نهاية الجهد البدني وبالتالي يحدث هنالك تناقصاً أو انحداراً في معدلات العرق إلى أن يصل إلى الثبات وأن تم تعويض مقدار النقصان بالماء ف " خلال التعرق الطويل في بيئة حارة يظهر تناقص تدريجي في معدل السوائل المفقودة عن طريق التعرق حتى إذا عوض الماء المفقود من الجسم بنفس المعدل " (١) .

أما بالنسبة لمتغير نسبة الوزن المفقود ظهر أن هنالك فروقاً معنوية بين المجموعتين ولصالح الأسلوب المنتظم وهنا تجد الباحثة أن الاسباب التي تكمن وراء هذه الفروق ان نسبة الوزن المفقود في حالة المقارنة بين نتائج الأسلوب المنتظم والأسلوب العشوائي نجد أن عملية التعويض المنتظم ساهمت في التقليل من اثار التعرق نتيجة الجهد والحرارة المرتفعة وبالتالي حافظت وبشكل كبير على نسبة المفقود من الوزن مقارنة بالأسلوب العشوائي وهذه من خواص عمل وطبيعة اسلوب التعويض ودورها في المحافظة على ديمومة عمل الجسم وبالتالي قدرته على الاداء لفترة اطول دون حصول التعب فتناول كمية ماء إضافية قبل ممارسة التمارينات في الجو الحار يوفر حماية منضبطة و يؤخر تحمل الماء الى عناصره ويزيد من التعرق أثناء التمارينات ويرفع درجة حرارة الجسم قليلاً مقارنة مع التمارينات التي تمارس بدون تناول السوائل .

أما بالنسبة لمتغير كمية السائل المستهلك فظهر أن هنالك فروقاً معنوية بين المجموعتين ولصالح الأسلوب المنتظم وهنا تجد الباحثة أن الجسم يقوم بتعويض ما فقده من الماء خلال التدريب أو

(1) Per – olef . Astrand , Kaare Rodahl , Hans A . Dahl , M.D Textbook of Work physogy :physiological bases of exercise Human Kinetics , 2003 . P: 498 .

المنافسة ، لذا يجب أن تناول الماء قبل الشعور بالحاجة إليه لكي يحافظ الجسم على الحالة الطبيعية للأجهزة الداخلية قدر ما يستطيع ويمكن تجنب مثل هذه المشاكل (السوائل المفقودة) إذا ما تعود اللاعبون أن يتناولوا قدرًا من الماء قبل الاشتراك في المباراة ، ويمكن استخدام الميزان لوزن اللاعب قبل وبعد التدريب للتأكد من عملية تعويض العرق المفقود أثناء فترة التدريب^(١) .

ومن هذا نجد أن عملية التعويض المنتظم للسوائل تساعد على زيادة حيوية الرياضي فلا يحدث فقدان كبير للسوائل نتيجة التعويض المستمر بكميات تتناسب وطبيعة الجهد المبذول .

وفي متغير درجة الحرارة قبل الجهد ظهر أن هنالك فروقاً غير معنوية بين المجموعتين وهنا تجد الباحثة أن من أهم الأسباب لعدم ظهور الفروق هو أنه هنالك آلية لحرارة الجسم وهذه الآلية تبقى منتظمة أثناء الراحة على الرغم من ارتفاع درجة حرارة الأجواء المحيطة وهذه الآلية تتم من خلال عملية التعرق والتبريد للجسم فضلاً عن ذلك فإنه مؤشرًا على أن الاجرائيين (التعويض المنتظم والعشوائي) قد تم في نفس الظروف البيئية تقريباً فلم يكن هنالك فرقاً واضحًا في درجة حرارة المحيط التي تتأثر عادة بدرجة حرارة البيئة ، لأن التعرض إلى درجة حرارة (٤٠) درجة مئوية لأشخاص اعتياديين يؤدي إلى رفع درجة حرارة المستقيم بمعدل من (36.3 ± 0.2 - 37.5 ± 0.3) ويصاحبها عملية افراز العرق^(٢) .

أما بالنسبة لمتغير درجة الحرارة بعد الجهد ظهر أن هنالك فروقاً معنوية بين المجموعتين ولصالح التعويض المنتظم وهذا يعني أن الأسلوب المنتظم يمتلك قدرة كبيرة في المحافظة على درجة الحرارة قريباً من الحالة الطبيعية على الرغم من أن انتاج الحرارة الداخلية نتيجة عمليات الأيض الغذائي تزداد بشكل كبير جداً خلال الجهد البدني لكن درجة حرارة الجسم لم ترتفع بشكل كبير مقارنة باسلوب التعويض العشوائي إذ تكون كمية السائل المفقود بالتعرق كبيرة تبعاً للنشاط الجسماني ولدرجة حرارة المحيط ، ويبلغ حجم العرق بالحالة السوية نحو ١٠٠ مليلتر / يوم فقط ، ولكن في الطقس الحار جداً أو أثناء التمارين القاسية يزداد فقدان الماء بالتعرق من (لتر - لتران) في الساعة أحياناً ، مما يسبب نفاذًا سريعاً لسوائل الجسم أن لم يزداد المدخل أيضًا بتشييط آلية التعرق^(٣) ، وبالتالي فإن عملية التعويض بالسوائل بشكل منتظم مع كميات كافية توازن الجهد المبذول وأرتفاع درجة حرارة المحيط تعمل على الموارنة والتقليل من ارتفاع درجة حرارة الجسم بعد الجهد . وكذلك " فإن الارتفاع في درجة حرارة مركز الجسم يرفع التحفيز المركزي للغدد العرقية ، ويصاحب هذا التحفيز أرتفاع في

(١) محمد حسن علاوي ، ابو العلاء احمد عبد الفتاح : مصدر سبق ذكره ، ص ٤١٣ .

(2) Mackenzie . M , : pathophysiology of thermoregulation in patients with poikilothermia . Arctic . med . Res . , suppl , 1991 . P:532 .

(٣) علي مهدي هادي الجمالي: مصدر سبق ذكرة ، ص ٢١ .

درجة حرارة الجلد . والنتيجة هي ازدياد في العلاقة بين معدل العرق Sweat Rate ودرجة حرارة مركز الجس مما يؤدي إلى تحسن في حالات التأقلم الشخص (١) .

٤-١-٣-١ مناقشة نتائج قيم T ودلالة الفروق للمتغيرات (لزوجة الدم ، الهيموكلوبين ، التغيير في حجم بلازما الدم ، زمن الجهد المنفذ) بين الأسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي

من جدول (٨) نجد أن لزوجة الدم بعد الجهد إظهرت فروقاً معنوية بين المجموعتين ولصالح الأسلوب المنتظم وتعزو الباحثة السبب إلى أن اللزوجة بعد الجهد تبدأ بالزيادة مع زيادة الجهد الأمر الذي يستدعي من أجهزة الجسم الداخلية المحافظة على درجة حرارتها الداخلية قريباً من الحدود الطبيعية وذلك من خلال عملية التبريد بأساليب مختلفة منها التبخر الذي يلزم سحب الماء من الخلايا وبلازم الدم باتجاه سطح الجلد لغرض التخلص من الارتفاع الكبير بدرجة الحرارة الداخلية الناتجة عن زيادة الأيض الغذائي ولذلك نلاحظ أن لزوجة الدم تزداد كون الماء يشكل نسبة ٩١٪ من البلازم و٨٪ من الوزن الكلي للجسم لكن عملية التعويض السوائل بشكل منتظم تعمل على التقليل من الآثار السلبية لأرتفاع اللزوجة وبالتالي المحافظة على مستوى اللزوجة بشكل قريب من الحدود الطبيعية مقارنة بالأسلوب العشوائي أن عملية التعويض تعمل على التقليل من الارتفاع الحاصل في لزوجة الدم، لأن ارتفاع درجات الحرارة تساهم في فقدان كمية من البلازم مما يؤثر على نسبة الهيماتوكريبت فتزداد نسبة الخلايا الحمراء والبيضاء والصفائح إلى نسبة البلازم فسيصبح الدم أكثر لزوجة وتكون عملية انتقال المواد عبره أكثر صعوبة لانخفاض سرعة دوران الدورة الدموية فضلاً عن إرتفاع ضغط الدم فأستمرار العمل العضلي لفترة طويلة لاسيما في الجو الحار وعند زيادة التعرق تزيد لزوجة الدم نتيجة خروج العرق وكذلك نتيجة انتقال جزء من سائل البلازم إلى سائل ما بين الخلايا ، ويعتبر هذا عملاً مساعداً على سرعة التعب ولذا فإن أمداد اللاعبين بالماء على فترات خلال الأداء في الجو الحار يساعد على تقليل حدوث ذلك فضلاً عن سهولة عملية التخلص من الحرارة الزائدة (٢) .

أما الهيموكلوبين بعد الجهد فأظهرت النتائج أن هناك فروقاً معنوية بين المجموعتين لصالح الأسلوب المنتظم وتعزو الباحثة السبب إلى أن بذل الجهد من قبل أفراد عينة البحث وبارتفاع درجات الحرارة للمحيط أدت إلى حدوث تغير في مستوى الهيموكلوبين وهذه الزيادة مؤقتة وغير حقيقة لأنها جاءت من خلال زيادة تركيز حجم الخلايا مقارنة في البلازم وهذا الأمر يعود إلى تغير أو

(1) george harenith : Age predicts cardiorasclar , but not thermoregulatory . responses to humid heat stress . Eur . J . Apple . physiol . , 70 , 1995 . P:95 .

(2) محمد حسن علاوي ، ابو العلا احمد عبد الفتاح : مصدر سبق ذكره ، ص ١٦٤ .

نقصان حجم البلازمما وزيادة الخلايا مما يؤدي إلى هذا الارتفاع وبعد الجهد يمكن أن تعود النسب إلى طبيعتها عندما يتم التعويض بشكل كامل . تدل على ان لزوجة الدم ازدادت نتيجة فقدان كميات كبيرة من ماء البلازمما ونتيجة التعويض المنتظم للسوائل ساهم في المحافظة على مستوى الهيموكلوبين بمستويات قريبة من المستوى الطبيعي قبل الجهد إذ أن عملية التعويض المنظم تعمل على المحافظة نسبة الهيموكلوبين بالدم عن أقرانهم الذين يستخدمون أسلوب عشوائي"ان زيادة عدد الكريات الحمراء أو الهيموكلوبين ناتج عن فقدان السائل الموجود في الدم ل تعرض أفراد العينة لتلك الجهود البدنية وكذلك بسبب درجات الحرارة ، لأن عدد كريات الدم الحمراء ثابت في جسم الانسان أما الزيادة أو النقصان في العدد فيعزى إلى النقص في كمية السوائل المفقودة من الدم لذلك يزداد عدد كريات الدم الحمراء"^(١) .

أما بالنسبة للتغير في حجم البلازمما فقد أظهرت الدراسة أن هناك فروقاً معنوية بين المجموعتين لصالح الأسلوب المنتظم وتعزو الباحثة السبب إلى أن ممارسة أي نشاط بدني مع ارتفاع العمليات الايضية وحاجة الجسم إلى O_2 يزداد معه عملية افراز هرمون الاستيرون من قشرة الغدة الدرقية مسبباً اعادة الصوديوم والماء من الكلية إلى السائل الخلالي والى بلازما الدم واداء الدور ذاته في الغدد العرقية مما يسبب زيادة طفيفة في حجم الدم (بلازمما الدم) وليس كريات الدم و عند أداء الجهد البدني وبدرجات حرارة مرتفعة وبإياع من الدماغ (الميوبوتلامس) تزداد الحاجة الى الاوكسجين بكميات كبيرة وذلك لتزويد العضلات العاملة بالكمية الكافية من الاوكسجين لا سيما في الانشطة التي تكون قصوية التي تستمر لمدة قصيرة وهذا يقع في النظام الفوسفاجيني ونظام اللاكتيك ، لذلك تزداد حركة الكريمة الحمراء في بلازما الدم لنقل العناصر الاساسية والضرورية من (هرمونات - اوكسجين) إلى داخل الخلية للقيام بالواجب الحركي لذلك تحصل زيادة في حجم الكريمة الحمراء نتيجة لعمل النقل والتوصيل ما بين البلازمما وداخل الخلية لتعويض العناصر الأساسية التي تغيرت نسبها لعدم كفاية الاوكسجين أو ظاهرة (النقص الاوكسجيني) ، لذلك يزداد متوسط حجم الكريمة (MCV) أي أن حجم الكريمة الحمراء أكبر من الحجم الطبيعي^(٢). إن عملية التعويض المنتظم عملت على التقليل من التغيرات الحاصلة في حجم البلازمما إلى أقل مستوى مقارنة بالأسلوب العشوائي الذي كان السبب الرئيس في زيادة نسبة التغير في حجم البلازمما إذ أن كمية السوائل المفقودة خلال الجهد البدني وصلت إلى ١٠ أضعاف مقدار التغير عند إعتماد اسلوب التعويض المنتظم وهذه احدى الاثار السلبية التي

(١) علي مهدي الجمامي : مصدر سبق ذكره، ص ١٢١

(٢) علي مهدي هادي الجمامي : مصدر سبق ذكرة ، ص ٣٦

سببها التعويض العشوائي للسوائل لأن كمياتها كانت أقل بكثير مما فقده الجسم خلال الجهد البدني الأمر الذي أدى إلى أحداث تغيرات في حجم البلازما بالاتجاه السالب .

وفي متغير زمن الجهد المنفذ ظهر أن هنالك فروقاً معنوية بين المجموعتين ولصالح الأسلوب المنتظم وتعتقد الباحثة أن قدرة الأفراد على الإداء بفعالية عالية ولفترة زمنية أطول هو نتيجة التعويض المنتظم للسوائل بحيث يستطيع الأفراد إلإداء لفترات أطول دون تعب مقارنة بالأفراد الذين يعوضون بشكل عشوائي نتيجة للجهد البدني وارتفاع درجة حرارة المحيط ، إذ تعتبر عملية توازن السوائل بالجسم أثناء التدريبات في غاية الأهمية لجميع الرياضيين ، وكلما كان توازن تلك السوائل بصورةه الطبيعية ساعد ذلك في تخلص الجسم من درجات الحرارة عن طريق الغدد العرقية وحافظ على معدل ضربات القلب وضغط الدم ولزوجته في صورته الطبيعية ، بينما فقدان سوائل الجسم أثناء التدريب وبدرجات حرارة مرتفعة يؤثر سلباً على كفاءة وحيوية الرياضي . وتلعب الهرمونات دوراً مهماً في عملية توازن السوائل في الجسم^(١) .

لذلك من الأهمية إعادة أمداد الجسم بالماء لتعويض المفقود ولمساعدة الجسم على افراز العرق مما يساعد بالمحافظة على درجة حرارة الجسم التي تلعب دوراً كبيراً في تحمل الحرارة إذ ينخفض مستوى الإداء لدى بعض الأشخاص لعدم تحملهم ارتفاع الحرارة بسبب التعويض غير الصحيح.

٤-١-٤-١ مناقشة نتائج قيم T ودلالة الفروق للمتغيرات العضلية القلبية خلال الراحة والجهد

للأسلوب المنتظم والأسلوب العشوائي

من الجدولين (٩ - ١٠) نجد أنه في متغير HR معدل ضربات القلب للأسلوبين المنتظم والعشوائي ظهر أن هنالك فروقاً معنوية بين القياسين قبل الجهد وبعده ولصالح بعد الجهد وترى الباحثة أن السبب الرئيس يعود إلى طبيعة الجهد البدني المبذول من قبل أفراد عينة البحث على الرغم من اختلاف أسلوب التعويض ودرجة حرارة المحيط ، فمعدل ضربات القلب (HR) أثناء الراحة يبلغ متوسطة من ٦٠ إلى ٨٠ ض/ق في العمر المتوسط للرجل البالغ السليم. ويتأثر معدل القلب بعدة عوامل منها درجة حرارة البيئة والجهد البدني المبذول ، معدل القلب أثناء الجهد البدني إذ يزداد معدل القلب أثناء الجهد البدني مباشرة ، وترتبط نسبة الزيادة بشدة التدريب، ويستدل على شدة التدريب بنسبة استهلاك الأوكسجين ، فكلما ازداد معدل القلب كلما ازداد معدل استهلاك الأوكسجين، ويستخدم

(١) بهاء الدين ابراهيم سلامه : مصدر سبق ذكره ، ص ١٠٦ .

معدل القلب أثناء العمل على الأرجوميتير للمقارنة بين الأفراد في مدى قدرتهم على العمل مع زيادة الشدة للتعرف على معدل القلب الأقصى والتغير في معدل القلب مع زيادة معدل العمل البدني^(١). لهذا نجد ارتفاع معدل القلب بعد الجهد لكل من أسلوبي التوعيض المنتظم والعشوائي وهذا ناتج عن الخاصية السابقة .

في متغير SV (حجم الضربة) للأسلوبين المنتظم والعشوائي ظهر أن هنالك فروقاً معنوية بين بين القياسيين قبل الجهد وبعده ولصالح بعد الجهد و ترى الباحثة زيادة كمية الدم المدفوعة مع زيادة ضربات القلب بعد الجهد مقارنة بقبل الجهد وبالتالي ارتفاع حجم الضربة لديهم أثناء الجهد نتيجة زيادة العائد الوريدي الذي يعمل على زيادة الكمية المدفوعة في الدفعية الواحدة والذي يتاسب طردياً مع احتياج العضلات العاملة للاوكسجين سواء كان خلال الجهد البدني أو خلال فترة الاشداد مع العلم أنه في مجموعة الاسلوب المنتظم كان حجم الضربة لديهم أكبر مقارنة بالاسلوب العشوائي مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة توعيض السوائل المفقودة وبسبب الآلة السابقة لزيادة حجم الضربة نتيجة الجهد البدني ، تزداد معدل عمل القلب وحجم الضربة مع زيادة شدة التدريب إلى أن يصل الفرد إلى الحد الأقصى لمعدل القلب. والرياضيين عموماً يظلون متقلين من أقصى إلى أقصى مع استمرار التدريب السليم ، وهذا من إيجابيات التدريب السليم التي تترك أثراً على القلب للتدريب الإيجابي على القلب مما يساعدهم على زيادة المعدل الأقصى للقلب وحجم الضربة لديهم^(٢) .

في متغير COP الناتج القبلي للأسلوبين المنتظم والعشوائي ظهر أن هنالك فروقاً معنوية بين القياسيين قبل الجهد وبعده ولصالح بعد الجهد وتعزو الباحثة السبب إلى أن أفراد عينة البحث قد تعرضوا إلى جهد بدني بارتفاع درجات الحرارة ولكل الأسلوبين فالمحصلة من ذلك هو الارتفاع في الناتج القلب ونظراً لزيادة معدل ضربات القلب أثناء الجهد البدني تحدث زيادة في حجم الدم المدفوع من القلب .. ففي فترة الراحة يضخ قلب الرياضي حوالي (٥) لتر دم في الدقيقة ، أما في حالة الجهد البدني ونتيجة اشتداد الطلب على الطاقة فإن قلب الرياضي يضخ حوالي (٣٠) لتر في الدقيقة وهذا

(١) أسعد عدنان عزيز : فسيولوجيا الانسان العامة وفسيولوجيا الرياضة ، مطبعة صفر واحد ، الديوانية ، ٢٠١٦ ، ص ٢٢٧ .

(٢) بهاء الدين سلامة : مصدر سبق ذكره ، ٢٠٠٠ ، ص ٥٣-٥٤

يعني أن كمية الدم المدفوع في الدقيقة خلال الجهد البدني هي حوالي (٦) أضعاف كمية الدم المدفوع خلال فترة الراحة أي زيادة الناتج القلبي بعد الجهد^(١).

وهذا ما أكدته (أبو العلا ٢٠٠٣) من أن الناتج القلبي يزداد مع زيادة حجم الضربة ومعدل ضربات القلب بحيث يصل الناتج القلبي من ٦-٥ أضعاف عن حالة الراحة^(٢).

أما في متغير C مؤشر الانقباض للأسلوبين المنتظم والعشوائي ظهر أن هنالك فروقاً معنوية بين القياسيين قبل الجهد وبعده ولصالح بعد الجهد وترى الباحثة أن مؤشر الانقباض قدر ارتفع عن ما كان عليه قبل الجهد ولكل من الأسلوبين المنتظم والعشوائي بأرتفاع درجات حرارة المحيط نتيجة للجهد المبذول والقدرة الوظيفية التي ترتفع لإكمال متطلبات الأداء البدني خلال الجهد " فالقلب هو المضخة العضلية ، التي تتتألف من أربعة تجاويف منفصلة واربعة صمامات ، والذي يتولى استمرار الدورة الدموية سائرة إلى جميع أنحاء الجسم"^(٣).

"أن وظيفة القلب هي ضخ الدم المحمول بالأوكسجين الذي يصله من الرئتين إلى الشريانين وأن عمل القلب هذا يتکيف مع التدريب الرياضي ، وأن نشاطه عند الرياضيين يتميز بمميزات تختلف عن نشاطه عند الأشخاص الذين لا يزاولون الرياضة وهذا الاختلاف يأتي نتيجة لتعود جهاز القلب والدورة الدموية على نشاط عضلي منتظم ولمدة طويلة"^(٤).

وبالتالي فإن مؤشر الانقباض لعضلة القلب يرتفع نتيجة الجهد المبذول ويزداد بزيادة الجهد لأن عضلة القلب وعملية الانقباض تزداد بزيادة الجهد لتوفير متطلبات العمل الوظيفي .

أما في متغير EF كمية الدم المدفوع في الأسلوب المنتظم ظهر أن هنالك فروقاً غير معنوية بين القياسيين قبل الجهد وبعده بينما ظهرت هناك فروق معنوية لنفس المتغير للأسلوب العشوائي ولصالح بعد الجهد وتعزو الباحثة السبب إلى أن كمية الدم المدفوعة تزداد بزيادة الجهد البدني وأرتفاع درجات حرارة المحيط ، إذ تحدث في عضلة القلب Heart muscle بعد الجهد تغيرات فسيولوجية مختلفة منها زيادة مساحة المقطع العرضي للقلب (حجم القلب) والتتناسب العكسى فيما بين حجم القلب ومعدل نبضه واتساع الشريانان التاجيان المغذيان لعضلة القلب وزيادة القوة الانقباضية لعضلة القلب وارتفاع

(١) جبار رحيمه الكعبـي : الأسس الفسيولوجـية والـكـيـمـائـيـة لـلـتـدـريـبـ الـرـياـضـيـ ، مطبـعـة قـطـرـ الـوطـنـيـة ، الدـوـحةـ ، ٢٠٠٧ـ ، صـ ٥٦ـ.

(٢) أبو العـلـاـ اـحـمـدـ عـبـدـ الـفـتـاحـ : مصدر سـيـقـ ذـكـرـهـ ، صـ ٤٠٤ـ .

(٣) عبد المنعم مصطفى : أمراض القـلـبـ وـالـأـوـعـيـةـ الدـمـوـيـةـ ، طـ ١ـ ، المؤـسـسـةـ الـعـرـبـيـةـ لـلـدـرـاسـاتـ وـالـنـشـرـ ، بـيـرـوـتـ ، ١٩٨٩ـ ، صـ ٥ـ.

(٤) مظفر عبد الله شـفـيقـ : قابلـيـةـ الـقـلـبـ وـالـدـوـرـةـ الدـمـوـيـةـ عـنـ الـرـياـضـيـنـ عـامـةـ وـلـاعـبـيـ كـرـيـةـ الـقـدـمـ خـاصـةـ ، مجلـةـ الـاتـحادـ العربيـ لـكـرـيـةـ الـقـدـمـ ، عـدـدـ ١٠ـ ، تمـوزـ ١٩٨٣ـ ، صـ ٧٥ـ .

معدل الدفع القلبي ؛ ووضح كمية أكبر من الدم والتاسب بين معدل القلب وبين نوع النشاط الرياضي التخصسي في حالة الراحة واثناء النشاط و التناسُب بين ضغط الدم (انقباضي وانبساطي) ؛ وبين نوع النشاط الرياضي التخصسي وزيادة الفترة الفاصلة بين كل انقباضة قلبية وأخرى وسرعة العودة إلى الحالة الطبيعية بانتهاء الجهد البدني ، وبالتالي فإن ممارسة الرياضة بصورة منتظمة تعمل على زيادة حجم القلب وبالتالي تزداد قوتها فتزداد كمية الدم التي تصل إلى جميع أعضاء الجسم^(١) .

لذلك فإن اعتماد اسلوب التعويض العشوائي خلال فترة الجهد قلل من كمية الدم المدفوعة مما رفع من قدرة الافراد على الاداء لفترة اطول دون تعب على خلاف من اسلوب التعويض المنتظم الذي أدى إلى ارتفاع كمية الدم المدفوعة .

٤-١-٥-١ مناقشة نتائج قيم T ودلالة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خلال الجهد بين الاسلوبين المنظم والعنصري

من الجدول (١١) نجد أنه في متغير HR معدل ضربات القلب خلال الجهد ظهر أن هناك فروقاً معنوية بين الأسلوبين المنظم والعنصري ولصالح المنظم وتعزو الباحثة السبب إلى أن أي عمل منظم يعمل على خفض معدل النبض إلى مستوى يتاسب ونوع الفعالية ونظام الطاقة المستخدم ويتأنى ذلك من خلال استخدام اسلوب التعويض المنظم للسوائل خلال الجهد وهذا يدل على امكانية عمل القلب ووضح كمية كبيرة من الدم بكفاءة عالية نتيجة التعويض المنظم إذ تتفاوت كمية السائل المفقود بالترعرق تبعاً للنشاط الجسماني ولدرجة حرارة المحيط ، ويبلغ حجم العرق بالحالة السوية نحو ١٠٠ مليلتر / يوم فقط ، ولكن في الطقس الحار جداً أو أثناء التمارين القاسية يزداد فقدان الماء بالترعرق من (لتر - لترتين) في الساعة أحياناً ، مما يسبب نفاذًا سريعاً لسوائل الجسم أن لم يزداد المدخل أيضاً بتنشيط آلية التعرق ولهذا فإن عملية التعويض وفقاً لأسلوب التعويض المنظم يتاسب مع الفعالية والجهد المبذول ترفع من قدرة عمل القلب وبالتالي خفض معدل القلب مقارنة بالاسلوب العشوائي أذ أن من أهم التغيرات الفسيولوجية التي تحدث نتيجة التدريب الرياضي الصحيح هو انخفاض عدد ضربات القلب^(٢) .

فضلاً عن أن عملية التعويض المنظم تعمل على رفع مستوى الاداء وبالتالي زيادة كمية الدم المدفوعة مع انخفاض ضربات القلب مقارنة بالاسلوب العشوائي ومن ثم ارتفاع معدل ضربات القلب ليديهم لأن عملية التعويض بارتفاع درجات الحرارة لا تخدم العمل البدني .

(١) أسعد عدنان عزيز : مصدر سبق ذكره ، ٢٠١٦ ، ص ٢٢٩ .

(٢) ريسان خرييط مجيد : مصدر سبق ذكره ، ١٩٩١ ، ص ٤١ .

في متغير SV (حجم الضربة خلال الجهد) ظهر أن هناك فروقاً معنوية بين الأسلوبين المنتظم والعشوائي ولصالح المنتظم وترى الباحثة أن عملية التعويض المنتظم للسوائل أثناء الجهد وبارتفاع درجة حرارة الجو تقلل من الآثار السلبية لذلك ومن ثم تعمل على تأديه القلب لوظائفه بالشكل المثالي وعدم تأثيرها بذلك الظروف التي تطرأ على لاعبي كرة السلة الناشئين الذين تمت التجربة عليهم، إذ يعتبر زيادة حجم الضربة من أهم أسباب سرعة سريان الدم أثناء الحمل البدني وبالتالي إنخفاض معدل القلب والذي بدوره يقلل مقدار الطاقة المبذولة لعمل عضلة القلب ، ويتم تنظيم حجم الضربة خلال الجهد عن طريق ثلاثة أساليب وهي حجم نهاية الدياستول وهو حجم الدم الذي يبقى في نهاية الدياستول إرتفاعاً عضلة القلب وضغط الدم الأورطي المتوسط وقوة انقباض البطين^(١).

في متغير COP الناتج القلبي خلال الجهد ظهر أن هناك فروقاً معنوية بين الأسلوبين المنتظم والعشوائي ولصالح المنتظم وترى الباحثة أن كفاءة عضلة القلب تتأثر بالجهد البدني المبذول من قبل أفراد العينة والاستمرار بالجهد بارتفاع درجات الحرارة يضع أعباء اضافية على القلب نقل من كفاءته مالم يكن هناك أسلوب صحيح للمحافظة على ديمومة عمل عضلة القلب بالشكل الذي لا يقلل من كفاءته وقد سمعت الباحثة من خلال استخدام اسلوب التعويض المنتظم للسوائل الى الوصول لنتائج عالمة مقارنة بالاسلوب العشوائي لنفس الأفراد وبالتالي زيادة الناتج القلب خلال الجهد ، اذ يتغير الناتج القلبي أثناء الجهد البدني وتحدث زيادة له نتيجة زيادة حجم الضربة^(٢) .

أما في متغير CI مؤشر الانقباض خلال الجهد فقد ظهرت فروقاً معنوية بين الأسلوبين المنتظم والعشوائي ولصالح المنتظم وتعزو الباحثة السبب الرئيس لذلك هو أن مؤشر الانقباض لعضلة القلب يتتأثر وكما ذكرنا سابقاً بالجهد البدني ودرجة حرارة المحيط التي قد تكون معرقلة للأداء وعملية التعويض للسوائل خلال الجهد بالأسلوب المنتظم تعمل على رفع قدرة مؤشر عضلة القلب، والتي تمتاز بخاصية القوة التي بواسطتها تتنقل عضلة القلب وخاصية السرعة اللازمة لتجعلها أقصر أو أقل طولاً وبواسطة هاتين الخاصيتين يتقرر حجم الدم المندفع خلال عملية الانقباض وبالتالي يعتبر المؤشر الرئيس للانقباض لعضلة القلب وتحكم بهذه الآلية ثلاثة عوامل أولها مدى تمدد العضلة قبل التقلص والثاني مدى الحمل الذي يواجهه البطين خلال التقلص والثالث الحالة التقلصية لعضلة القلب^(٣).

(١) ابو العلا احمد عبد الفتاح : مصدر سبق ذكره ، ٢٠٠٣ ، ص ٤١٠-٤١١ .

(٢) بهاء الدين ابراهيم سلامة : مصدر سبق ذكره ، ٢٠٠٠ ، ص ٥٥ .

(٣) عمار جاسم مسلم : قلب الرياضي ، شركة اب للطباعة الفنية المحدودة ، ٢٠٠٦ ، ص ٢٠-٢١ .

أما في متغير EF كمية الدم المدفوع خلال الجهد ظهر أن هناك فروقاً معنوية بين الأسلوبين المنتظم والعشوائي ولصالح المنتظم وتعتقد الباحثة أن سبب ذلك يكمن في أن عملية التعويض المنتظم تعمل على رفع كفاءة عمل القلب وسرعة سريان الدم المحمول بالأوكسجين الذي يعمل على رفع قدرة الأفراد على العمل لفترة أطول أثناء الجهد البدني وبالتالي كمية الدم المدفوع في أسلوب التعويض المنتظم تكون أقل مقارنة بالأسلوب العشوائي لقدرة عضلة القلب على العمل بكفاءة عالية ، إذ يزداد إمداد القلب بالدم والأوكسجين أثناء العمل العضلي عن طريق زيادة سريان الدم في الشرايين التاجية حيث يتغير فرق الأوكسجين الشرياني الوريدي بدرجة قليلة أثناء النشاط البدني بالمقارنة بحالة الراحة ، أن أقصى استهلاك للأوكسجين في القلب أثناء العمل العضلي حوالي ٤ - ٥ مرات بالمقارنة بوقت الراحة ويتم إمداد القلب بالدم بفضل شبكة كبيرة من الشعيرات الدموية وهذا يساعد على تسهيل نفاذية الأوكسجين إلى ألياف القلب لاستهلاكه ويتغير سريان الدم في القلب خلال الدورة القلبية حيث يقل في وقت الانقباض ويزيد في وقت الانبساط وعند زيادة معدل القلب أثناء العمل العضلي تقل فترة الانبساط لعضلة القلب ولذا فإن هذا يصعب من عملية إمداد عضلة القلب بالدم لاسيما البطين الأيسر^(١) .

(١) أسعد عدنان عزيز : مصدر سبق ذكره ، ٢٠١٦ ، ص ٢٣٠ .

الفصل الخامس

الاستنتاجات والتوصيات

٥ - الاستنتاجات والتوصيات .

٥-١ - الاستنتاجات.

٥-٢ - التوصيات .

٥- الاستنتاجات والتوصيات :-

١-٥- الاستنتاجات :-

بعد مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها في حدود عينة البحث أستنتجت الباحثة ما يأتي :-

- ١- أن الأرمنة الثابتة لتعويض السوائل المفقودة في الأجواء الحارة حافظت على مستوى كل من (الوزن ، درجة الحرارة ، لزوجة الدم ، الهيموكروبين) بعد الجهد مقارنة بالأسلوب العشوائي وبالتالي المحافظة على مستوى الاداء بالشكل المثالي بصورة أفضل لأفراد العينة.
- ٢- عملية التعويض المنتظم أسهم في التقليل من آثار التعرق نتيجة الجهد والحرارة المرتفعة وبالتالي حافظت وبصورة كبيرة على كل من (بداية التعرق ، الوزن ، نسبة الوزن المفقود ، كمية السائل المستهلك ، درجة الحرارة) مقارنة بالأسلوب العشوائي.
- ٣- أن زيادة قدرة أفراد العينة على الاداء بفعالية عالية ولفترة زمنية أطول هو نتاج لتعويض المنتظم للسوائل مقارنة بالأفراد الذين يعوضون بصورة عشوائية.
- ٤- أن عملية التعويض المنتظم للسوائل أثناء الجهد وبارتفاع درجة حرارة الجو تقلل من الآثار السلبية وبالتالي تعمل على تقليل العبء على القلب لأداء وظائفه بصورة الأمثل وعدم تأثيرها بالظروف التي تطرأ على أفراد العينة.
- ٥- أن استخدام اسلوب التعويض المنتظم للسوائل أدى إلى زيادة كفاءة عمل عضلة القلب لأفراد العينة بما جعلهم يؤدون إلى فترات أطول وبكفاءة عالية مقارنة بالأسلوب العشوائي الذي ولد عباءً إضافي على عضلة القلب لنفس الأفراد وبالتالي زيادة الناتج القلب خلال الجهد.

٢-٥- التوصيات :

١. اعتماد اسلوب التعويض المنظم للسوائل المفقودة أثناء تأدية الجهد لفترات طويلة في لعبة كرة السلة أو التدريب لما لها من دور مهم في المحافظة على وظائف الجسم بصورة مثالية وقدرة الرياضي على الاداء لفترات طويلة دون حوادث .
٢. على المدربين الأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة خلال الوحدات تدريبية والمنافسة في لعبة كرة السلة لغرض التأقلم أو التكيف الرياضي فسيولوجياً للوصول إلى أفضل الانجازات .
٣. الاستفادة من التغيرات الفسيولوجية في عضلة القلب في برمجة التدريب في الفعاليات المختلفة .
٤. ضرورة قيام المدربين بمعرفة وزن اللاعب قبل وبعد الوحدات التدريبية لمعرفة كمية المفقود من السوائل ومحاولة تعويضها .
٥. تعميم نتائج الدراسة والقياسات المختبرية واعتمادها من المعنيين بالعملية التدريبية لأمكانية الاستفادة العلمية والعملية في ظروف مشابهة لعينة البحث باختلاف الفعاليات الرياضية .
٦. التأكيد على ضرورة تعويض السوائل المفقودة عند ممارسة الفعاليات الرياضية في الأجواء الحارة وأخذ جرعات من الماء خلال الوحدات التدريبية للمحافظة على توازن السوائل والأملاح في جسم الرياضي .
٧. استخدام أزمنة مختلفة للدراسات اللاحقة.

المصادر

أولاً - المصادر العربية

١. أبو العلا احمد ، أحمد نصر الدين رضوان : فسيولوجيا اللياقة البدنية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط ١ ، ١٩٩٣ .
٢. أبو العلا أحمد عبد الفتاح: فسيولوجيا التدريب الرياضي ، ط ١، دار الفكر العربي ، القاهرة، ٢٠٠٣.
٣. أبو العلا عبد الفتاح ، محمد صبحي حسانين : فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي وطرق القياس والتقويم ، ط ١ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٩٧ .
٤. أسعد عدنان عزيز : فسيولوجيا الانسان العامة وفسيولوجيا الرياضة ، مطبعة صفر واحد ، الديوانية ، ٢٠١٦ .
٥. إيمان عادل الرماضي : التحليل الكيميائي للسائل العرقى المحفز للحرارة ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل ، كلية العلوم ، ١٩٩٢ .
٦. بهاء الدين إبراهيم سلامة : فسيولوجيا الرياضة والاداء البدنى (لاكتات الدم) ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط ١، ٢٠٠٠ .
٧. بهاء الدين سلامة: فسيولوجيا الرياضة. القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٩٦ .
٨. جبار رحيمة الكعبي : الأسس الفسيولوجية والكيميائية للتدريب الرياضي ، مطبعة قطر الوطنية ، الدوحة ، ٢٠٠٧ ،
٩. حكمت عبد الكريم فريحات : فسيولوجيا جسم الانسان ، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، ١٩٩٠ ،
١٠. حمه نجم جاف . صفاء الدين طه : الطب الرياضي و التدريب ، اربيل ، مطبعة جامعة صلاح الدين ، ٢٠٠٢ .
١١. ذوقان عبيادات ، عبد الرحمن : البحث العلمي - مفهومه - ادواته - اساليبه ، دار الفكر العربي، عمان ، ط ٤ ، ١٩٨٩ .
١٢. رجستر ، مونست : الدليل الشامل الى صحة القلب (كتاب القلب) ، ترجمة : حسان احمد قمحية، ط ٢، الدار العربية للعلوم ، بيروت ، ٢٠٠٦ .

١٣. رشدي فتوح: أساسيات عامة في علم الفسيولوجيا, ط٢، الكويت، ذات السلسل للطباعة والنشر، ١٩٨٨.
١٤. ريسان خرييط ، علي تركي : فسيولوجيا الرياضة ، بغداد، ٢٠٠٢ .
١٥. ريسان خرييط مجيد : التحليل البيوكيميائي والفالسجي في التدريب الرياضي ، مطبعة دار الحكمة ، جامعة البصرة .
١٦. سلمى نصار وآخرون : بيولوجيا الرياضة والتدريب ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٨٢
١٧. سميرة خليل محمد : مبادئ الفسيولوجيا الرياضية ، شركة ناس للطباعة ط١ ، ٢٠٠٨ .
١٨. شتيوي العبد الله: علم وظائف الأعضاء ، الاردن، دار المسيرة للنشر، ط١، ٢٠١٢ .
١٩. صياغ قطان وآخرون: علم وظائف الأعضاء ، مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة دمشق، دمشق ٢٠١١ .
٢٠. طارق عبد الملك الامين ، قيس إبراهيم الدوري (ب،ت)، الفلسفة لطلاب كلية التربية الرياضية ، دار ابن الأثير للطباعة والنشر في جامعة الموصل .
٢١. عايش زيتون: بيولوجيا الإنسان ومبادئ في التشريح والفسيولوجيا ، ط٤، دار عمان للطباعة والنشر ، عمان، ٢٠٠٢ .
٢٢. عبد الرحمن محمد و هاني طه: مبادئ علم التشريح، ط٤، بغداد، مطبعة العمال المركزية، ١٩٨٨ .
٢٣. عبد المنعم مصطفى : أمراض القلب والأوعية الدموية ، ط١ ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٩٨٩ .
٢٤. عصام الصفدي: فسيولوجيا جسم الانسان، عمان، دار اليازوري للنشر، ٢٠٠٦ .
٢٥. علي مهدي هادي الجمالي: وضع مؤشرات رقمية لسوائل المفقودة من خلال بعض المتغيرات الفسيولوجية في الدم باستخدام جهدين بدنيين باختلاف درجات الحرارة لدى لاعبي الكرة الطائرة ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة القادسية ، ٢٠٠٩ .
٢٦. عمار جاسم مسلم : قلب الرياضي ، شركة اب للطباعة الفنية المحدودة ، بغداد ، ٢٠٠٦ .
٢٧. قاسم حسن حسين ، ومنصور جمیل العنکی : اللياقة البدنية وطرق تحقيقها ، مطبعة التعليم العالي، بغداد، ١٩٨٨ .

٢٨. كاظم جابر أمير : الاختبارات والقياسات الفسيولوجية في المجال الرياضي ، الكويت ١٩٩٧ .
٢٩. محمد حسن علاوي و أبو العلا أحمد : فسيولوجيا التدريب الرياضي، القاهرة، دار الفكر العربي ، ٢٠٠٠ .
٣٠. محمد حسن علاوي، أبو العلا أحمد: فسيولوجيا التدريب الرياضي، دار الفكر العربي ، القاهرة، ١٩٨٤ .
٣١. محمد سليم صالح وعبد الرحيم عشير : علم حياة الإنسان ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، ١٩٨٢ .
٣٢. محمد علي القط : فسيولوجيا الأداء الرياضي في السباحة ، المركز العربي للنشر ، القاهرة، ٢٠٠٦ .
٣٣. محمد محمد الحمامي : التغذية والصحة للحياة الرياضية ، القاهرة ، ، ، ٢٠٠٠ .
٣٤. محمد نصر الدين رضوان : طرق قياس الجهد البدني في الرياضة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٩٨ .
٣٥. مظفر عبد الله شفيق : الندوة الخامسة لطبع الرياضي ، المحاضرة الاولى ، القابلية البدنية والاوكسجينية عند الرياضيين ، فندق الرشيد ، بغداد ، ١٩٩٦ .
٣٦. مظفر عبد الله شفيق : قابلية القلب والدورة الدموية عند الرياضيين عامة ولاعبي كرة القدم خاصة ، مجلة الاتحاد العربي لكرية القدم ، عدد ١٠ ، تموز ، ١٩٨٣ .
٣٧. مهند حسين بشتاوي ، أحمد محمود أسماعيل : فسيولوجيا التدريب الرياضي ، ط١ ، دار وائل للنشر ، ٢٠٠٦ .
٣٨. هاشم عدنان الكيلاني : الأسس الفسيولوجية للتدريبات الرياضية ، ط١ ، الكويت، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٠ .
٣٩. هاشم عدنان الكيلاني : فسيولوجية الجهد البدني والتدريبات الرياضية ، عمان ، دار حنين ، ٢٠٠٥ م .
٤٠. الهزاع، هزاع بن محمد. كتاب التنظيم الحراري وتعويض السوائل والمنحلات أثناء الجهد البدني لدى الإنسان، ٢٠٠٦ م .

ثانياً - المصادر الاجنبية

1. A.Dirix , H . G & ; " the Olympic book of medicine " : vol -1-U.K. 1988 .
2. Astrand , P.O and Rodahl , K (1979) : Text book of work physidog Megraw – Will book company , U.S.A . 2
3. Bar-Or, O: Sports Science Exchange, 1994,7
4. David . L . costill . A scientific approachto distance running trak and field news . 1979 .
5. Edward Stanton west , Wilbert R . Todd , Howard . mason , John .T. Von Bruggen : Text book of Biochemistry . 4ed . U.S.A. 1970 .
6. Edward Stanton west , Wilbert R . Todd , Howard . mason , John .T. Von Bruggen : Text book of Biochemistry . 4ed . U.S.A. 1970 .
7. Fortney S.M . , Nadel E.R . , Wenger G.B . and Bore J. R. : effect of blood volume on sweating rate and body fluids in exercising humans , . J Apple physiol . 51 (6) , 1981 .
8. Fox , E , L (1984) : sport physiology , Saunders College publishing company , Japan) .
9. George harenith : Age predicts cardiorascular , but not thermoregulatory . responses to humid heat stress . Eur . J . Apple . physiol . , 70 , 1995 .
- 10.Gutmann I . , Wahlefeld A W . : determination of lactate deshydrogenase and NAD. In : bermeyer H U , ed . methods of enzimaite anelysis . London academic , 3 , 1976 .
- 11.Guyton & Hall :Text book of Medical physiology. 12th edition .United states of America .2011.
- 12.Guyton , text book of medical physiology . seven , edition . w.b . saunders company . 1986 .
- 13.Halestrap, A. P. and Meredith, D. (2004) The SLC16 gene family-from Monocarboxylate transporters (MCTs) to aromatic amino acid transporters and beyond.
- 14.Ken sparks and cary bjorklund , long distance runners guide to training and racing , prentice hall . 1984 .
- 15.Kumar, Abbas, Fausto: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 7th Ed.

16. Mackenzie . M , : pathophysiology of thermoregulation in patients with poikilothermia . Arctic . med . Res . , suppl , 1991 .
17. Pedersen S.A : Reduced sweating in adults with growth hormone deficiency . the lancet , vol . 11 , no . 8064 , 1989 .
18. Per – olef Astrand . kaare Rodahl : Textbook of work physiology ; U.S.A. , 1970 .
19. Scott k . powers & ; Exercise physiology ' chapter 15 . U.K. 2001 .
20. Vidya Raton : hand book of human physiology . printed at narian and sons , new Delhi , 5th . ed . 1983 . P: 19 .
21. Williams c.b . and others , circulatory and metabolic reaction to work in heat . J . apple physiol . 17 . 1962
22. Willmore , J, and Costil ,D: Physiology of sport and exercise HUMAN).

ثالثاً : الانترنت

1. <http://healths.roro44.com>
2. <http://www.alriyadh.com/734091>
3. <http://www.users.rcn.com. Animal Tissues .2010-08-13>

الملاحق

ملحق (١)

اسماء الخبراء والمختصين الذين تمت المقابلة معهم

الرقم	الأسم	التخصص	مكان العمل
١	أ.د. رحيم رويع	تدريب رياضي	كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
٢	أ.م. د سلام جبار صاحب	اختبارات	كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
٣	أ.د. احمد عبد الزهرة	فسلجة	كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
٤	أ.د. قيس سعيد دايم	فسلجة	كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
٥	أ.م.د. أسعد عدنان	فسلجة	كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
٦	أ.د. حازم موسى	اختبارات	كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
٧	أ.م.د علي بدبو	فسلجة	كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

Abstract

(The effect of systematic and random method of compensating fluid at the beginning of sweating time and the percentage of lost and consumed and some physiological variables during the maximum physical effort of the emerging basketball players)

Researcher

Dina Hammoud Kassem

Supervisor

Dr. Falah Hassan Abdullah

The purpose of the letter to identify any different times best to make up for the fluid through the physical effort of the basketball players junior, was the use of the experimental method for suitability nature of research and achieve goals and resolve his problem, but for a sample has included players team Qadisiyah province junior basketball totaling 12 players life expectancy has reached (15-17) As for the weight it was Mtosthm (63.50), while for the variables studied have included cardiac variables, namely the rate of heart rate and stroke volume and output cardiac index and contraction and the amount paid in the blood, as well as the intake of liquid and the amount of fluid lost and the change in plasma volume blood and blood viscosity and the proportion of Alimoklopan, temperature and weight, has been a major experiment in two ways, the first method (regular) where he was measured heart, weight, temperature and measuring plasma volume and viscosity by the effort and after giving the water on a regular basis all the variables (10) minutes in any quantity, either method the second is the (random) are Aiza measure heart and weight variables, temperature and volume of plasma viscosity by the effort and after him, but the player with a time limit for fluid intake is not determined, but according to the desire of the player time and quantity, have reached research to several conclusions of the most important of which is the process of regular compensation contributed to minimize the effects sweating as a result of the high-voltage, temperature and thus maintained and significantly on both (start sweating, weight, lost weight ratio, the amount of fluid consumer, temperature) compared to the random-style.

A



**Ministry of Education and
Scientific Research
Al QADISIYAH University
Faculty of Physical Education
and Sport Sciences
Higher Studies / Master**



The effect of systematic and random method of compensating fluid at the beginning of sweating time and the percentage of lost and consumed and some physiological variables during the maximum physical effort of the emerging basketball players

Message submitted by:

Dina Hamoud Qassem

**To the Council of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences - University of Qadisiyah
It is part of the requirements of the Master of Science in Sports**

Supervised by :

Dr. Falah Hassan Abdullah

٢٠١٧ AD

1438 AH